


تابع



تابع یکی از مفاهیم مهم است که در ریاضیات و سایر علوم دارای کاربردهای فراوانی است. تابع به روش‌های گوناگونی نمایش داده می‌شوند. یکی از این روش‌ها استفاده از نمودارهاست. موضوعات متفاوتی به وسیله تابع قابل مدل‌سازی است. نمودار زیر روند کاهش متوسط تعداد فرزندان یک خانواده در کشورمان را نشان می‌دهد. نمودار بعدی جمعیت کل کشور را در چهار وضعیت مختلف پیش‌بینی می‌کند. کشور ما در معرض سالمدن شدن می‌باشد. بطوری که اگر متوسط تعداد فرزندان یک خانواده تا سال ۱۴۳۰ میزان فعلی پیش‌بینی شود، رشد جمعیت به صفر خواهد رسید و پس از آن رشد جمعیت کشور منفی خواهد شد. سالمدنی جمعیت و منفی شدن رشد جمعیت، پیامدهای ناگواری را در بی دارد.

نمودار روند کاهش متوسط تعداد فرزندان یک خانواده در ایران

نمودار پیش‌بینی رشد جمعیت کل کشور در دوره‌های پنج ساله در چهار وضعیت مختلف
تعداد متوسط فرزندان تا ۱۴۳۰ شمسی

درس اول مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن

درس دهم نه و برد توابع

درس سیزدهم واعت وابع

درس اول: مفهوم قابع و بازنمایی‌های آن

بسیاری از پدیده‌های پیرامون ما به نوعی با هم ارتباط دارند. یک نوع خاص از این ارتباط در موارد زیادی مشاهده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

دما بی که به ساعت معینی در یک مکان نسبت داده می‌شود.

قیمتی که به اجنباس یک فروشگاه نسبت داده می‌شود.

نمره‌هایی که به یک دانش‌آموز در دروس مختلف تعلق می‌گیرد.

عددی که به جمعیت شهرها نسبت داده می‌شود.



همدان - گنج نامه



میبد، استان یزد - نارین قلعه

فعالیت ۱

در جدول‌های زیر مثال‌های بالا و مواردی دیگر به کمک جدول ارائه شده‌اند. جاهای خالی را پر کنید. جدول آخر را به سلیقه خودتان تکمیل کنید.
باتوجه به جدول مشخص است که در یک زمان معین فقط یک دمara می‌توان به آن نسبت داد.
درباره بقیه جدول‌ها مشابه این عبارت را بنویسید.

ساعت	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	
دما	۱۵	۱۶	۱۷	۱۷	۱۸	

به یک ساعت معین فقط یک دمara می‌توان نسبت داد؛ یعنی
یک ساعت مشخص دو دمای متفاوت ندارد.

کالا	خودکار	دفتر	مداد	خط‌کش	
قیمت (تومان)	۱۵۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰	

به یک کالای معین فقط یک قیمت را می‌توان نسبت داد.

درس	ریاضی	فیزیک	شیمی	ادبیات	
نمره	۱۸	۱۶	۱۷	۱۸	

به یک درس مشخص فقط یک نمره را می‌توان نسبت داد.

فرد	امیدی	احسانی	کشاورز	رستگار	
روز تولد	شنبه	دوشنبه	شنبه	پنجشنبه	


یک شخص معین دو روز تولد متفاوت ندارد.

کشور	ایران	انگلیس	ژاپن	قطر	لهستان	
پایتخت	تهران	لندن	توکیو	دوحه	ورشو	

به یک کشور مشخص فقط یک شهر را به عنوان ...
پایتخت نسبت دادیا هر مثالی که چنین رابطه‌ای در آن وجود داشته باشد.

فعالیت ۴

جدول های فعالیت ۱ را می توان به کمک مجموعه ها و پیکان هایی که اعضای آنها را به هم **مربوط** می کنند، مشخص کرد. به این شیوه نمایش، نمودارهای پیکانی می گوییم. یک نمونه کامل شده است. بقیه را شما کامل کنید.




توجه دارید که در رابطه های بالا، از هر عضو مجموعه A دقيقاً یک پیکان خارج شده است. این گونه رابطه بین دو مجموعه را یک «تابع» می نامند.

یک تابع از مجموعه A به مجموعه B، رابطه ای بین این دو مجموعه است که در آن به هر عضو از A دقيقاً یک عضو از B نسبت داده می شود.

در فعالیت ۱، همه مثال های ارائه شده تابع هایی هستند که به صورت جدول نمایش داده شده اند.

کار در کلاس

۱) مجموعه A شامل سه دانش آموز به نام های محمد، حسین و امید و مجموعه B شامل دو رشته ورزشی است که دانش آموزان می توانند انتخاب کنند. کدام یک از نمودارهای پیکانی داده شده تابع است و کدام یک تابع نیست؟




درس اول: مفهوم تابع و بازنمایی

۱) از مجموعه A به مجموعه B نمودار پیکانی را طوری رسم کنید که یک تابع را نمایش دهد. از مجموعه X به مجموعه Y این کار را به گونه‌ای انجام دهید که حاصل بک تابع نباشد. پاسخ خود را با پاسخ دوستان مقایسه کنید.



بله در یک زمان مشخص ، افراد دارای سن مشخص و وزن مشخص می باشند.



- الف) آیا رابطه‌ای که به افراد سن آنها را نسبت می دهد، یک تابع است؟ رابطه‌ای که به افراد وزن آنها را نسبت می دهد، چطور؟
 ب) آیا رابطه‌ای که به افراد غذای مورد علاقه آنها را نسبت می دهد، یک تابع است؟ توضیح دهید. **خیر زیرا ممکن است یک فرد چند نوع غذا را دوست داشته باشد.**
 ۲) کدام یک از نمودارهای پیکانی زیر یک تابع است؟



فعالیت

نمایش تابع به صورت زوج‌های مرتب و نمودار مختصاتی

نمودار زیر، دمای هوا را در چهار ساعت متفاوت در اردبیل نشان می دهد.
 رابطه بین زمان و دما را به صورت نمودار پیکانی نمایش دهید و معلوم کنید که آیا این رابطه یک تابع است؟ جدول را هم کامل کنید.



ساعت	۴	۵	۶	۷
دما	۵	۴	۳	۳

اگر در نمودار بالا محور افقی را محور طول و محور عمودی را محور عرض درنظر بگیریم، مختصات هر یک از نقاط داده شده را می‌توان با یک «زوج» از اعداد به صورت زیر نمایش داد:
 (۴, ۵), (۵, ۴), (۶, ۳), (۷, ۳)

ترتیب نوشتن اعداد در هر زوج مهم است. مثلاً زوج‌های $(4, 5)$ و $(4, 5)$ برابر نیستند و دو نقطه متفاوت در نمودار را نشان می‌دهند.
به همین دلیل به هر یک از زوج‌های بالا یک «**زوج مرتب**» می‌گوییم.

اگر همه زوج‌های مرتب بالا را در مجموعه‌ای قرار دهیم، یک نمایش دیگر برای رابطه ارائه شده بین زمان و دما به دست می‌آید که به آن نمایش زوج مرتبی رابطه داده شده می‌گویند. برای نام‌گذاری این مجموعه جدید از حروفی مانند f و g استفاده می‌کنیم.
 $f = \{(4, 5), (5, 4), (6, 3), (7, 2)\}$

در هر زوج مرتب عضو اول را «**مؤلفه اول**» و عضو دوم را «**مؤلفه دوم**» می‌نامیم. به طور مثال در زوج مرتب $(3, 6)$ ، مؤلفه اول 6 و مؤلفه دوم 3 است. مجموعه f یک تابع است. برای ساعت‌های دیگر موجود در نمودار دمای را به زمان نسبت دهید و نمودار را به صورت زوج مرتب نمایش دهید.

کار در کلاس

- ۱ نام شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز در یک سطر جدول زیر نوشته شده‌اند. در سطر دیگر، جمعیت آن شهرها را به‌طور تقریبی بنویسید (جمعیت دقیق لازم نیست).

شهر	تهران	مشهد	اصفهان	شیراز	تبریز	اهواز	کرمان
جمعیت	۸.....	۲۷.....	۱۷.....	۱۵.....	۱۰.....	۱۱.....	۵.....

رابطه بالا را به صورت پیکانی و زوج مرتب نمایش دهید. آیا این رابطه یک تابع است؟ **بله** تابع است.



۲۰۱۷-۱۸ همایش ملی و بین‌المللی آن

۱ در هر سطر جدول زیر نمایش‌های مختلف یک رابطه داده شده است. جاهای خالی جدول را کامل و معلوم کنید که آیا این رابطه یک تابع است؟ ردیف آخر را به دلخواه خودتان کامل کنید.

توصیف رابطه	مجموعه زوج‌های مرتب	نمودار پیکانی	جدول یا نمودار
به هر عدد طبیعی کمتر از ۴ مقسوم‌علیه‌های آن را نسبت می‌دهد.	$\{(1,1), (2,1), (2,2), (3,1), (3,3)\}$		
به اعداد ۲ و ۳ او ۴، مربع آنها را نسبت می‌دهد.	$\{(2,4), (3,9), (4,16)\}$		مانند نمونه رسم شود.
به اعداد ۴ و ۷ ریشه‌های دوم آنها را نسبت می‌دهد.	$\{(\pm 2\sqrt{7}), (\pm -2\sqrt{7})\}$		مانند نمونه رسم شود.
به اعداد -۱ و ۰ و ۱، دو برابر آنها را نسبت می‌دهد.	$\{(-1,-2), (0,0), (1,2)\}$		مانند نمونه رسم شود.
مثال دلخواه			

۲ (الف) کدام‌یک از رابطه‌های زیر تابع است؟ چرا؟ **تابع نیست زیرا در**

$$g = \{(1,5), (2,9), (2,5), (3,10)\}$$

$$f = \{(1,5), (2,9), (3,10)\}$$

آن عدد ۲ به دو عدد ۹ و ۵ نظیر شده است.


تابع است.

۲ (ب) با تکمیل جمله زیر برای تشخیص تابع بودن یک رابطه، هنگامی که رابطه به صورت زوج مرتبی ارائه می‌شود، معیاری به دست آورید:

اگر یک رابطه به صورت مجموعه زوج‌های مرتب داده شده باشد، هنگامی این رابطه یک تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایزی در آن **دارای مولفه‌های اول یکسان** نباشند.

۱

- (الف) تابع است؛ به ضلع یک مربع فقط یک محیط را می‌توان نسبت داد.
- (ب) تابع است؛ در یک زمان معین به هر فرد فقط می‌توان یک دمای بدن را نسبت داد.
- (ج) تابع است؛ چون به هر فرد فقط یک گروه خونی می‌توان نسبت داد.
- (د) ممکن است دانش آموزی بیش از یک دوست داشته باشد.
- (ه) تابع نیست؛ اعداد مثبت دارای دو ریشه دوم هستند.
- (و) تابع است؛ هر عدد حقیقی فقط دارای یک ریشه سوم است.



$$\begin{aligned}f &= \{(2, 1), (3, -5), (3, 7)\} \\h &= \{(2, 3), (3, 2), (1, 1)\} \\r &= \{(2, 0), (-7, 0)\}\end{aligned}$$


- ۲ کدام یک از مجموعه‌های زیر یک تابع است؟
- (الف) به کمک نمودار پیکانی دو رابطه از A به B ارائه کنید که تابع باشند.
- (ب) دو رابطه ارائه کنید که تابع نباشند.
- (ج) چهار رابطه بدست آمده را به کمک زوج‌های مرتب و نمودار نمایش دهید.

- ۱ کدام یک از روابط زیر یک تابع را معلوم می‌کند؟ توضیح دهید.
- (الف) رابطه‌ای که به ضلع یک مربع، محیط مربع را نسبت می‌دهد.
- (ب) رابطه‌ای که به هر فرد، دمای بدن او را در یک زمان معین نسبت می‌دهد.
- (ج) رابطه‌ای که به هر فرد، گروه خونی او را نسبت می‌دهد.
- (د) رابطه‌ای که به هر دانش‌آموز، دوستان او را نسبت می‌دهد.
- (ه) رابطه‌ای که به هر عدد، ریشه‌های دوم آن عدد را نسبت می‌دهد.
- (و) رابطه‌ای که به هر عدد، ریشه سوم آن را نسبت می‌دهد.

۳ کدام یک از مجموعه‌های زیر یک تابع است؟

$$\begin{aligned}g &= \left\{ \left(\frac{1}{2}, 1 \right), \left(\frac{3}{5}, 1 \right), \left(-5, 1 \right), \left(8, 1 \right) \right\} \\k &= \{(2, 5)\} \\l &= \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), \dots\}\end{aligned}$$

- ۴ A و B مجموعه‌هایی غیر عددی‌اند، در شکل زیر در A و B اعضایی دلخواه بگذارید و یک تابع از A به B به کمک نمودار پیکانی ارائه کنید. سعی کنید لاقل سه تابع مختلف بنویسید. پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.



درس دوم: دامنه و برد توابع

فعالیت

در جدول زیر رابطه بین تعدادی چند ضلعی و مجموع زوایای داخلی آنها داده شده است. جدول را کامل کنید.

چندضلعی	مثلث	مربع	لوزی	پنج ضلعی
مجموع زوایای داخلی (درجه)	۱۸۰°	۳۶۰	۳۶۰	۵۴۰

این رابطه را به صورت زوج مرتبی نمایش دهید.

$$f = \{(540, \text{پنج ضلعی}), (360, \text{لوزی}), (360, \text{مربع}), (180, \text{مثلث})\}$$

چرا f یک تابع است؟ **زیرا زوج های مرتب آن، مولفه اول یکسان ندارند.**

مجموعه همه مؤلفه های اول زوج های مرتب تشکیل دهنده هر تابع را **(دامنه)** و مجموعه همه مؤلفه های دوم را **(برد)** آن تابع می نامند.

در فعالیت بالا :

$$\begin{aligned} &\{(\text{پنج ضلعی}, \text{لوزی}, \text{مربع}, \text{مثلث}) = \text{دامنه } f \\ &f = \{180, 360, 540\} \end{aligned}$$

کاردر کلاس

۱ در جدول زیر رابطه بین ضلع یک مربع و محیط آن داده شده است. جدول را کامل کنید.


طول ضلع	$\frac{1}{2}$	۱	$\frac{3}{2}$	۲	۳	۵
محیط	۲	۴	۶	۸	۱۲	۲۰

نمایش رابطه داده شده را به صورت مجموعه زوج های مرتب بنویسید. چرا این رابطه تابع است؟ دامنه و برد این تابع را بنویسید. **دامنه:** $\left\{\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, 3, 5\right\}$

۲ تابع است **زیرا مولفه اول یکسان ندارد.** **برد:** $\{2, 4, 6, 8, 12, 20\}$
(الف) تابعی مثال بزنید که دامنه آن سه عضو و برد آن دو عضو داشته باشد.

ب) آیا تابعی وجود دارد که دامنه آن دو عضو و برد آن سه عضو داشته باشد؟ **خیر زیرا شرط تابع بودن برقرار نمی شود.**

اگر f تابعی از مجموعه A به مجموعه B باشد، می دانیم که دامنه f همان مجموعه A است. آیا همیشه برد تابع f با مجموعه B برابر است؟ مثال بزنید. **خیر، همیشه برابر نیست.**



فعالیت

دنباله شکل‌های زیر را در نظر بگیرید:



جدول را کامل کنید.

شماره شکل	۱	۲	۳	۴	۵	۶	...	۱۰۰	...	n	...
تعداد دایره‌ها	۱	۳	۵	۷	۹	۱۱	...	۱۹۹	...	$2n-1$...

چرا این جدول یک تابع را نشان می‌دهد؟ نمایش زوج مرتبی این تابع: زیرا مولفه اول یکسان ندار
 $\{(1,1), (2,2), (3,3), \dots, (n, n)\}$

نمودار پیکانی و نمودار مختصاتی این تابع را رسم کنید.

دامنه: $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ برد: $\{1, 3, 5, \dots, 2n-1\}$

همان‌گونه که از نمایش‌های مختلف تابع دیده می‌شود، عضو ۱ از دامنه به ۱ از برد و عضو ۲ از دامنه به ۳ از برد نظیر می‌شود. به جای این می‌توان با یک قرارداد کار را ساده‌تر کرد. معمولاً می‌نویسند $f(1)=1$, $f(2)=3$, $f(3)=5$ و گفته می‌شود که مقدار تابع f در نقطه ۱ برابر ۱ است و مقدار تابع f در نقطه ۲ برابر ۳ است. به همین ترتیب می‌توان نوشت:

$$f(1)=1, f(2)=3, \dots, f(n)=2n-1, \dots$$



رابطه بین دامنه و برد تابع f را می‌توان به صورت یک عبارت ریاضی به شکل $f(n)=2n-1$ نوشت که در آن n یک عدد طبیعی است. این گونه نمایش تابع را نمایش جبری می‌نامند. برای مشخص کردن تابع f به صورت جبری باید به دامنه و برد آن هم توجه کنیم. دامنه تابع f مجموعه اعداد طبیعی است.


در بسیاری از موقعیت‌ها کار با نمایش جبری یک تابع، ساده‌تر و مناسب‌تر از کار با دیگر نمایش‌های تابع است.

کار در کلاس

اگر تابعی با نمایش جبری $f(n) = n^2 + 1$ داده شده باشد و دامنه آن $A = \{1, 2, 3, 4\}$ باشد، برد تابع f را به دست آورید.

$$\{2, 5, 10, 17\}$$





جدول را کامل کنید و از آن برای رسم نمودار خط $y = 2x - 1$ استفاده کنید.

x	1	2	3	-1	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-2
y	1	3	5	-3	-1	0	-2	-5

آیا می‌توانید شباهت این جدول و تفاوت آن را با جدول فعالیت قبل نشان دهید؟ چرا این جدول

هم یک تابع را نشان می‌دهد؟ این تابع را g بنامید. شباهت: رابطه بین اعضای دامنه و برد است. تفاوت: دامنه قبلي اعداد طبیعی است و دامنه این تابع اعداد حقیقی

تابع است زیرا دارای مولفه اول یکسان نیست.
نمودار این تابع و تابع داده شده در فعالیت قبل چه تفاوتی با هم دارند؟ این نمودار، نمودار یک خط است. نمودار قبلي نقطه ای بود.

دامنه و برد این تابع را به دست آورید و با دامنه و برد تابع $y = 2n - 1$ که در آن $n \in \mathbb{N}$ مقایسه کنید.

جاهای خالی را کامل کنید.


$$g\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{7}{5} \quad g(0) = -1 \quad g\left(\frac{2}{7}\right) = -\frac{3}{7} \quad g(\sqrt{5}) = 2\sqrt{5} - 1 \quad g(10) = 19$$

نمایش جبری تابع داده شده در این «کار در کلاس» را بنویسید.

در اینجا x یک عدد حقیقی است.

هر تابع که بتوان آن را به شکل $y = ax + b$ نمایش داد، یک تابع خطی نامیده می‌شود.


شاید بیشتر شما نمودارهای وزن یا قد یک کودک را از بدو تولد تا هنگام ورود به مدرسه دیده باشید. شکل زیر نمودار تغیرات وزن یک کودک طبیعی را از هنگام تولد تا یک سالگی نشان می‌دهد^۱. وزن یک کودک تابعی از زمان است.



شکل ۱- نمودار تغیرات در وزن یک کودک طبیعی

۱- برای سادگی یک نمونه از نمودارهای واقعی ارائه شده است.

هنگامی که پژوهشکان می‌خواهند درباره رشد یک کودک اظهارنظر کنند، نمودار وزن او را با نمودار شکل (۱) مقایسه می‌کنند. در مقایسه نمودار وزن هر کودک با نمودار شکل (۱)، چهار وضعیت متفاوت ممکن است رخدده که در شکل (۲) نشان داده شده اند.



شکل ۲

فعالیت

جدول زیر نشان دهنده وزن یک کودک است که آن را پژوهش (یا مرکز بهداشتی) در پایان هر ماه طی یک سال، ثبت کرده است. این جدول یک تابع را نشان می‌دهد.

وزن (کیلوگرم)	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
زمان (ماه)	۲/۸	۳/۳	۴/۲	۵	۵	۵	۴/۸	۴/۵	۵/۵	۶/۵	۷/۲	۸	۸/۵

الف) به نظر شما در فاصله زمانی تولد تا سه ماهگی، رشد کودک با کدام یک از چهار وضعیت نشان داده شده در شکل (۲) مطابقت دارد؟ رشد مطلوب

ب) در چه فاصله زمانی ای وزن او ثابت مانده است؟ تا ۵ ماهگی

پ) اعداد داده شده در جدول را روی شکل (۱) مشخص کنید. نقاط به دست آمده را به یکدیگر وصل کنید تا نمودار جدیدی به دست آید. با مقایسه این نمودار با نمودار اصلی، رشد کودک از نظر وزن را در طی یک سال بررسی کنید.


وزن کودک در فاصله بین ماهها اندازه‌گیری نشده بود؛ ولی به کمک نموداری که رسم کرداید، می‌توانید وزن او را در فاصله بین ماهها نیز به صورت تقریبی تعیین کنید.

ت) دامنه و برد این تابع را به دست آورید و نمودار پیکانی آن را نیز رسم کنید.


$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\} \quad R = \{2/8, 3/3, 4/2, 5, 4/8, 4/5, 5/5, 6/5, 7/2, 8, 8/5\}$$

کار در کلاس

کدام یک از نمودارهای زیر یک تابع را نمایش می‌دهند؟ توضیح دهید.



تابع نیست



تابع است

می‌توانید نمایش زوج مرتبی نمودارهای بالا را بنویسید و به کمک آن تابع بودن یا تابع نبودن آنها را معلوم کنید. دامنه و برد هر کدام را که تابع است، مشخص کنید.


با تکمیل جمله زیر معیاری برای تشخیص تابع بودن یک رابطه که به صورت نمودار ارائه می‌شود، به دست آورید.

$$R = \{1, 2\}$$


اگر نمودار یک رابطه داده شده باشد، هنگامی این نمودار تابع است که هر خط موازی محور عرض‌ها، نمودار را حداقل در یک نقطه قطع کند.

از سال ۱۹۹۹، کمیسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل شصت سالگی را به عنوان آستانه سالماندی در نظر گرفته است که هر روز افراد بیشتری در جهان به آن می‌رسند. منظور از سالماندی جمعیت، افزایش نسبت تعداد افراد ۶۰ ساله و بالاتر به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت زیر ۱۵ سال است. طبق آمارهای سازمان ملل در سال ۲۰۱۲، در صورت ثبت وضعيت حاضر، کشور ایران در سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۳۰ شمسی) جزء پیترین کشورها خواهد بود و حدود ۳۰٪ جمعیت را افراد مسن تشکیل خواهند داد. این در حالی است که در زمان انتشار این آمار (۲۰۱۲)، کشور ما با نسبت سالماندی ۸٪ جزء جوان‌ترین کشورها بوده است. نتایج پیش‌بینی‌های اخیر سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ در مورد تحولات جمجمیت ایران تا ۱۰۰ سال آینده نشان می‌دهد که با ادامه روند کنونی سال ۱۴۸۰ جمعیت به حدود ۳۱ میلیون نفر با شاخص سالخوردگی ۴۷/۴ درصد کاهش خواهد یافت.


نمودار پیش‌بینی گروه سنی ۶۰ سال و بالاتر




نسبت جمعیت سالماند ایران در طی سال‌های سرشماری




کدام یک از نمودارهای زیر یک تابع را نمایش می‌دهند؟




تابع است




تابع است




تابع نیست




تابع است




تابع است




تابع است




تابع است



تابع است



تابع است




تابع نیست

تمرین

۱ کدام یک تابع است؟

دامنه و برد هر تابع را معلوم کنید.




تابع است


$$D = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R = \{2, 5\}$$

۱۰۵



تابع نیست



تابع است

$$D = \{1, 2, 0, -2, -1\}$$

$$R = \{4, 1, 0\}$$

۲ تابعی مثال بزنید که :

الف) دامنه آن تنها شامل دو عضو باشد. $\{(2,1), (3,4)\}$

ب) برد آن تنها از یک عضو تشکیل شده باشد. $\{(1,1), (2,1)\}$

پ) دامنه آن تنها یک عضو داشته باشد. $\{(5,1)\}$

ت) دامنه آن نامتناهی باشد، ولی برد آن تنها یک عضو داشته باشد. $\{(1,1), (2,1), (3,1), \dots\}$

ث) دامنه و برد آن نامتناهی باشند. $\{(1,1), (2,2), (3,3), \dots\}$

۳ جاهای خالی در جدول را کامل کنید و نمودار توابعی را که در جدول، توصیف شده‌اند، رسم کنید.





(الف)

(ب)

(پ)


(ت)

تابع	$f(x) = 2x$	$g(x) = 2x$	$h(x) = 2x$	$y = 2x$
دامنه	$\{1, 2, 3, 4\}$	مجموعه اعداد حقیقی	$[2, 3]$	مجموعه اعداد حقیقی نامنفی
برد	$\{2, 4, 6, 8\}$	مجموعه اعداد حقیقی	$[4, 6]$	مجموعه اعداد حقیقی نامنفی



۶۹- تابع خطی را مطالعه کنید

- ۱) یک شمع 2° سانتی‌متر ارتفاع دارد و در هر ساعت 4 سانتی‌متر آن می‌سوزد. پس از چند ساعت شمع خاموش خواهد شد؟ جدولی تنظیم کنید و در ساعات مختلف ارتفاع شمع را محاسبه کنید.



x (زمان)	y (ارتفاع شمع)
۰	۲۰
۱	۱۶
۲	۱۲
۳	۸
۴	۴
۵	۰

نمودار این تابع را رسم کنید.
چرا این تابع، یک تابع خطی است؟ زیرا نمودار آن، خط راست است.

- ۵) آیا خط $2 = x$ را می‌توان به عنوان یک تابع در نظر گرفت؟ چرا؟ خط $5 = y$ را چطور؟ در حالت کلی چه موقع یک خط را می‌توان یک تابع نیز در نظر گرفت؟ خیر زیرا موازی محور عرض هاست و خط موازی این محور این خط را در بیش از یک نقطه قطع می‌کند.

- ۶) نمایش جبری سه تابع خطی را بنویسید که دامنه آن بازه $[-3, 5]$ باشد. چه تعداد از این گونه توابع وجود دارند؟ هر تعداد که بخواهیم.


$$f(x) = 2x + 4, D_f = [-3, 5]$$

$$g(x) = x - 3, D_g = [-3, 5]$$

$$h(x) = -3x + 2, D_h = [-3, 5]$$


- ۷) نمایش جبری تابع زیر را که نمودار آن ارائه شده است، به دست آورید.

از بین نمایش‌های مختلفی که برای این تابع می‌دانید، کدام یک مناسب‌تر است؟ نمایش جبری



$$f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

- ۸) جدول زیر دمای سنگ‌ها در عمق‌های متفاوت زیر سطح زمین را نشان می‌دهد.



عمق (کیلومتر)	دما (سانتی‌گراد)
۱	۵۵
۲	۹۰
۳	۱۲۵
۴	۱۶۰
۵	۱۹۵
۶	۲۳۰


الف) توضیح دهید که چرا این جدول یک تابع را به دست می‌دهد. نمودار آن را رسم کنید. زیرا اعداد سطر اول تکراری نیستند.

ب) معادله‌ای برای این تابع به دست آورید.

$$f(x) = 35x + 20.$$

پ) دمای یک سنگ را که در عمق 10° کیلومتری زیرزمین است، بیابید.


$$f(10) = 35 \times 10 + 20 = 370.$$




- ۹) الف) تابع $f(x) = -3$ را رسم کنید و مقادیر $(2)f$ و $(10)f$ و $(-5)f$ و $(\sqrt{5})f$ و $(\frac{3}{4})f$ را به دست آورید.
چون تابع ثابت است، تمام مقادیر برابر -3 است.

ب) اگر دامنه این تابع مجموعه اعداد حقیقی باشد، نمودار تابع را رسم کنید. همان شکل فوق

پ) نمودار این تابع را وقتي که دامنه آن بازه $[-2, 5]$ باشد، نیز رسم کنید.



۱۰ برای یک تابع خطی می‌دانیم که: $f(2) = 11$ و $f(0) = 7$. نمودار این تابع را رسم کنید.



۱۱ آیا جدول زیر یک تابع را نشان می‌دهد؟ چرا؟ زیرا اعداد سطر اول تکراری نیستند.

x	1	2	3	4	5	6
y	1	4	9	15	25	36


۱۲ علی در هر دقیقه پیاده روی، مسافت $1/\text{دیگر}$ کیلومتر را طی می‌کند. اگر مسافتی را که علی در t دقیقه طی می‌کند، با $f(t)$ نمایش دهیم، کدام عبارت نمایش جبری این تابع را به دست می‌دهد؟ قسمت ب

(الف) $f(t) = t - 1$

(ب) $f(t) = 1/t$

(پ) $f(t) = t + 1$

(ت) $f(t) = 1/t - 1$



۱۳ اگر درباره تابع g داشته باشیم: $g(-2) = \frac{1}{3}$, $g(0) = 3$, $g(1) = 5$, $g(2) = 2$; $g(4) = \frac{1}{5}$ ، $g(6) = \frac{1}{2}$ ؛ g را به صورت مجموعه‌ای از زوج بنویسید و نمودار آن را رسم کنید.

۱۴ برای اندازه‌گیری دما از واحدهای «سانتی‌گراد C» و «فارنهایت F» استفاده می‌شود که با رابطه $F = \frac{9}{5}C + 32$ به یکدیگر وابسته‌اند.

الف) -2° درجه سانتی‌گراد، چند درجه فارنهایت است؟ 4° درجه

$$F = \frac{9}{5}C + 32 \rightarrow F - 32 = \frac{9}{5}C \rightarrow 5(F - 32) = 9C$$

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

ب) 40° درجه فارنهایت چند سانتی‌گراد است؟ 40 سانتی‌گراد


پ) معادله‌ای بنویسید که سانتی‌گراد را بر حسب فارنهایت به دست دهد.

ت) آیا رابطه بین این دو واحد، یک تابع خطی را معلوم می‌کند؟ بله، یک تابع خطی است.

۱۵ طول یک مستطیل 3 واحد بیشتر از عرض آن است. رابطه‌ای ریاضی بنویسید که محیط این مستطیل را بر حسب تابعی از عرض آن $P = 2(x + y) = 2(x + 3 + x) = 2(2x + 3) = 4x + 6$ بیان کند.

۱۶ دو تابع مثال بزنید که دامنه و برد آنها یکی باشد، ولی هیچ دو زوج مرتب مشترکی نداشته باشند.

۱۷ نمودار تابعی را رسم کنید که دامنه آن $[2, 0]$ و برد آن $[1, -2]$ باشد. چه تعداد از این گونه توابع می‌توان رسم کرد؟ هر تعداد که بخواهیم.



حل ۱۷:

$$\begin{aligned} f &= \{(2, 1), (3, 4)\} \\ g &= \{(3, 1), (2, 4)\} \end{aligned}$$

درس سوم: انواع توابع

انواع متفاوتی از توابع وجود دارند. در این درس با برخی از آنها آشنا می شویم.

فعالیت

۱ جدول های زیر را کامل کنید.

طول ضلع مربع	۰/۱	$\frac{1}{2}$	۱	۳	۴	$\frac{2}{5}$	۱۰	۱۲	x
مساحت آن	$0/01$	$0/25$	۱	۹	۱۶	$6/25$	۱۰۰	۱۴۴	x^2

شعاع دایره	$\frac{1}{2}$	۲	۳	۵	۱۰	r
مساحت آن	$\frac{\pi}{4}$	4π	9π	25π	100π	$r^2\pi$

اگر x طول ضلع یک مربع باشد، مساحت آن تابعی از $x = x^2\pi$ قابل نمایش است.

اگر r شعاع یک دایره باشد، مساحت دایره تابعی از $r = r^2\pi$ است و به صورت $r = g(r)$ قابل نمایش است.

چون f و g به صورت یک چند جمله‌ای درجه دوم به ترتیب از x و r بیان شده‌اند، آنها را تابع درجه دوم می‌نامیم.

حجم یک کره را برحسب یک تابع درجه سوم از r (شعاع کره) بنویسید :

$$V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$$

تابعی را که نمایش جبری آنها، چند جمله‌ای‌های جبری از یک متغیر هستند، تابع چند جمله‌ای می‌نامیم.

تابع زیر همگی توابع چند جمله‌ای‌اند :

$$f(x) = 2x^3 + 5x + 1$$

$$g(x) = 4x^2 - 3$$

$$h(a) = a^3 + 2a^2 - 4a - 9$$

$$r(t) = -\frac{3}{5}t^4 + t + \sqrt{-}$$

تابع f را به صورت $y = 2x^3 + 5x + 1$ نیز نمایش می‌دهند. بقیه توابع را نیز به این صورت نمایش دهید.

شباهت: هر عدد دامنه به همان عدد نسبت داده می‌شود.

دامنه و برد توابع زیر را بدست آورید. این سه تابع چه شباهت و چه تفاوتی با هم دارند؟ تفاوت: دامنه‌ها و در نتیجه بردّها متفاوت هستند.



$$D = \left\{ 1, \sqrt{2}, -\frac{3}{4}, 5 \right\}$$

$$R = \left\{ 1, \sqrt{2}, -\frac{3}{4}, 5 \right\}$$

$$f = \{(a,a), (b,b), (c,c)\}$$

$$D_f = \{a, b, c\}$$

$$R_f = \{a, b, c\}$$



$$D = \mathbb{R}$$

$$R = \mathbb{R}$$

اگر دامنه و برد یک تابع برابر باشند و هر عضو از دامنه تابع دقیقاً به همان عضو در برد نظیر شود، تابع را همانی می‌نامند.



اگر دامنه تابع همانی را \mathbb{R} در نظر بگیریم، نمودار آن همان خط $y = x$ است که با معادله $f(x) = x$ هم نمایش داده می‌شود.

۳ سه تابع زیر را با هم مقایسه کنید و دامنه و برد آنها را بنویسید. این سه تابع در چه ویژگی‌ای مشترک‌اند؟ در هر سه تابع، اعضای دامنه به یک عدد ثابت نسبت داده می‌شود.

ساعت	۸	۹	۱۰
دماهی هوا	۱۹	۱۹	۱۹
D	$\{8, 9, 10\}$		
R	$\{19\}$		

$$D = \{8, 9, 10\}$$

$$R = \{19\}$$



$$D = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

$$R = \{-1\}$$

تابعی مانند f را که برد آن تنها شامل یک عضو است، تابع ثابت می‌نامیم. اگر این عضو را k بنامیم، تابع ثابت را معمولاً با

معادله $f(x) = k$ نمایش می‌دهیم.

کار در کلاس

۱ برای هر مورد مثالی به دلخواه ارائه کنید.

مثالی از یک تابع چند جمله‌ای ارائه کنید.

یک تابع همانی مثال بزنید که دامنه آن $\{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ باشد.

یک تابع مثال بزنید که دامنه و برد آن برابر باشند؛ ولی تابع همانی نباشد.

مثالی از یک تابع ثابت ارائه کنید که دامنه آن ۵ عضوی باشد.

مثالی از تابع ثابت در دنیای واقعی ارائه کنید.

$$y = 2x^3 - 3x^2 + x - 4$$

$$\{(\alpha, \alpha), (\beta, \beta), (2, 2), (5, 5)\}$$


$$\{(1, 3), (3, 1)\}$$

$$\{(4, 1), (3, 1), (-2, 1), (2, 1), (5, 1)\}$$



تابعی که دامنه اش افراد یک کلاس درس پایه دهم باشند و بردش دبیر ریاضی آن کلاس باشد.

نمودارهای توابع داده شده را رسم و با یکدیگر مقایسه کنید.


۱۲ نمودارهای توابع داده شده را رسم و با یکدیگر مقایسه کنید. نمودار تابع h رسم شده است. جدول را کامل کنید.



تابع	$f(x) = x^r$	$g(x) = x^r$	$h(x) = x^r$	$t(x) = x^r$
دامنه	$\{-2, 0, 1, 2\}$	$[-2, 3]$	مجموعه اعداد حقیقی منفی	مجموعه اعداد حقیقی
برد	$R = \{4, 1\}$	$[0, 9]$	$(0, +\infty)$	$[0, +\infty)$




دامنه و برد را روی شکل نیز نشان دهید.



تذکر : اگر نمایش جبری تابع داده شده باشد؛ ولی دامنه آن مشخص نشده باشد، معمولاً بزرگترین مجموعه ممکن را دامنه درنظر می‌گیریم. مثلًاً دامنه تابع $x^r = f(x)$ را مجموعه اعداد حقیقی درنظر می‌گیریم. در غیر این صورت باید دامنه را به طور دقیق مشخص کنیم.

فعالیت

جدول زیر تابعی را نشان می‌دهد که اعداد داده شده را به قدر مطلق آن نظیر می‌کند. جاهای خالی را پر و نمودار تابع را رسم کنید. دامنه و برد این تابع را معلوم کنید. دامنه این تابع اعداد سطر اول و برد آن اعداد سطر دوم جدول زیر می‌باشند.




x	-2	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	5
f(x)	2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	5

تابعی که هر مقدار در دامنه را به قدر مطلق آن در برد نظیر می‌کند، تابع قدر مطلق نامیده می‌شود. تابع قدر مطلق را با $f(x) = |x|$ یا $y = |x|$ نمایش می‌دهند.

اگر دامنه یک تابع قدرمطلق مجموعه **اعداد حقیقی** باشد، نمودار آن را رسم کنید.

$$\text{تابع قدرمطلق را به صورت } f(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases} \text{ نیز نمایش می‌دهند.}$$

با توجه به اینکه برای $x \geq 0$ و $x < 0$ تابع دارای معادله‌های مختلفی است، این تابع یک تابع چند ضابطه‌ای (قطعه‌ای) نامیده می‌شود.




مثال

تابع مقابله نیز یک تابع قطعه‌ای است.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x - 3 & x < 0 \end{cases}$$

نمودار این تابع برای اعداد مثبت همان نمودار سهمی $y = x^2$ است و برای اعداد منفی نمودار تابع با نمودار خط $y = -x - 3$ برابر است. نمودار $f(x)$ در شکل مقابله رسم شده است.




فعالیت

تابع f , g و h نیز قسمتی از نمودارهای آنها داده شده‌اند. نمودارها را کامل و مشخص کنید هر نمودار به کدام تابع تعلق دارد؟ دامنه و برد هر تابع را نیز مشخص کنید.

$$f(x) = \begin{cases} -1 & x > 0 \\ 2 & x < 0 \end{cases}$$

$$h(x)$$



$$D_h = (-\infty, -1) \cup [2, \infty]$$


$$R_h = [-1, 2]$$

$$f(3) = -1 \quad g(-2) = 2 \quad f\left(-\frac{1}{5}\right) = 2$$

$$h(\sqrt{5}) = 2\sqrt{5} \quad g(\cdot) = \cdot$$

$$g(x) = \begin{cases} x - 4 & x > 1 \\ \frac{5}{2} & x = 1 \\ -x & -4 \leq x < 1 \end{cases}$$

$$f(x)$$




$$D_g = [-4, +\infty)$$

$$R_g = [-4, +\infty)$$

مقادیر $f(3)$, $g(-2)$ و $h(\sqrt{5})$ را باید.


$$h(x) = \begin{cases} 2x & 2 \leq x \leq 3 \\ 5 & x < -1 \end{cases}$$

$$g(x)$$



$$D_g = [-4, +\infty)$$

$$R_g = [-4, +\infty)$$



$$\begin{array}{ll} D_f = \mathbb{R} & D_g = \mathbb{R} \\ R_f = \mathbb{R} & R_g = (-1, +\infty) \end{array}$$

۱ نمودار تابع‌های زیر را رسم و دامنه و برد آنها را مشخص کنید.


$$f(x) = \begin{cases} x^3 & x > 0 \\ 3x+1 & x \leq 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 2x-5 & x > 2 \\ 1 & -3 < x \leq 2 \\ -\frac{1}{2}x & x \leq -3 \end{cases}$$

مقادیر $f(0)$, $f(5)$, $g(2)$, $g(-2)$ را به دست آورید.

$$\begin{array}{lll} f(0) = 1 & g(0) = 1 & g\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 \\ f(5) = 25 & g(2) = 1 & f(-2) = -5 \end{array}$$

۲ نمودار تابع قطعه‌ای f داده شده است. ضابطه آن را به دست آورید. دامنه و برد این تابع را به دست آورید.

$$f(x) = \begin{cases} 2x & -2 \leq x \leq 0 \\ 1 & 0 < x < 2 \\ -x+4 & 2 \leq x \end{cases}$$




$$\begin{array}{l} D_f = [-2, +\infty) \\ R_f = [-4, 2] \end{array}$$

رسم بوخی توابع به کمک انتقال

فعالیت

نمودارهای توابع $f(x) = 2x$, $g(x) = |x|$, $h(x) = x^3$, $f(x) = 2x+3$, $g(x) = |x|+3$, $h(x) = x^3+3$ و $f(x) = 2x-3$, $g(x) = |x|-3$, $h(x) = x^3-3$ را به دست آورید. سپس تابع $y = 2x - \frac{3}{4}$ را به کمک سه تابع آخر چگونه رسم کنید.




با داشتن نمودار تابعی مانند $f(x)$ ، می‌توان نمودار تابع $f(x) + k$ را با انتقال نمودار $f(x)$ به اندازه k واحد در امتداد محور y ها به دست آورد. اگر $k > 0$ باشد انتقال در جهت مثبت و اگر $k < 0$ باشد انتقال در جهت منفی خواهد بود.

کار در کلاس

- ۱ در شکل زیر دامنه و برد توابعی را که به کمک تابع $|x| = f(x)$ رسم شده‌اند، بیابید. آیا می‌توانید توضیح دهید نمودار این توابع چگونه رسم شده‌اند؟
- برای رسم نمودار تابع $|x - 3|$ را به اندازه ۳ واحد در راستای محور طول‌ها در جهت راست انتقال می‌دهیم و برای رسم نمودار تابع $|x + 4|$ را به اندازه ۴ واحد در راستای محور طول‌ها در جهت چپ انتقال می‌دهیم.

$$D = \mathbb{R}$$

$$R = [0, +\infty)$$



برای رسم نمودار تابع $f(x+k)$ کافی است نمودار تابع $f(x)$ را به اندازه k واحد در امتداد محور x ها انتقال دهیم. اگر $k > 0$ باشد، انتقال در جهت منفی و اگر $k < 0$ باشد، انتقال در جهت مثبت خواهد بود.



- ۲ در شکل‌های زیر به کمک نمودار تابع x^2 و $-x^2$ نمودار توابع $f(x) = x^2 + 2$ و $f(x) = -x^2 - 2$ رسم شده‌اند. دامنه و برد آنها را بیابید. نمودار

$$D = \mathbb{R}$$

$$R = [0, +\infty)$$




$$D = \mathbb{R}$$

$$R = (-\infty, 0]$$



کار در کلاس

نمودارهای توابع



در شکل های زیر نمودار توابع درجه دوم f , g , h و t رسم شده اند.

$$f(x) = (x-5)^2 - 2$$

$$g(x) = (x+1)^2 - 1$$

$$h(x) = (x-3)^2 + 1$$

$$t(x) = -(x+1)^2 + 3$$

الف) هر یک از نمودارها کدام تابع را نشان می دهند؟


ب) دامنه و برد هر یک از این توابع را به دست آورید :

$$g(x)$$

$$t(x)$$


$$f(x)$$

$$h(x)$$




$$D_g = \mathbb{R}$$

$$R_g = [-1, +\infty)$$




$$D_t = \mathbb{R}$$

$$R_t = (-\infty, 3]$$



$$D_f = \mathbb{R}$$

$$R_f = [-2, +\infty)$$




$$D_h = \mathbb{R}$$


$$R_h = [1, +\infty)$$

تمرین


- ۱ تابع $y = -x^2 - 1$ را دامنه آن مجموعه $\{-1, 0, 1\}$ است، رسم نماید. برای این تابع را به دست آورید و نمایش زوج مرتبی و نموداری آن را ارائه دهید. اگر دامنه این تابع \mathbb{R} باشد، پاسخ ها چگونه خواهد بود؟ برد نیز اعداد حقیقی خواهد بود. پیکاری آن را در بالای همین صفحه است.
- ۲ در شکل های زیر نمودار تعدادی از توابع رسم شده اند. دامنه و برد هر یک از این توابع را به کمک نمودار آنها مشخص کنید. در هر مورد که امکان دارد، دامنه و برد را به صورت یک بازه نمایش دهید. نمایش جبری توابع (الف) و (ج) را بنویسید.




(الف)




(ب)




(پ)



(ت)



(ث)



(ج)

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x - 1 & -2 \leq x \leq 0 \\ x - 1 & 0 < x \leq 2 \end{cases}$$


۳ درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را بررسی کنید.

- الف) دامنه تابع $f(x) = x^3 - 1$ برابر $(-\infty, +\infty)$ و بُرد آن نیز $(-\infty, +\infty)$ است. نادرست
- ب) دامنه تابع $f(x) = |x| - \frac{1}{x}$ همه اعداد حقیقی و بُرد آن $(-\infty, +\infty)$ است. نادرست
- پ) دامنه تابع ثابت $f(x) = 2$ برابر $(-\infty, +\infty)$ است. درست

ت) اگر $f(1) = \frac{f(2)}{2}$ آنگاه، $f(x) = 2x + 1$. نادرست

- ۴ یک تانکر گاز از یک استوانه و دو نیم کره به شعاع r در دو انتهای استوانه، تشکیل شده است. اگر ارتفاع استوانه 30 متر باشد، حجم $V = \frac{4}{3}\pi r^3 + 2\pi r^3$ تانکر را بر حسب تابعی از t بنویسید.

۵ هریک از نمودارهای زیر کدام یک از تابع‌های (الف) تا (ر) را نمایش می‌دهد؟ دامنه و برد این توابع چیست؟



الف) $y = x^3 - 2$

ث) $y = (x + 1)^3$

خ) $y = -|x| - 2$

ب) $y = -x^3 + 2$

ج) $y = |x| - \frac{1}{2}$

د) $y = (x - 2)^3 + 3$

پ) $y = |x|$

چ) $y = |x - 2|$

ذ) $y = |x| - 2$

ت) $y = -|x|$

ح) $y = -(x + 2)^3$

ر) $y = (x + \frac{1}{2})^3 - 3$


$$\begin{array}{ll} [0, 16] & - \\ [-2, 0] & - \\ [-5, -2] & - \\ [-25, 0] & - \\ [0, 4] & - \\ [-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}] & - \\ [-\frac{37}{4}, 0] & - \\ [-2, 0] & - \end{array}$$

۶ فرض کنیم دامنه هریک از توابع تمرین ۵ به بازه $[2, 3]$ محدود شده باشد. در این صورت برد هر تابع را پیدا کنید. از نمودارها کمک بگیرید.


۷ نمودار تابع f داده شده است. ضابطه این تابع را بنویسید و مقادیر خواسته شده را حساب کنید. تعریف نشده:

$$f(\sqrt{5}) = 4\sqrt{5} - 8 \quad f(3) = 4 \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{8}$$

$$f(\cdot) = \frac{3}{2} \quad f\left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2}$$



$$f(x) = 3, \quad f(-4) = 3, \quad f(-1) = 3$$




۸ نمودار یک تابع خطی از نقاط $(4, 3)$ و $(3, 0)$ می‌گذرد. $f(-4)$ و $f(-1)$ را به دست آورید.

۹ هزینه مکالمه تلفنی با کشور دیگر، از زمان برقراری تماس برای ۳ دقیقه یا کمتر، ۲ هزار تومان است و پس از آن برای هر دقیقه یک هزار تومان به هزینه آن اضافه می‌شود. مثلاً برای زمان پیشتر از ۳ دقیقه تا دقیقاً ۴ دقیقه، ۳ هزار تومان دریافت می‌شود. نمودار هزینه را بر حسب زمان تا پایان زمان ۶ دقیقه رسم کنید.

۱۰ کدامیک از معادله‌های زیر یک تابع را نمایش می‌دهد؟ چرا؟ نمودار هر دو معادله را رسم کنید. $f(x)$ تابع نیست زیرا اگر خطی به موازات محور عرض ها رسم کنیم، نمودار را در بیش از یک نقطه قطع می‌کند.

$$f(x) = \begin{cases} x & x > 0 \\ x + 2 & x \leq 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 2x & x < 0 \\ x + 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

۱۱ الگوی زیر از تعدادی ذوزنقه تشکیل شده است.



الف) جدول زیر را کامل کنید.

تعداد ذوزنقه‌ها	۱	۲	۳	۴	۵	n
محیط شکل	۵	۸	۱۱	۱۴	۱۷	$3n+2$

ب) چرا رابطه بین تعداد ذوزنقه‌ها و محیط شکل، یک تابع را معلوم می‌کند؟ دامنه و برد این تابع چیست؟ نمودار آن را رسم کنید زیرا سطر اول، اعداد تکراری ندارد. دامنه اعداد سطر اول و برد اعداد سطر دوم است.

۱۲ نمودار تابعی، یک سهمی است که از نقاط $(-2, 1)$ و $(1, 2)$ می‌گذرد و محور y را در نقطه‌ای به عرض ۱ قطع می‌کند. نمایش جبری این تابع را بیابید و نمودار آن را رسم و دامنه و برد تابع را مشخص کنید.

$$y = x^2 - 4x + 1$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$R = [-3, +\infty)$$

