

[nomrebartar.com](http://nomrebartar.com)

نمراه برتر، یک سایت آموزشی متفاوت

# جبر و معادله

## فصل

- ۱ مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی
- ۲ معادلات درجه دو
- ۳ معادلات گویا و گنگ
- ۴ قدر مطلق و ویژگی‌های آن
- ۵ آشنایی با هندسه تحلیلی



آرامگاه دانیال نبی در شهر شوش از استان خوزستان. این آرامگاه دارای گنبدی مخروطی به سبک اورجین (گنبد مخروطی بلده‌ای سکل) است که کنگره‌های روی بلده‌ها تشکیل یک دنباله حسابی می‌دهند.

گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

## مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی



درس

در سال قبل با مفهوم دنباله و دنباله‌های حسابی و هندسی آشنا شدید و می‌دانید که مجموعه اعداد طبیعی  $1, 2, 3, \dots$  یک دنباله حسابی با قدر نسبت یک می‌باشد. چگونگی به دست آوردن مجموع اعداد طبیعی  $1 + n$  می‌تواند الگوی مناسبی باشد تا به یک دستور برای محاسبه مجموع جملات هر دنباله حسابی برسیم.

### فعالیت

تعدادی دگمه داریم که به شکل رو به رو آرایش شده‌اند. تعداد این دگمه‌ها چندتاست؟

۱ یکی از راه‌ها، شمارش تعداد دگمه‌ها در هر ردیف است که مجموع آن برابر است با :

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55$$

۲ راه دیگر استفاده از شهود و تجسم، با استفاده از شکل پایین، است.

در این شکل تعداد ردیف‌ها  $10$  و تعداد دگمه‌های در هر ردیف  $10$  است، پس تعداد کل دگمه‌ها برابر  $100$  است و چون تعداد دگمه‌های آنی و قرمز برابر است پس :

$$\text{تعداد کل دگمه‌ها} = \frac{100}{2} = 50$$

۳ برای محاسبه مجموع اعداد طبیعی  $1 + n$  مراحل زیر را انجام داده‌ایم. چگونگی هر مرحله را توضیح دهید.

$$\begin{aligned} S &= 1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n \\ S &= n + (n-1) + \dots + 3 + 2 + 1 \\ 2S &= \underbrace{(n+1) + (n+1) + \dots + (n+1) + (n+1)}_{n \text{ تا}} \end{aligned}$$
$$2S = n(n+1)$$

$$S = \frac{n(n+1)}{2}$$

این اعداد طبیعی  $1 + n$  را نشانه می‌نماییم و ترتیب صعودی سینه  $n$  تا را نشانه می‌نماییم. مجموع این اعداد  $n + 1$  تا داشتند حال

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

فصل اول: جبر و معادله ۳

$$1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

مثال: روی محیط دایره‌ای  $20$  نقطه متمایز قرار دارد. از هر نقطه به نقاط دیگر وصل می‌کنیم. تعداد کل وترهای تشکیل شده را به دست آورید.

حل: نقطه اول را به هر یک از نقاط دیگر وصل می‌کنیم در این صورت  $19$  وتر پیدا می‌آید. با وصل نقطه دوم به نقاط دیگر (به غیر از نقطه اول)  $18$  وتر به دست می‌آید. سپس نقطه سوم را به نقاط دیگر غیر از نقاط اول و دوم وصل می‌کنیم.  $17$  وتر حاصل می‌شود. با ادامه این عمل تعداد وترهای حاصل برابر است با:

$$19 + 18 + 17 + \dots + 2 + 1 = \frac{19}{2} (1+19) = 190$$

تذکر: این مسئله را با استفاده از ترکیبیات نیز می‌توان حل کرد. آن را حل کرده و دو روش را با هم مقایسه کنید.

## فعالیت

### حواله‌دنی

در ریاضیات آنچه مهم است فکر کردن، استدلال کردن و تیجه گرفتن است. ریاضیات راهی برای اندیشیدن و روشی برای استدلال و درست فکر کردن است. استدلال وسیله‌ای است که به کمک آن می‌توان از روی اطلاعاتی که داریم حقایقی را کشف کنیم. البته ریاضیات به تعریف و مشاهده نیز مربوط می‌شود، ولی قسمت اعظم آن همان اندیشیدن، استدلال کردن و تیجه گرفتن است. زمانی که گاوی ریاضیدن آلمانی ده ساله بود، روزی معلم از داش آموزان کلاس خواست مداد و کاغذ بزدarnد و حاصل جمع اعداد  $1+2+3+\dots+99+100$  را به دست آورند. چند دقیقه نگذشته بود که معلم، گاوی را دید که به کار دیگری مشغول است. از او پرسید: چرا مسئله را حل نمی‌کنی؟ او جواب داد: حل شده! معلم با تعجب گفت: این غیر ممکن است. ولی گاوی گفت: خوبی هم آسان بود. سپس گفت: اول چنین نوشتم:

دنباله حسابی زیر را، که در آن  $a$  جمله اول،  $d$  قدر نسبت و  $n$  تعداد جملات آن است، در نظر بگیرید.

$$a, a+d, a+2d, \dots, a+(n-2)d, a+(n-1)d$$

مجموع جملات این دنباله را  $S_n$  می‌نامیم و می‌نویسیم:

$$S_n = a + (a+d) + (a+2d) + \dots + (a+(n-2)d) + (a+(n-1)d)$$

حال، جملات  $S_n$  را از آخر به اول بنویسید و با جمع جملات متناظر دو عبارت

آخر،  $2S_n$  را به دست آورید. نتیجه خواهد گرفت:

$$\begin{aligned} S_n &= a + (a+d) + \dots + (a+(n-1)d) \\ S_n &= a + (n-1)d + a + (n-2)d + \dots + a \\ 2S_n &= (2a + (n-1)d) + (2a + (n-2)d) + \dots + (2a + (n-1)d) \\ 2S_n &= n[2a + (n-1)d] \end{aligned}$$

مثال: مجموع صد جمله اول دنباله حسابی  $3, 7, 11, 15, \dots$  را به دست آورید.

حل: جمله اول  $3$ ، تعداد جمله‌ها  $100$  و قدر نسبت جملات  $4$  است. با استفاده از فرمول مجموع جملات دنباله حسابی می‌توان نوشت:

$$S_{100} = \frac{100}{2} [(2 \times 3) + (99 \times 4)] = 50 \times 402 = 20100$$

و بعد چنین:

$$100 + 99 + 98 + 97 + \dots + 3 + 2 + 1$$

و جفت جفت از اول تا آخر جمع کردم:

$$100 + 100 + 100 + \dots + 100 + 100 + 100$$

بدین ترتیب  $100$  تا عدد  $100$  به دست آوردم که حاصل ضرب آنها  $100^2$  می‌شود و جون دو بار مجموع  $100$  صد را حساب کردم عدد  $100$  را بر دو تقسیم کردم و  $50^2$  به دست آمد. بنابراین حاصل جمع اعداد  $100$  برابر  $50^2$  می‌شود.

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۴

## کاردر کلاس


۱ نشان دهید در یک دنباله حسابی اگر  $a_1$  و  $a_n$  به ترتیب جملات اول و آخر باشند آنگاه:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \quad S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = \frac{n}{2}[a + \frac{a + (a + (n-1)d)}{a_n}] = \frac{n}{2}[a + a_n]$$

۲ مجموع همه عددهای طبیعی دو رقمی مضرب ۴ را بدست آورید.

$$\text{ا} \quad \text{ا}_n \quad 12, 14, 20, \dots, 94 \quad n = \frac{94 - 12}{4} = 22 \quad S_n = \frac{22 \times [12 + 94]}{2} = 1188$$

✳ منال: در یک مسابقه تعداد بسیاری توپ روی یک خط مستقیم و هریک به فاصله ۳ متر از هم قرار دارند. فاصله توپ اول تا سبد نیز ۳ متر است (شکل زیر). دونده‌ای باید از کنار سبد شروع کرده توپ اول را بردارد و آن را تا سبد حمل کند و به سبد بیندازد، سپس به طرف توپ بعدی بدد و آن را بردارد و به داخل سبد بیندازد و این کار را ادامه دهد. اگر این دونده در پایان ۹۱۸ متر دویده باشد؛ حساب کنید او جمیعاً چند توپ در سبد انداخته است؟



✳ حل: دونده برای برداشتن توپ اول و قرار دادن آن در سبد باید مسافت  $3+3=6$  متر را طی کند؛ برای توپ دوم نیز باید ۱۲ متر و برای توپ سوم ۱۸ متر و ... طی کند. بنابراین مسافت‌های طی شده در این مراحل، تشکیل یک دنباله حسابی با جمله اول ۶ و قدر نسبت ۲ می‌دهد. اگر  $n$  تعداد توپ‌های انداخته شده در سبد باشد از فرمول مجموع جملات دنباله حسابی داریم:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$$

$$918 = \frac{n}{2}(12 + (n-1)6) \Rightarrow 3 \cdot 6 = n(n+1) \Rightarrow 17 \times 18 = n(n+1) \Rightarrow n = 17$$

## مجموع جملات دنباله هندسی

### فعالیت

۱ قدر نسبت و مجموع  $n$  جمله اول دنباله هندسی زیر را بدست آورید. ( $a \neq 0$ )

$$a, a, a, \dots, a$$

$$q=1 \quad S_n = na$$

۲ دنباله هندسی زیر را در نظر بگیرید. ( $q \neq 1$ )

$$a, aq, aq^2, \dots$$

$$\alpha_n = aq^{n-1}$$

الف) جمله  $n$ ام دنباله چیست؟

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

فصل اول: جبر و معادله ۵

ب) فرض می‌کنیم مجموع  $n$  جمله اولیه دنباله هندسی  $S_n$  باشد:

$$S_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + aq^n$$

طرفین رابطه را در  $q$  ضرب می‌کنیم:

$$S_n q = aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + aq^n$$

اگر  $q$  را تشكیل دهیم، پس از ساده‌سازی، نتیجه می‌گیریم:

$$S_n = a \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

کارد کلاس

مجموع ۱۰ جمله اول دنباله هندسی زیر را به دست آورید.

$$S = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} + \dots + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}$$

مثال: برای محافظت از تابش خط‌ناک مواد رادیواکتیویته لایه‌های محافظتی وجود دارد که شدت تابش پرتوها پس از عبور از هر یک از آنها نصف می‌شود. حداقل چند لایه باید استفاده کنیم تا شدت تابش مواد خط‌ناک دست کم ۹۷ درصد کاهش باید؟

حل: اولین لایه، شدت تابش را نصف می‌کند. دومین لایه باز این تابش را نصف می‌کند  $(\frac{1}{2})$  و ... بدین ترتیب دنباله‌ای از اعداد به دست می‌آید:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$$

این یک دنباله هندسی با قدر نسبت  $\frac{1}{2}$  است. حال می‌خواهیم بدانیم چند جمله از این دنباله باید جمع شود تا حاصل حداقل ۹۷ درصد شود.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} \geq \frac{97}{100}$$


$$\frac{1}{2} \times \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}} \geq \frac{97}{100} \Rightarrow 1 - \frac{1}{2^n} \geq \frac{97}{100}$$

$$\frac{1}{2^n} \leq \frac{3}{100} \Rightarrow 2^n \geq \frac{100}{3} \approx 33,3$$

با آزمایش اعداد طبیعی در نامعادله اخیر، و اینکه  $2^5 = 32$  درمی‌باییم که حداقل  $n$  برقراری نامساوی فوق برابر با ۶ خواهد بود. پس تعداد لایه‌ها باید

حداقل شش تا باشد.

رویس تصویری



## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

$$\frac{1(1-2^{48})}{1-2} = 2^{48} - 1 = 2936073709814118$$

کار در کلاس

در داستان مخترع سطرنج اگر در خانه اول یک دانه گندم و در خانه دوم دو دانه گندم و به همین صورت در هر خانه دو برابر خانه قبلی گندم قرار دهیم و اگر هر دانه گندم را یک گرم در نظر بگیریم :


(الف) این جایزه چند گرم می شود؟  $2^{48}$

(ب) نشان دهید جایزه او بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تُن خواهد شد.  $2^{48} > 1000$  میلیارد تُن برابر است با  $10^{14}$  لتر

$$\alpha=1 \quad q=2 \quad n=48 \quad S_n = \alpha \left( \frac{1-q^n}{1-q} \right) \rightarrow 1 \left( \frac{1-2^{48}}{1-2} \right) = S_{48}$$

$$S_{48} = 2^{48} - 1 > 2^{48} = (2^7)^7 > 100^7 = 10^14$$

تمرین



در دنباله حسابی  $\dots, 11, 8, 5, 2, 0$  چند جمله آن را با هم جمع کیم  
 $a=2$   $s_n > 293$   $n=48$   $\Delta = 11881$   
 $d=3$   $n_1 = 7$   $n_2 = 17$   $n = 18$   
تا حاصل آن از ۴۹۳ بیشتر شود؟

(الف) به کمک شکل رو به رو حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$$

(ب) اکنون با استفاده از فرمول درستی جواب خود در قسمت الف را بررسی کنید.

صحیح

(۳) مجموع همه اعداد طبیعی سه رقمی که مضرب شش هستند چقدر می شود؟ **صحیح**

(۴) در ۲۰ جمله اول یک دنباله حسابی مجموع جملات شماره های فرد ۱۳۵ و مجموع جملات شماره های زوج ۱۵ می باشد.  
جمله اول و قدر نسبت دنباله را مشخص کنید. **صحیح**

(۵) جمله عمومی یک دنباله به صورت  $a_n = 2^{n-1}$  است. چند جمله از این دنباله را با هم جمع کیم تا مجموع آنها برابر ۲۵۵ شود؟ **صحیح**

(۶) طول ضلع مربعی یک متر است. ابتدا نیمی از مساحت مربع را رنگ می کنیم. سپس نیمی از مساحت باقیمانده را و به همین ترتیب در هر مرحله نیمی از مساحت باقیمانده از قبل را رنگ می کنیم. پس از دست کم چند مرحله حداقل ۹۹ درصد سطح مربع رنگ شده است؟ **صحیح**

(۷) برای عدد حقیقی  $a \neq 1$  و عدد طبیعی  $n$  :

(الف) حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

$$1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1}$$

(ب) با استفاده از قسمت الف نتیجه بگیرید که :

$$a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + \dots + a^2 + a + 1)$$

۱- این مسئله به نام مسئله شترنج معروف است و ابو ریحان بیرونی با روش خاص خود آن را حل کرده است. (ترجمه میزان الحکمة، ص ۷۷)

$$1 + r + d + \dots + (rn - 1) = n^r$$

$$a=1 \quad d=r \quad n=r \quad s_n = \frac{n}{r} [ra + (n-1)d]$$

$$s_n = \frac{n}{r} [r + (n-1) \times r] = \frac{n}{r} \times rn = n^r$$

(برای مجموع مکالم)

$$10r, 11r, \dots, 99r \quad a=10r \quad a_n = 99r \quad n = \frac{99r - 10r}{r} = 90 + 1 = 91 \text{ دلار}$$

$$s_n = \frac{n}{r} [ra + (n-1)d] = \frac{10r}{r} [r \times 10r + (90-1) \times r] = 1000 \text{ دلار}$$

$$\downarrow s_n = \frac{n}{r} [ra + (n-1)d]$$

(برای مجموع مکالم)

$$10r + 11r + 12r + \dots + 99r = \frac{10r}{r} [ra + 9r] \rightarrow 10r + 11r + 12r + \dots + 99r = ar + r^r d = ar$$

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^{r-1} = ar^r \quad \text{فرموده}$$

$$10a + 11a + 12a + \dots + 99a = ar^r \rightarrow ar + r^r d = ar$$

$$\begin{cases} ra + r^r d = ar \\ ra + r^r d = ar \end{cases} \rightarrow \begin{cases} ra + r^r d = ar \\ -ra - r^r d = -ar \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2ra = 0 \\ -2r^r d = -ar \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d = 0 \\ r^r = \frac{a}{2} \end{cases}$$

$$ra + r^r d = ar$$

$$ra + r^r d = ar \quad a=0$$

$$a_n = r^{n-1}$$

1, r, r^2, r^3, \dots

(برای مجموع مکالم)

$$s_n = a \left[ \frac{1-r^n}{1-r} \right]$$

$$s_n = ar^0$$

$$\left[ \frac{1-r^n}{1-r} \right] = ar^0$$

$$r^n - 1 = ar^0 \quad r^n = ar^0$$

$$r^n = r^1$$

$$n=1$$

$$\frac{1}{r}, \frac{1}{r^2}, \frac{1}{r^3}, \dots$$

$$s_n = a \left[ \frac{1-r^n}{1-r} \right]$$

(برای مجموع مکالم)

$$s_n > \frac{99}{100} = \frac{1}{r} \left[ \frac{1 - \left(\frac{1}{r}\right)^n}{1 - \frac{1}{r}} \right] > \frac{99}{100} \quad \left(1 - \left(\frac{1}{r}\right)^n\right) > \frac{99}{100}$$

$$\left(\frac{1}{r}\right)^n < \frac{1}{100} \rightarrow r^n > 100 \quad n \text{ دلار} = V$$

$$1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} = \begin{cases} a=1 \\ q=a \\ n=n \end{cases} \quad s_n = a \left[ \frac{1-a^n}{1-q} \right]$$

(برای مجموع مکالم)

$$s_n = 1 \left[ \frac{1-a^n}{1-a} \right] \rightarrow 1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} = \frac{1-a^n}{1-a}$$

$$\rightarrow 1 - a^n = (1-a)(1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1})$$

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان



درس

## معادلات درجه دوم

در سال‌های قبل با معادله‌های درجه اول و درجه دوم و حل آنها آشنا شده‌اید. صورت کلی معادلات درجه دوم

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

به صورت  $a \neq 0$  است که جواب‌های آن، در صورت وجود، از رابطه

به دست می‌آید. اینک، در این بخش، با برخی از انواع معادلات درجه دوم، روابط بین ریشه‌ها و ضرایب این

معادلات و دیگر نکات تكمیلی آشنا خواهید شد.

### کاردر کلاس

$$\begin{aligned} & ax^2 + bx + c = 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac = 4a - 4a^2 a^2 = 1 \\ & x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{a+1}{4} = 1 \quad \text{معادله } 2x^2 - 5x - 2 = 0 \text{ را حل کنید.} \\ & x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{a-1}{4} = \frac{a}{4} = \frac{1}{4} \\ & x = -1 \rightarrow 4 - m(-1) - v = 0 \quad m - 3 = 0 \quad m = 3 \quad \text{اگر } x = -1 \text{ یک ریشه معادله } 4x^2 - mx - v = 0 \text{ باشد، ریشه دیگر کدام است؟} \\ & 4 + m - v = 0 \quad m = 3 \quad \Delta = 9 - 4(4)(-v) = 9 + 112 = 121 \\ & x_1 = \frac{3+11}{4} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2} \\ & x_2 = \frac{3-11}{4} = -2 \end{aligned}$$

بل پارک جزیره (اهواز - استان خوزستان)



# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۸

## روابط بین ضرایب و ریشه‌های معادله درجه دوم

فعالیت

۱ جدول زیر را مطابق نمونه کامل کنید.

$ax^2 + bx + c = 0$	مقدار هر ریشه $x_1$ و $x_2$	(S) جمع ریشه‌ها	(P) ضرب ریشه‌ها	$a$	$b$	$c$	$\frac{-b}{a}$	$\frac{c}{a}$
$3x^2 - 5x + 2 = 0$	۱ $\frac{2}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{2}{3}$	۳	-۵	۲	$\frac{5}{3}$	$\frac{2}{3}$
$4x^2 - 3x - 7 = 0$	-۱ $\frac{7}{4}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{7}{4}$	۴	-۳	-۷	$\frac{3}{4}$	$-\frac{7}{4}$
$x^2 - 2x + 1 = 0$	۱ ۱	۲	۱	۱	-۲	۱	۱	۱
$5x^2 + 6x - 8 = 0$	-۲ $\frac{4}{5}$	$-\frac{6}{5}$	$-\frac{8}{5}$	۵	۶	-۸	$-\frac{6}{5}$	$-\frac{8}{5}$

۲) الف) در جدول بالا بین جمع ریشه‌ها و ضرایب هر معادله چه ارتباطی مشاهده می‌کنید?  
ب) در جدول بالا بین حاصل ضرب ریشه‌ها و ضرایب معادله چه ارتباطی وجود دارد؟

۳) اگر  $x_1$  و  $x_2$  ریشه‌ها و  $S$  و  $P$  به ترتیب حاصل جمع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله درجه دوم باشند، نشان دهید:

$$S = x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \dots = \frac{-b}{a}$$

$$P = x_1 x_2 = \left( -\frac{b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left( -\frac{b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right) = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

$$b^2 - \Delta = b^2 - b^2 + 4ac = 4ac \quad \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

به طور کلی در هر معادله درجه دوم  $ax^2 + bx + c = 0$  اگر جمع ریشه‌ها  $S$  و ضرب ریشه‌ها  $P$  باشد این روابط برقرار است.

$$S = \frac{-b}{a}, \quad P = \frac{c}{a}$$

مثال: اگر  $x = -1$  یک ریشه معادله  $4x^2 - mx - 7 = 0$  باشد ریشه دیگر و مقدار  $m$  را با استفاده از روابط بین ضرایب و ریشه‌ها به دست آورید.

$$P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} \Rightarrow (-1)x_2 = \frac{-7}{4} \Rightarrow x_2 = \frac{7}{4}$$

حل: اگر  $x_1$  و  $x_2$  ریشه‌های این معادله باشند، داریم:

$$S = x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \Rightarrow -1 + \frac{7}{4} = \frac{m}{4} \Rightarrow m = 3$$

از طرفی با استفاده از جمع ریشه‌ها داریم:

## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۹ فصل اول: جبر و معادله

### فعالیت

- ۱ برای تشکیل معادله درجه دومی که ریشه‌های آن  $2$  و  $-3$  باشند راه حل زیر ارائه شده است.  
مراحل حل را توضیح دهید.

$$\begin{cases} x = 2 \\ x = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2 = 0 \\ x + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow (x - 2)(x + 3) = 0 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0$$

- ۲ اگر  $x_1 = \alpha$  و  $x_2 = \beta$  ریشه‌های یک معادله درجه دوم باشند، با استفاده از روش قسمت قبل معادله را مشخص کنید.

$$\begin{cases} x = \alpha \\ x = \beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x - \alpha) = 0 \\ (x - \beta) = 0 \end{cases} \Rightarrow (x - \alpha)(x - \beta) = 0 \Rightarrow x^2 - (\underbrace{\alpha + \beta}_{S})x + \underbrace{\alpha\beta}_{P} = 0$$

به طور کلی اگر  $\alpha$  و  $\beta$  دو عدد دلخواه و  $S = \alpha + \beta$  و  $P = \alpha\beta$  باشند، آنگاه  $\alpha$  و  $\beta$  جواب‌های معادله  $x^2 - Sx + P = 0$  هستند.

### کار در کلاس

معادله درجه دومی تشکیل دهید که ریشه‌های آن  $2 + \sqrt{3}$  و  $2 - \sqrt{3}$  باشند.

$$S = 2 - \cancel{\sqrt{3}} + 2 + \cancel{\sqrt{3}} = 4 \quad P = (2 - \cancel{\sqrt{3}})(2 + \cancel{\sqrt{3}}) = 4 - 3 = 1$$
$$x^2 - Sx + P = 0 \quad x^2 - 4x + 1 = 0$$

\* مثال: محیط یک مستطیل ۳۳ سانتی‌متر و مساحت آن ۶۵ سانتی‌مترمربع است. ابعاد مستطیل را به دست آورید.

\* حل: فرض کنید طول و عرض مستطیل به ترتیب  $x_1$  و  $x_2$  باشند، داریم:

$$x_1 + x_2 = \frac{33}{2}, \quad x_1 x_2 = 65$$

معادله درجه دومی تشکیل می‌دهیم که در آن  $S = \frac{33}{2}$  و  $P = 65$  باشد و آن را حل می‌کنیم.

$$x^2 - Sx + P = 0 \Rightarrow x^2 - \frac{33}{2}x + 65 = 0 \Rightarrow 2x^2 - 33x + 130 = 0$$


از حل معادله اخیر  $x_1 = 1$  یا  $x_2 = \frac{13}{2}$  به دست می‌آید؛ در نتیجه، طول و عرض مستطیل به ترتیب  $1$  و  $\frac{13}{2}$  خواهد بود.

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۱۰

## صفرهای تابع

### فعالیت



نمودار تابع  $f$  با ضابطه  $f(x) = x^2 + 4x + 3$  در شکل رو به رسم شده است.

$$1 \quad \text{معادله } f(x) = \text{را حل کنید و جواب‌های آن را به دست آورید.}$$


$$\begin{aligned} n^2 + 4n + 3 &= 0 \\ (n+1)(n+3) &= 0 \\ n+1 &= 0 \\ n &= -1 \\ n+3 &= 0 \\ n &= -3 \end{aligned}$$

۲ محل تلاقی نمودار تابع  $f$  با محور طولها چه رابطه‌ای با جواب‌های معادله  $f(x) = 0$  دارد؟ **حل کلی نمودار با محور طولها دهنده جواب‌های معادله  $f(x) = 0$  هست**

### صفرهای تابع

برای هر تابع  $f$  جواب‌های معادله  $f(x) = 0$  (در صورت وجود) صفرهای تابع  $f$  می‌نامیم. به عبارت دیگر، صفرهای تابع  $f$  آن مقادیری از  $x$  (در دامنه  $f$ ) هستند که به ازای آنها  $f(x)$  برابر صفر می‌شود. اگر نمودار  $f(x)$  را رسم کنیم صفرهای  $f$  طول نقاط تلاقی نمودار با محور  $x$  هاست.

### کار در کلاس



۱ نمودار سهمی‌های  $f(x) = x^2 - 2x + 1$  و  $g(x) = x^2 + 1$  را رسم کنید.

۲ با توجه به نمودارهایی که رسم کردید در مورد جواب‌های معادله‌های  $f(x) = 0$  و  $g(x) = 0$  چه می‌توان گفت؟

**معادله  $g(x) = 0$  جواب ندارد حول محل برخوردی با محور سهماندارد و معادله  $f(x) = 0$  حول محاس برخورد ندارد**

## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

فصل اول: جبر و معادله

مثال: اگر  $x'$  و  $x''$  صفرهای تابع درجه دوم  $f(x) = ax^2 + bx + c$  باشند نشان دهید

$$ax^2 + bx + c = a(x - x')(x - x'')$$

حل: از آنجا که  $x'$  و  $x''$  صفرهای تابع  $f(x) = ax^2 + bx + c$  هستند پس جوابهای معادله  $ax^2 + bx + c = 0$  هستند و


داریم:

$$a(x - x')(x - x'') = a(x^2 - (x' + x'')x + x'x'')$$

$$= a(x^2 - Sx + p)$$

$$= a[x^2 - \left(\frac{-b}{a}\right)x + \frac{c}{a}] \\ = ax^2 + bx + c$$

مثال: اگر نمودار سهمی  $y = ax^2 + bx + c$  به صورت زیر باشد ضابطه سهمی را مشخص کنید.



روش اول: از آنجا که  $x' = 2$  و  $x'' = 6$  صفرهای تابع  $f(x) = ax^2 + bx + c$  هستند با استفاده از رابطه‌ای که در مثال قبل آمده

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - 2)(x - 6)$$

است می‌توان نوشت:

می‌دانیم نمودار تابع از نقطه  $(3, 0)$  می‌گذرد پس مختصات این نقطه در ضابطه تابع صدق می‌کند و داریم.

$$3 = a(0 - 2)(0 - 6) \Rightarrow a = \frac{1}{4}$$

معادله سهمی به صورت  $y = \frac{1}{4}(x - 2)(x - 6)$  می‌باشد که پس از ساده‌سازی به صورت  $y = \frac{1}{4}x^2 - 2x + 3$  نوشته می‌شود.

روش دوم: از آنجا که  $x' = 3$  می‌توان نوشت  $f(x) = ax^2 + bx + 3$ ; حال از روابط بین صفرهای تابع استفاده می‌کنیم.

$$\frac{c}{a} = 12 \Rightarrow \frac{3}{a} = 12 \Rightarrow a = \frac{1}{4}$$

از طرفی از آنجا که  $x'' = 8$  و  $a = \frac{1}{4}$  پس  $b = -2$  و در نتیجه  $y = \frac{1}{4}x^2 - 2x + 3$

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۱۳

## کاردر کلاس

هر یک از شکل‌های زیر نمودار یک سهمی به معادله کلی  $f(x) = ax^2 + bx + c$  است.

با توجه به معادله  $f(x) = ax^2 + bx + c$  نمودار یا نمودارهای متناظر با هر یک از ویژگی‌های زیر را مشخص کنید.

(الف) دو ریشه مثبت دارد. (شکل‌های ۸ و ۹)

(ب) دو ریشه منفی دارد.

(پ) یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی دارد.







(ت) ریشه ندارد.

(ث) ریشه ندارد و دارای مراکزیم است.


(ج) یک ریشه دارد.

(چ) حاصل جمع ریشه‌ها مثبت است.

(ح) حاصل جمع ریشه‌ها منفی است.



با توجه به نمودارهای داده شده مقابل، جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.



شماره شکل	ویژگی
۹	تعداد صفر
۸	علامت $a$
۷	علامت $b$
۶	علامت $c$
۵	
۴	
۳	
۲	
۱	

تذکر: ستون نظیر شکل پنجم را با توجه به استدلال زیر کامل کرده‌ایم. از آنجا که منحنی سهمی محور  $x$  را قطع نکرده است پس تعداد صفرهای تابع متناظر آن صفر خواهد بود؛ و چون شاخه‌های منحنی به سمت بالا هستند علامت  $a$  مثبت است. از آنجا که منحنی، محور  $z$  را در نقطه با عرض مثبت قطع می‌کند پس  $c > 0$  و طول نقطه مینیمم تابع، مقداری مثبت است. پس  $\frac{-b}{2a} > 0$  و از مثبت بودن  $a$  و رابطه اخیر نتیجه می‌شود  $b < 0$ .

$$(n-1)^2 = \frac{1}{\Gamma} n+1$$

$$x^2 - 2n + 1 = \frac{1}{\Gamma} n + 1$$


$$x^2 - \frac{\Delta}{\Gamma} n = 0$$

$$n(n - \frac{\Delta}{\Gamma}) = 0 \Rightarrow n = \frac{\Delta}{\Gamma}$$

۱۴

## روش هندسی حل معادلات

### نکات



۱ معادله  $1 = \frac{1}{\Gamma} x + (x-1)^2$  را حل کنید. **حریال راه حل از شد**

۲ نمودار دو تابع  $y = (x-1)^2$  و  $y = \frac{1}{\Gamma} x + 1$  را رسم کنید.  
و هر دو کامی دارای ۲ جواب برابر با ۰ و ۲ می‌باشد

۳ چه ارتباطی بین ریشه‌های معادله  $1 = \frac{1}{\Gamma} x + (x-1)^2$  و


**طول‌های نقاط تلاقی نمودارها وجود دارد؟ ریشه‌های معادله طول نقاط تلاقی نمودارها هستند**

اگر  $f(x)$  و  $g(x)$  دو تابع باشند، طول نقاط تلاقی نمودارهای این دو تابع جواب‌های معادله  $f(x) = g(x)$  است و بر عکس، هر جواب این معادله طول یکی از نقاط تلاقی این دو نمودار است.

این روش حل معادله را، که از طریق آن تعداد جواب‌ها و مقدار تقریبی (و گاهی دقیق) جواب‌ها قابل تشخیص است، **روش هندسی (نموداری) حل معادلات می‌نامیم.**

مثال: به روش هندسی معادله  $|x| = x^2 - 2x$  را حل کنید.

حل: با فرض  $f(x) = |x|$  و  $g(x) = x^2 - 2x$ ، نمودار این دو تابع را رسم می‌کنیم:



$$x = 0, x = 2$$

با توجه به نمودارهای دو تابع طول نقاط تلاقی دو نمودار عبارت اند از:

که جواب‌های معادله  $|x| = x^2 - 2x$  می‌باشند.

## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

فصل اول: جبر و معادله

$$\begin{array}{r} x^3 - x^2 - 4x + 4 \\ \hline x - 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x^2 \\ \hline x^2 - 4x \\ \hline x^2 - 2x \\ \hline -2x + 4 \\ \hline -2x + 4 \\ \hline \end{array}$$

مثال: اگر  $x=2$  یکی از صفرهای تابع  $p(x)=x^3-x^2-4x+4$  باشد سایر صفرهای تابع را در صورت وجود باید.

حل: از آنجا که  $x=2$  یک صفر تابع  $p(x)$  است می‌توان نشان داد که  $p(x)$  عاملی به صورت  $x-2$  دارد، پس با تقسیم  $p(x)$  بر  $x-2$  عامل دیگر  $p(x)$  را می‌بایم. می‌توان نوشت  $p(x)=(x-2)(x^2+x-2)$ . آنگاه از حل معادله  $p(x)=0$  داریم:

$$\begin{cases} x-2=0 \Rightarrow x=2 \\ x^2+x-2=0 \Rightarrow \begin{cases} x=-2 \\ x=1 \end{cases} \end{cases}$$

صفرهای تابع  $p$  برابر  $-2, 1, 2$  می‌باشند.

کاردر کلاس

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - x - 2 \\ \hline x^2 - 1 \end{array} \rightarrow (x-1)(x^2+2) \rightarrow \begin{array}{l} x=1 \\ x=\pm\sqrt{-2} \end{array}$$

مقدار  $k$  را چنان باید که یکی از صفرهای تابع  $f(x)=x^3+kx^2-x-2$  برابر  $(-2)$  باشد، سپس صفرهای دیگر تابع را بدست آورید.

مثال: صفرهای تابع  $f$  با ضابطه  $f(x)=(x^2-1)^2+(x^2-1)$  را بدست آورید.

حل: هر چند معادله  $f(x)=0$  از درجه چهار است اما می‌توان با یک تغییر متغیر مناسب آن را به یک معادله درجه دوم تبدیل کرد. با فرض  $t=x^2$ ، معادله به صورت  $t^2-2=0$  در می‌آید. اکنون با حل این معادله و یافتن  $t$  با استفاده از عبارت  $t^2-1=t-1=0$  مقدار  $x$  را می‌باییم.

$$t^2 + t - 2 = 0 \Rightarrow t = 1 \text{ یا } t = -2$$

$$\begin{cases} t=1 \Rightarrow x^2-1=1 \Rightarrow x=\pm\sqrt{2} \\ t=-2 \Rightarrow x^2-1=-2 \Rightarrow x^2=-1 \end{cases}$$

غیرقابل قبول

پس تنها صفرهای قابل قبول برای تابع  $f$ ،  $\sqrt{2}$  و  $-\sqrt{2}$  می‌باشد.

برخی از معادلات را می‌توان با یک تغییر متغیر مناسب، به یکی از انواع معادلاتی که می‌شناسیم تبدیل کرد و پس از حل آن و با رجوع به تغییر متغیر، مقدار مجھول اصلی معادله اولیه را یافت.

کاردر کلاس

$$\begin{array}{l} x^3 - 10x^2 + 14 = 0 \quad n=t \\ t^3 - 10t^2 + 14 = 0 \\ (t-1)(t-2) = 0 \\ t=1 \quad n=1 \quad n=\pm\sqrt{2} \\ t=2 \quad n=2 \quad n=\pm\sqrt{2} \end{array}$$

همه صفرهای تابع  $f(x)=x^3-10x^2+14$  را بدست آورید.

۱- (الف)

$$S = \frac{1}{\alpha} + \frac{2}{\alpha} = 1 \quad P = \frac{1}{\alpha} \times \frac{2}{\alpha} = \frac{2}{\alpha}$$

$$x^2 - Sx + P = 0 \quad x^2 - 1x + \frac{2}{\alpha} = 0$$

$$\alpha, 2\alpha \quad S = 2\alpha \quad P = 2\alpha^2$$

$$x^2 - Sx + P = 0 \quad x^2 - 2\alpha x + 2\alpha^2 = 0$$

فصل اول: جبر و معادله ۱۵

مسئله چند جواب دارد

(ب)

تمرین

## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۱ معادله درجه دومی بنویسید که :


الف) ریشه های آن  $\frac{1}{3}$  و  $\frac{2}{3}$  باشند. **بالای صفحه**

ب) یکی از ریشه های آن دو برابر دیگری باشد (مسئله چند جواب دارد؟).

۲ در هر یک از شکل های زیر نمودار سهمی  $P(x) = ax^2 + bx + c$  داده شده است. در هر حالت صفرهای تابع  $P(x)$  و

$$y = a(n-1)(n+3)$$

$$\begin{cases} n = -1 \\ y = -2 \end{cases} \quad -2 = a(-2)(2) \quad a = \frac{1}{2}$$




$$P(n) = \frac{1}{2}(n-1)(2n+3)$$

$$P(n) = \frac{1}{2}n^2 + n - \frac{3}{2} \quad (ب)$$

ضابطه آن را مشخص کنید.


$$\begin{cases} n = 0 \\ y = -2 \end{cases} \quad -2 = 4a \quad a = -\frac{1}{4}$$



$$P(n) = -\frac{1}{4}(n-2)^2 = -\frac{1}{4}n^2 + 2n - 4$$

(الف)

نمودار نمودار



۳ یک موشک با سرعت اولیه ۱۴۴ متر بر ثانیه از زمین به فضا پرتاب می شود. ارتفاع این موشک ( $h$ ) در زمان  $t$ , از رابطه  $h(t) = -16t^2 + 144t$  به دست می آید.

ارتفاع ماکزیمم آن و همچنین زمانی را که موشک به زمین برخورد می کند به دست آورید.

$$t_{\max} = -\frac{b}{2a} = -\frac{144}{-32} = 4 \quad h_{\max} = -16 \times 16 + 144 \times 16 = 320$$

$$t(-16t + 320) = 0 \rightarrow t = 20 \quad t = 4$$

صفرهای توابع زیر را در صورت وجود به دست آورید.

$$(الف) f(x) = x^2 - 4x \quad \begin{cases} n = 0 \\ n = 4 \end{cases} \quad n = \pm 2$$

$$(ب) g(x) = 2x^2 + x + 3x \quad \begin{cases} n = 0 \\ 2x^2 + 4x + 3 = 0 \end{cases} \quad \Delta < 0$$

$$(پ) h(x) = x^2 + 3x^2 + 5 \rightarrow \frac{t^2}{a} + \frac{n^2}{b} + \Delta \quad \begin{cases} n = 0 \\ -11 \end{cases} \quad \Delta = 9 - 4(1)(5) = 11$$

رسنی تدارد

$$(الف) x^2 - 3x^2 - 4 = 0 \quad x = t + \frac{3}{2}t - \frac{4}{2} = (t - 4)(t + 1) = 0 \quad (n - 4)(n + 1) = 0 \quad n = \pm 2$$

$$(ب) (\frac{x^2}{3} - 2)^2 - 7(\frac{x^2}{3} - 2) + 6 = 0 \quad \rightarrow x^2 - 2 = t \quad t^2 - vt + 4 = 0 \quad (t - 1)(t - 4) = 0$$

$$(4-x^2)^2 - (4-x^2) = 12$$

$$t^2 - t - 12 = 0 \quad \Delta = 41 \quad t = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1 \pm \sqrt{41}}{2}$$

$$4 - x^2 = \frac{1 + \sqrt{41}}{2}$$

$$4 - x^2 = \frac{1 - \sqrt{41}}{2} \quad x^2 = \frac{4 - 1 \pm \sqrt{41}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{41}}{2}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{3 \pm \sqrt{41}}{2}}$$

۵ معادلات زیر را حل کنید.

$$x^2 - 2 = t$$

$$t^2 - vt + 4 = 0 \quad (t - 1)(t - 4) = 0$$


$$t = 1 \rightarrow \frac{n^2}{3} - 2 = 1 \rightarrow \frac{n^2}{3} = 3 \quad n^2 = 9 \quad n = \pm 3$$

$$t = 4 \rightarrow \frac{n^2}{3} - 2 = 4 \rightarrow \frac{n^2}{3} = 6 \quad n^2 = 18 \quad n = \pm \sqrt{18}$$

$$n = \pm \sqrt{24}$$



رسنی تدارد  
حصیقی

حصیقی



۶ تعداد و مقدار تقریبی ریشه‌های معادله  $|x-1|=x^2-x$  را با استفاده از روش هندسی بدست آورید.

۷ هر یک از سهمی‌های زیر نمودار حالتی از تابع  $f(x) = ax^2 + bx + c$  است و نقطه رأس سهمی نیز داده شده است. صفرهای تابع را در صورت وجود بدست آورید و ضایعه تابع را مشخص کنید.



۸ یک استخر مستطیل شکل به ابعاد طول ۱۰ و عرض ۳ متر داریم که یک آبراه بتونی در اطرافش است. اگر این آبراه دارای پهنای یکسان و مساحت ۱۴ مترمربع باشد، پهنای آن را محاسبه کنید.

$$4x^2 + 20x + 4x = 14$$


$$4x^2 + 24x - 14 = 0$$

$$2x^2 + 12x - 7 = 0$$

$$\Delta = 144 + 48 = 228$$

$$x = \frac{-12 + \sqrt{228}}{2} = \frac{-12 + \sqrt{228}}{2} = 7$$

۹ طول یک نوع کاشی یک سانتی متر بلندتر از چهار برابر عرض آن است. برای پوشانیدن دیواری به مساحت  $52/8$  مترمربع تعداد دو هزار کاشی مصرف شده است. طول هر کاشی



$$\begin{aligned} \text{چند سانتی متر است؟} \\ 21m^2 = 21 \times 100 \text{ cm} \\ 2000 \text{ کاشی} \end{aligned}$$



$$S = n(n+1)$$

$$S = n^2 + n$$

$$2000S = 2000(n^2 + n)$$

$$2000n^2 + 2000n = 210000$$

$$\Delta = 1 + 14(10\Delta) = 141$$

$$1n^2 + 2n - 210000 = 0$$

$$n^2 + n - 10000 = 0$$

$$\begin{aligned} n_1 &= \frac{-1 + \sqrt{41}}{2} = 4 \quad \text{نیز} \\ n_2 &= \frac{-1 - \sqrt{41}}{2} = -\frac{42}{2} = -\frac{21}{2} \end{aligned}$$



## معادلات گویا و نمک

### معادلات شامل عبارات گویا

#### حل یک مسئله



در یک مغازه ماهی های تزیینی، ماهی های آب شور در محلول های آب نمک ۷ درصدی نگهداری می شوند. یک کارگر مبتدی ۲۰۰ کیلوگرم محلول آب نمک ۴ درصدی ساخته است. او چگونه باید این محلول را به غلظت مورد نظر برساند؟

برای حل این مسئله سه حالت مختلف فرض می کنیم. ممکن است نمک به اندازه کافی وجود داشته باشد و یا نمک در مغازه موجود نباشد و یا نمک به میزان کافی وجود نداشته باشد. در هر حالت می توان مسئله را مورد بررسی قرار داد.

حالت اول : فرض کنیم نمک به اندازه کافی موجود باشد.

ابتدا تعیین می کنیم در محلول ۴ درصدی چند کیلوگرم نمک وجود دارد :

$$\text{کیلوگرم } 8 = \frac{4}{100} \times 200$$

حالا اگر بخواهیم برای رساندن این محلول به محلول ۷ درصدی  $x$  کیلوگرم نمک به محلول بیفزاییم، وزن نمک  $8+x$  و وزن کل محلول  $200+x$  و نسبت میزان نمک موجود به کل محلول برای  $\frac{8+x}{200+x}$  خواهد بود. از آنجا که این نسبت باید ۷ درصد باشد تناسب زیر برقرار خواهد بود :

$$\frac{x+8}{200+x} = \frac{7}{100}$$

برای حل این معادله که شامل عبارت گویا است، طرفین معادله را در کوچک ترین مضرب مشترک مخرج ها یعنی  $(200+x)$  ضرب می کنیم.

$$100(x+8) = 7(200+x)$$

$$\text{از حل این معادله خواهیم داشت : } x = \frac{600}{93} \text{ و در نتیجه } 93x = 600$$

بنابراین تقریباً ۶ کیلو و ۴۵۱ گرم نمک باید به محلول اضافه شود تا محلول ۷ درصد نمک به دست آید.

حالت دوم: اگر نمک در مغازه موجود نباشد.

در این حالت باید ۷ کیلوگرم از آب محلول را تبخیر کنیم تا درصد نمک محلول خود به خود به ۷ برسد. واضح است که میزان نمک محلول کم نخواهد شد. در این حالت معادله مورد نظر به صورت زیر خواهد بود. (چرا؟)

$$\frac{8}{200-y} = \frac{7}{100}$$

از حل این معادله خواهیم داشت  $y = 200 - 80 = 120$  و این بدين معنی است که کارگر باید با تبخیر ۸۵ کیلو ۷۱۴ گرم از آب محلول به غلظت مورد نظر برسد.

### کاردر کلاس

در مسئله ماهی های تزیینی حالت سومی هم وجود داشت که نمک به اندازه کافی موجود نباشد. فرض کنیم در مغازه فقط ۵ کیلوگرم نمک موجود باشد و کارگر ناچار است همان را به محلول بیفزاید. چند کیلوگرم از آب محلول را باید تبخیر کند تا به محلول ۷ درصدی نمک مورد نظر برسد؟

$$8 + 5 = 13$$

$$200 + y = 130$$

$$\frac{13}{200-y} = \frac{7}{100}$$

$$1400 - 7y = 1300$$

$$y = \frac{100}{7} = 14,29$$

برای حل معادلات شامل عبارات گویا، با ضرب طرفین معادله در کوچکترین مضرب مشترک مخرج کسرها و ساده کردن عبارت جبری به دست آمده معادله را حل می کنیم. جواب به دست آمده نباید مخرج هیچ یک از کسرها را صفر کند (چرا؟)

همچنین ممکن است برخی از جوابها با شرایط مسئله در محیط پیرامونی مطابقت نداشته باشند که این جوابها نیز مورد قبول نیستند.

مثال: معادله  $\frac{3}{x+2} + \frac{2}{x} = \frac{4x-4}{x^2-4}$  را حل کنید.

حل: کوچکترین مضرب مشترک مخرج ها برابر  $x(x-4)$  است. (چرا؟) با ضرب طرفین معادله در این عبارت داریم:

$$3x(x-4) + 2(x^2-4) = x(4x-4)$$

$$3x^2 - 12x + 2x^2 - 8 = 4x^2 - 4x$$

$$x^2 - 8x - 8 = 0 \Rightarrow (x-4)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 4 \text{ یا } x = -2$$

البته جواب  $x = -2$  مورد قبول نیست. (چرا؟) **چو ۰ عرضه نمی کند**

(۳) ابتدا با میل صاله ساره ترجوی را بدست می آوریم  $\frac{L}{w}$  محیط زمین ۲۰۰ متر باشد سر جلو برابر



$$2L + 2w = 200 \rightarrow L + w = 100 - w$$

$$\frac{L}{w} = \frac{w+L}{L} \rightarrow \frac{1-w}{w} = \frac{1}{1-w}$$

$$(1-w)^2 = w \rightarrow w^2 - 3w + 1 = 0 \quad w_1 = \frac{3+\sqrt{8}}{2} \quad w_2 = \frac{3-\sqrt{8}}{2}$$

فصل اول: جبر و معادله ۱۹

### خواندنی

در ریاضیات هنگامی نسبت طلایی پیدا می‌آید که نسبت بخش بزرگ‌تر به بخش کوچک‌تر برابر نسبت مجموع دو بخش به بخش بزرگ‌تر باشد.

تعییر هندسی آن چنین است. طول مستطیلی به مساحت واحد که عرض آن یک واحد کمتر از طولش باشد.

مصریان سال‌ها قبل از میلاد از این نسبت آگاه بودند و آن را در ساخت اهرام رعایت کردند. سیاری از الگوهای طبیعی در بدن انسان نیز این نسبت را دارا هستند.

روان‌شناسان بر این باورند که زیباترین مستطیل به چشم انسان مستطیلی است که نسبت طول به عرض آن برابر عدد طلایی باشد. دلیل این امر آن است که این نسبت در شبکه چشم انسان رعایت شده و هر مستطیلی که این نسبت را دارا باشد به چشم زیبا می‌آید.

در ساخت برج میدان آزادی تهران به ارتفاع ۶۲ و عرض ۴۲ متر نسبت طلایی تا حد زیادی رعایت شده است.

کنیه بیستون از دوره هخامنشی در کمانشاه به طول ۵ و عرض ۳ متر به عدد طلایی تزدیک است.

یکی از هنرهای معماری در تخت جمشید این است که ارتفاع سرده را به عرض آنها و همین طور نسبت ارتفاع ستون‌ها به فاصله بین دو ستون نسبت طلایی است.

در پل ورسک، ارگ به، مقبره این‌سینا، میدان نقش جهان، مسجد شیخ لطف‌الله و خوشنویسی میرعماد حسنه از نسبت طلایی استفاده شده است. با جستجوی اینترنتی به مطالب خواندنی در این زمینه دست می‌پاید.

منبع: مبانی هنرهای تجسمی، قسمت اول، شرکت جاب و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۲

$$L = 100 - w = 100 - \frac{3-\sqrt{8}}{2} = 100 - \frac{1+\sqrt{8}}{2}$$

$$100 = \frac{3-\sqrt{8}}{2} = 25 - \frac{\sqrt{8}}{2} \quad \text{کار در کلاس}$$

$$100 = \frac{-1+\sqrt{8}}{2} = -10 + \frac{8\sqrt{8}}{2}$$

$$\text{معادله } \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{2}{x-2} = 1$$

(ابتدا عطف در  $x=2$  صفر بجز کنیم)

$$1 + 2(x-2) = 3(x-2)^2 \rightarrow 1 + 2x - 4 = 3x^2 - 12x + 12$$

$$3x^2 - 14x + 10 = 0 \quad \frac{1}{3}(3x-9)(3x-5) = 0$$


$$\begin{cases} 3x = 9 \\ 3x = 5 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{ق} \\ \text{ق} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{ق} \\ \text{ق} \end{array}$$

۲ اگر در یک مستطیل با طول  $L$  و عرض  $w$  داشته باشیم :

آنگاه می‌گوییم در این مستطیل نسبت طلایی برقرار است.

اگر محیط یک زمین ورزشی مستطیل شکل، برابر ۱۴۴ متر و اندازه طول و عرض آن متناسب با نسبت طلایی باشد، طول و عرض زمین چقدر است؟

**پالای صفر**



# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان



۲۰

## معادلات شامل عبارت‌های گنگ



### طرح یک مسئله

معمولآً مرغ‌های دریایی، برای شکار ماهی‌ها، بخشی از مسیر خود را در هوا و بخشی را به موازات سطح آب طی می‌کنند. یک مرغ دریایی در نقطه  $A$  به ارتفاع ۶ متر از سطح آب قرار دارد. فاصله تصویر مرغ روی آب از ماهی که در نقطه  $C$  قرار دارد ۱۲ متر است. مرغ ابتدا از نقطه  $B$  به نقطه  $A$  می‌آید سپس در سطح آب از  $B$  به  $C$  می‌رود و ماهی را شکار می‌کند. اگر مرغ دریایی برای طی هر متر در هوا ۱۴ کیلوکالری و برای طی هر متر در سطح آب  $10^{\circ}$  کیلوکالری انرژی مصرف کند، نقطه  $B$  در چه فاصله‌ای از  $C$  باید باشد تا مرغ دریایی روی هم  $18^{\circ}$  کیلوکالری انرژی مصرف کند؟



\* حل : برای درک بهتر صورت مسئله شکل رو به رو را رسم می‌کنیم. فاصله  $B$  از تصویر مرغ بر روی آب ( $H$ ) را  $x$  می‌گیریم در نتیجه فاصله میان  $B$  و  $C$  برابر  $-x+12$  می‌شود. با استفاده از رابطه فیثاغورس طول  $AB$  برابر  $\sqrt{36+x^2}$  می‌شود.

میزان انرژی مصرف شده توسط مرغ دریایی برابر است با :  
برای آنکه مرغ دریایی روی هم  $18^{\circ}$  کیلوکالری انرژی مصرف کند باید داشته باشیم :

$$14\sqrt{36+x^2} + 10(12-x) = 18 \cdot 12 \Rightarrow 14\sqrt{36+x^2} = 10x + 60$$

$$\sqrt{36+x^2} = 5x + 30$$

با به توان دو رساندن طرفین معادله اخیر و ساده کردن به معادله درجه دوم  $2x^2 - 25x + 72 = 0$  می‌رسیم که از آنجا  $x=8$  و  $x=4/5$ . در این صورت فاصله  $B$  تا  $C$  برابر  $4/5 = 7/5 = 12 - 4/5 = 12 - 8 = 4$  می‌شود.

اگر مرغ دریایی مستقیماً از  $A$  به  $C$  پرواز می‌کرد چقدر کالری مصرف می‌کرد؟ آیا اقدام مرغ دریایی برای شکار ماهی‌ها هوشمندانه نمی‌باشد؟!

$$x_{min} = 4, 11 \text{ و } 4\sqrt{5} = 18.7183$$

## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

### ۲۱ فصل اول: جبر و معادله

برخی از معادلات که دارای عبارت‌های رادیکالی از مجھول هستند را معادلات گنگ می‌نامند. برای حل آنها با به توان رساندن طرفین معادله (و در صورت لزوم تکرار این عمل) و ساده کردن به معادله‌ای بدون رادیکال می‌رسیم که آن را حل می‌کنیم. جواب‌های به دست آمده باید در معادله اصلی این عمل آزمایش شوند، زیرا عملیات توان رسانی ممکن است جواب‌های اضافی تولید کند.

❖ مثال: معادله  $\sqrt{x+2} = x - 4$  را حل کنید.

❖ حل:

$$\begin{aligned} (\sqrt{x+2})^2 &= (x-4)^2 \\ x+2 &= x^2 - 8x + 16 \\ x^2 - 9x + 14 &= 0 \\ (x-2)(x-7) &= 0 \Rightarrow x=2 \text{ و } x=7 \end{aligned}$$

آزمایش جواب‌ها

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 : \sqrt{2+2} = 2-4 \\ 2 &\neq -2 \times \end{aligned}$$

جواب مسئله نیست

$$\begin{aligned} x_2 &= 7 : \sqrt{7+2} = 7-4 \\ 3 &= 3 \quad \checkmark \end{aligned}$$

جواب معادله است

بنابراین  $x=7$  تنها جواب معادله است.

❖ تذکر: در حل این مسئله طرفین معادله اولیه نامنفی بودند و به توان دو رساندن آنها مشکلی ایجاد نمی‌کرد. در حل معادلات گنگ می‌توان با تعیین دامنه تعریف معادله، جواب‌های نهایی را با استفاده از آن مورد بررسی قرار داد. در حل این مسئله برای به دست آوردن دامنه تعریف داریم:

$$\begin{cases} x+2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2 \\ x-4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4 \end{cases} \xrightarrow{\text{اشتراک نواحی}} x \geq 4$$

کاردکلاس

$$\begin{aligned} x+\sqrt{x} &= 4 \quad \sqrt{x} = 4-x \quad \text{آیا عدد صحیحی وجود دارد که جمع آن با جذرش برابر شش باشد؟} \\ (\sqrt{n})^2 &= (4-n)^2 \\ n &= 34-12n+n^2 \quad n^2-13n+34=0 \quad \begin{cases} n=4 \\ n=9 \end{cases} \quad \text{قیمت} \\ n-8(n-9) &= 0 \quad (n-8)(n-9)=0 \end{aligned}$$

معادله  $\sqrt{x^2-4}+2\sqrt{x}=0$  را حل کنید؛ سپس در مورد قابل قبول بودن جواب‌های آن بحث کنید. آیا بدون حل نیز می‌توانستید به این نتیجه برسید؟ هنگامی مفعع در عبارت  $\sqrt{x}$  نامنفی صفری شود که هر دو صفر چهار سه  
جواب مسأله وجود ندارد. جواب ندارد

(۹)

۷ سرعت رفت  $t_1$  زمان و  $t_2$  سرعت بازگشت  $t_r$

$$v_p = v_i - \lambda \quad t_1 + t_r = V - 2 = 1\Delta \quad t_1 = \frac{1\Delta}{V} \quad t_2 = \frac{1\Delta}{V - \lambda}$$

$$t_1 + t_r = \frac{1\Delta}{V} + \frac{1\Delta}{V - \lambda} = 1\Delta \quad \begin{cases} V = 2\Delta \\ V = -3\Delta \end{cases}$$

$$1\Delta(V - \lambda) + 1\Delta V_i = 1\Delta v_i(V_i - \lambda)$$

$$1\Delta V_i - \lambda + 1\Delta V_i = 1\Delta v_i^2 - 1\Delta \times \lambda V_i$$

$$1\Delta v_i^2 - 4\Delta V_i + 11\Delta^2 = 0 \rightarrow \Delta v_i^2 - 13\Delta V_i + 38\Delta^2 = 0$$

تمرين ۲۲

معادلات زیر را حل کنید. صحن بعد

۱  $\frac{y}{x} = 2 + \frac{x-3}{x+1}$

۲  $\frac{P}{2-P} + \frac{2}{P} = \frac{-3}{2}$

۳  $\frac{3y+5}{y^2+5y} + \frac{y+4}{y+5} = \frac{y+1}{y}$

۴  $2\sqrt{x} = \sqrt{3x+4}$

۵  $\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} = 1-x$

۶  $\frac{5}{\sqrt{x}+2} = 2 - \frac{1}{\sqrt{x}-2}$

۷  $\sqrt{x+3} + \sqrt{3x+1} = 4$

- ۸ پدر بزرگ برای اهدا به مهد کودک چند اسباب بازی یکسان، مجموعاً به قيمت ۱۲۰ هزار تومان خريد. اگر فروشنده برای هر اسباب بازی هزار تومان به پدر بزرگ تخفيف مي داد او مي توانست با همان پول چهار اسباب بازی ديگر هم بخرد. قيمت هر اسباب بازی قبل از تخفيف چقدر بوده است؟
- $$\begin{cases} xy = 120 \\ xy = 120 \\ xy = 120 \\ y = 2x - 4 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 2x \\ 120 + 4n - y - 4 = 120 \\ 120 + 4n - 2x - 4 = 120 \\ n = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x(4n - 4) = 120 \\ 4n^2 - 4n - 120 = 0 \\ n^2 - n - 30 = 0 \\ n = 5 \end{cases}$$
- ۹ ماشين A کاري را به تهای ۱۵ ساعت زودتر از ماشين B انجام مي دهد. اگر هر دو ماشين يك کار را در ۱۸ ساعت انجام دهند، چه زمانی برای هر کدام از ماشين ها لازم است تا آن کار را به تهای انجام دهند؟ **بالای صحن**

۴۰۰۰  
مهنت قبل  
تحفيف

- ۱۰ فاصله بين دو شهر که در کنار رودخانه ای واقع شده اند ۱۴۴ کيلومتر است. يك کشتی از شهر اول به شهر دوم مي رود و پس از دو ساعت توقف همين مسیر را برمي گردد. مدت زمان سفر در مجموع ۱۷ ساعت مي باشد. درصورتی که سرعت حرکت کشتی در مسیر جريان آب ۸ کيلومتر در ساعت بيشتر از سرعت آن در خلاف جريان آب باشد سرعت حرکت کشتی را در جهت حرکت آب تعين کنيد.



$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1\Delta} = \frac{1}{1\Delta}$$

$$1\Delta(n-1\Delta) + 1\Delta n = n(n-1\Delta)$$

$$n^2 - 2n + 2V_0 = 0$$

$$(n-4\Delta)(n-4) = 0$$

$$\begin{cases} n = 4\Delta \\ n = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} n-1\Delta = 3\Delta \\ n-1\Delta = -9 \end{cases} \quad (10)$$

$$n-1\Delta = 9 - 3\Delta$$

$$1) \frac{q}{n} = p + \frac{n}{n+1} \xrightarrow{\alpha(n+1)} q(n+1) = pn(n+1) + n(n)$$

$$4x + 4 = 4p^r + 4pn + n^r \rightarrow 4n^r - 4n - 4 = 0 \quad \Delta = 16 + 4n^2 - 16n$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{4a} = \frac{4 \pm \sqrt{16n^2 - 16n}}{4} \quad \left\{ \begin{array}{l} n = \frac{4 + \sqrt{16n^2 - 16n}}{4} \text{ جواب} \\ n = \frac{4 - \sqrt{16n^2 - 16n}}{4} \text{ جواب} \end{array} \right.$$

$$2) \frac{p}{p-p} + \frac{p}{p} = \omega \xrightarrow{p(p-p)} p(p) + \omega(p-p) = \Delta p(\omega - p)$$

$$\rightarrow p^r + \omega - \omega p = 10p - \Delta p^r \rightarrow \omega p^r - 10p + \omega = 0 \rightarrow \omega p^r - \omega p + \omega = 0$$

$$\Delta = 4\omega - 4\omega = 16 \quad n = -\frac{b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 \pm \sqrt{16}}{4} \quad \left\{ \begin{array}{l} n = \frac{4 + \sqrt{16}}{4} \text{ جواب} \\ n = \frac{4 - \sqrt{16}}{4} \text{ جواب} \end{array} \right.$$

$$3) \frac{py + \alpha}{y^r + \alpha y} + \frac{y + \epsilon}{y + \alpha} = \frac{y + 1}{y}$$

$$\underline{y(y + \alpha)} \rightarrow py + \alpha + y(y + \epsilon) = (y + 1)(y + \alpha)$$

$$py + \alpha + py^r + \epsilon y = y^r + \alpha y + \alpha \rightarrow y = 0 \quad \text{جواب}$$

$$4) \sqrt{n} = \sqrt{pn + \epsilon} \rightarrow (\sqrt{n})^2 = (\sqrt{pn + \epsilon})^2 \rightarrow n = pn + \epsilon \quad \text{نهاية}$$

$$\frac{1 - \sqrt{n}}{1 + \sqrt{n}} = 1 - n \rightarrow (1 + \sqrt{n})(1 - n) = 1 - \sqrt{n}$$

$$(1 + \sqrt{n})(1 - \sqrt{n}) - (1 - \sqrt{n}) = 0$$

$$(1 - \sqrt{n}) [(1 + \sqrt{n})^2 - 1] = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} 1 - \sqrt{n} = 0 \quad \sqrt{n} = 1 \quad n = 1 \text{ جواب} \\ (1 + \sqrt{n})^2 - 1 = 0 \quad (1 + \sqrt{n})^2 = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 + \sqrt{n} = 1 \rightarrow \sqrt{n} = 0 \quad n = 0 \\ 1 + \sqrt{n} = -1 \rightarrow \sqrt{n} = -2 \quad \text{غير ممكن} \end{array} \right.$$

$$5) \frac{1}{\sqrt{n} + \alpha} = p + \frac{1}{\sqrt{n} - p} \xrightarrow{(\sqrt{n} + p)(\sqrt{n} - p)}$$

$$\sqrt{n} - p = p(n - \epsilon) + \sqrt{n} + p \quad pn = \epsilon \quad n = 2 \quad \text{جواب}$$

$$6) \sqrt{pn + \epsilon} = 1 - \sqrt{n + p} \quad (\sqrt{pn + \epsilon})^2 = (1 - \sqrt{n + p})^2$$

$$q(pn + \epsilon) = q\epsilon - 14\sqrt{pn + p} + pn + p \rightarrow 14\sqrt{pn + p} = q\lambda - 24n$$

$$1\sqrt{x+p} = q - 14x \rightarrow (1\sqrt{x+p})^2 = (q - 14x)^2 \quad q\epsilon(n + p) = q\lambda - 14pn + 14q^2$$

$$149x^2 - 111x + 9\epsilon q = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} n = 1 \text{ جواب} \\ n = \frac{c}{a} = \frac{9\epsilon q}{149} = \frac{9\epsilon q}{149} \text{ جواب} \end{array} \right.$$

# ۴

## درس

### قدر مطلق و ویژگی های آن

در سال قبل با مفهوم قدر مطلق و برخی از ویژگی های آن آشنا شدید. همان طور که می دانید قدر مطلق عدد حقیقی  $a$  به صورت زیر تعریف می شود.

$$|a| = \begin{cases} a & , \quad a \geq 0 \\ -a & , \quad a < 0 \end{cases}$$

#### کار در کلاس


۱ حاصل هریک از عبارت های زیر را بدون قدر مطلق بنویسید.

$$\text{(الف) } |-5 - (-3)| = | -2 | = 2 \quad \text{(ب) } |\sqrt{3} - \sqrt{5}| = |(\sqrt{3} - \sqrt{5})| = \sqrt{5} - \sqrt{3}$$

۲ عبارت های زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.

$$\text{(الف) } \sqrt{a^4 + 2a^2 + 1} = \sqrt{(a^2 + 1)^2} = |a^2 + 1| = a^2 + 1$$


$$\text{(ب) } \sqrt{7 - 4\sqrt{3}} = \sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2} = |\sqrt{3} - 2| = |(\sqrt{3} - 2)| = 2 - \sqrt{3}$$




۳- اینبار - روشی بیانی (استان سمنان)

## رسم توابع قدر مطلقی


### فعالیت



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)

می خواهیم نمودار تابع  $y = |x - 1| + 2$  را رسم کنیم.

روش اول: با توجه به نمودار  $y = |x|$  در شکل (۱) و استفاده از انتقال منحنی، نمودار آن را رسم کنید.

روش دوم: گام اول؛ با استفاده از تعیین علامت، تابع را به صورت بک تابع دو ضابطه‌ای بنویسید.

$$y = |x - 1| + 2 = \begin{cases} x - 1 + 2 & , x \geq 1 \\ -x + 1 + 2 & , x < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 1 & , x \geq 1 \\ -x + 3 & , x < 1 \end{cases}$$

گام دوم؛ با توجه به شکل (۲) نمودار  $y$  را رسم کنید.

مثال: نمودار تابع  $f(x) = |x - 1| + |x + 2|$  با ضابطه  $f(x)$  را رسم کنید.

حل: در اینجا نمی‌توانیم از رسم تابع  $y = |x|$  و انتقال استفاده کنیم. بنابراین از روش تعیین علامت عبارت‌های داخل قدرمطلق‌ها کمک می‌گیریم. برای این کار ابتدا عبارت‌های داخل قدرمطلق‌ها را تعیین علامت می‌کنیم.

$x$	-2	1	
$x - 1$	-	-	+
$x + 2$	-	+	+

$\Rightarrow f(x) = (x - 1) + (x + 2) = 2x + 1$   
 $\Rightarrow f(x) = -(x - 1) + (x + 2) = 3$   
 $\Rightarrow f(x) = -(x - 1) - (x + 2) = -2x - 1$

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 1 & , x < -2 \\ 3 & , -2 \leq x \leq 1 \\ 2x + 1 & , x > 1 \end{cases}$$

$+ -2 -3$   
 $+ 1 2$

نمودار تابع از سه قسمت که هریک بخشی از یک خط هستند تشکیل می‌شود (شکل ۳).

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

فصل اول: جبر و معادله

## ویژگی‌های قدر مطلق

در سال‌های قبل با برخی از ویژگی‌های قدر مطلق آشنا شده‌اید که عبارت‌اند از:

(الف)  $|x| \geq 0$

(ب)  $\sqrt{x^2} = |x|$

(پ)  $|x| = a \Leftrightarrow x = a \text{ یا } x = -a \quad (a \geq 0)$

(ت)  $|x| = |a| \Leftrightarrow x = a \text{ یا } x = -a$

(ث)  $|-x| = |x|$

(ج)  $|x|^2 = x^2$

فعالیت

فرض کنید  $a$  و  $b$  عددهای حقیقی دلخواه باشند.  
 $|ab| = |a||b|$   $|ab| = \sqrt{(ab)^2} = \sqrt{a^2 b^2} = \sqrt{a^2} \sqrt{b^2} = |a||b|$  از رابطه  $\sqrt{a^2} = |a|$  استفاده کنید و نشان دهید که:

$\frac{|a|}{b} = \frac{|a|}{|b|}$   $|a| = \left| \frac{a}{b} \times b \right| = \left| \frac{a}{b} \right| |b| \Rightarrow \frac{|a|}{|b|} = \left| \frac{a}{b} \right|$  با فرض  $b \neq 0$  و استفاده از مرحله قبل ثابت کنید که:  
 $\left| \frac{a}{b} \right| = \sqrt{\left( \frac{a}{b} \right)^2} = \sqrt{\frac{a^2}{b^2}} = \frac{\sqrt{a^2}}{\sqrt{b^2}} = \frac{|a|}{|b|}$

فعالیت

فرض کنید  $c$  یک عدد حقیقی نامنفی باشد. هریک از نامعادلهای زیر را به جواب متناظر آن وصل کنید.

(الف)  $|x| < c, (c \neq 0)$

(۱)



(ب)  $|x| > c$

(۲)



(پ)  $|x| \leq c$

(۳)



(ت)  $|x| \geq c$

(۴)



برای هر عدد حقیقی  $a$  نشان دهید که:  $-|a| \leq a \leq |a|$

برای هر دو عدد حقیقی  $a$  و  $b$  ثابت کنید که:  $-|a| - |b| \leq a + b \leq |a| + |b|$

$|a+b| \leq |a| + |b|$

:

با استفاده از قسمت قبل «نامساوی مثلث» را برای هر دو عدد حقیقی  $a$  و  $b$  نتیجه بگیرید:

$$\begin{aligned} -|a| \leq a \leq |a| \\ -|b| \leq b \leq |b| \end{aligned} \quad \text{و} \quad \begin{cases} -|a| \leq a \leq |a| \\ -|b| \leq b \leq |b| \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} -(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b| \\ \rightarrow |a+b| \leq |a| + |b| \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -|a| \leq a \leq |a| \\ -|b| \leq b \leq |b| \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} -|a| - |b| \leq a + b \leq |a| + |b| \end{aligned}$$

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۱۲

## معادلات قدر مطلقی

### حل یک مسئله

بر روی محور اعداد حقیقی فاصله چه نقاطی از نقطه ثابت ۷ برابر ۳ است؟

برای حل مسئله شکل رویه را رسم می کنیم.

اگر طول نقطه جواب مسئله را  $x$  بنامیم، شرط مسئله به این معناست که  $|x - 3| = 3$ . با استفاده از ویژگی های قدر مطلق خواهیم دانست  $x - 3 = \pm 3$ ، و در نتیجه  $x = 1$  و  $x = 4$ ; هر دو جواب های معادله هستند.

جواب های معادله  $|f(x)| = |g(x)|$  همان جواب های دو معادله  $f(x) = g(x)$  و  $f(x) = -g(x)$  هستند. به معادلاتی

نظیر این معادلات که شامل عبارت قدر مطلق هستند معادلات قدر مطلقی می گویند.

\* مثال: معادله  $|3x - 2| = |x - 4|$  را حل کنید.

روش اول: با استفاده از ویژگی های قدر مطلق: جواب های این معادله همان جواب های دو معادله  $3x - 2 = x - 4$  و

$3x - 2 = -(x - 4)$  هستند که، به ترتیب، عبارت اند از:

$$x = \frac{3}{2} \quad x = -1$$

روش دوم: با به توان دو رساندن طرفین معادله خواهیم داشت:  $9x^2 - 12x + 4 = x^2 - 8x + 16$ ; و از آنجا  $8x^2 + 4x - 12 = 0$ .

جواب های این معادله  $-1$  و  $\frac{3}{2}$  هستند.

### کار در کلاس

معادله قدر مطلقی  $|x - 1| = 4 - 3x$  را به سه روش زیر حل کنید.

روش اول: (با استفاده از تعریف قدر مطلق)

$$|x - 1| = \begin{cases} x - 1, & x \geq 1 \\ -x + 1, & x < 1 \end{cases}$$


$$x \geq 1 \Rightarrow x - 1 = 4 - 3x \Rightarrow x = \frac{5}{4} \quad \text{حالت اول} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{مجموعه جواب}, \\ -x + 1 = 4 - 3x \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} \frac{3}{4} \\ 2x = 3 \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} x = \frac{3}{2} \\ x = 1 \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} \text{حالت دوم} \\ \text{نیز} \end{array} \right.$$

روش دوم: (روش هندسی)

الف) توابع  $y = |x - 1|$  و  $y = 4 - 3x$  را رسم کنید.

ب) طول های محل تلاقی دو نمودار را مشخص کنید.  $x = \frac{3}{2}$

پ) جواب های معادله را به دست آورید.  $x = \frac{3}{2}$




روش سوم: (به توان رساندن طرفین)

$$\begin{aligned} |x - 1| &= 4 - 3x \quad |x - 1|^2 = (4 - 3x)^2 \\ x^2 - 2x + 1 &= 16 - 24x + 9x^2 \rightarrow x^2 - 22x + 15 = 0 \\ \frac{1}{x} (x^2 - 12x - 10x + 15) &= 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 12x = 0 \\ -10x + 15 = 0 \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} x_1 = 0 \\ x_2 = \frac{15}{10} = \frac{3}{2} \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} x_1 = 0 \\ x_2 = 1 \end{array} \right. \end{aligned}$$

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

فصل اول: جبر و معادله

## فعالیت



در شکل رو به رو نمودار تابعی با ضابطه  $f(x) = x^2 - 4$  آمده است.

- ۱ با توجه به علامت عبارت  $-4^x$  و استفاده از تعریف قدر مطلق، تابع  $y = |x^2 - 4|$  را به صورت چندضابطه‌ای بنویسید.

۲ نمودار  $y = |x^2 - 4|$  را رسم کنید.

۳ تابع  $|f(x)|$  را به صورت یک تابع دوضابطه‌ای بنویسید.


$$y = |f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0 \\ -f(x), & f(x) < 0 \end{cases}$$

- ۴ با توجه به قسمت‌های قبل یک روش رسم برای تابع  $|f(x)|$  از روی نمودار  $y = f(x)$  بیان کنید.

$$y = |f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0 \\ -f(x), & f(x) < 0 \end{cases}$$

- ۵ در شکل رو به رو نمودار تابع با ضابطه  $y = |f(x)|$  را از روی نمودار تابع  $y = f(x)$  رسم کنید.

با توجه به فعالیت بالا :




۱ نمودار  $y = -f(x)$  فرینه نمودار  $y = f(x)$  نسبت به محور  $x$  هاست.

۲ برای رسم نمودار  $|f(x)|$  کافی است نمودار  $y = f(x)$  را رسم


کنیم و در جاهایی که نمودار  $y = f(x)$  زیر محور  $x$  هاست، تصویر آینه‌وار نمودار  $y = f(x)$  را نسبت به محور  $x$  رسم کنیم.

## کاردکلاس



- ۱ با استفاده از شکل رو به رو، نمودار توابع  $y = |2x - 1|$  و  $y = |x^2 - 1|$  را رسم کنید و تعداد جواب‌های معادله  $|2x - 1| = |x^2 - 1|$  و مقدار تقریبی جواب‌ها را بدست آورید.

۲ به روش جبری و با استفاده از ویژگی‌های قدر مطلق معادله  $|x^2 - 1| = |2x - 1|$  را حل کنید.



$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= 2x - 1 \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \text{یا} \quad x = 2 \\ |x^2 - 1| &= |2x - 1| \quad \text{حالات اول} \\ x^2 - 1 &= -(2x - 1) \Rightarrow x^2 + 2x - 2 = 0 \quad \Delta = 12 \end{aligned}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3} \rightarrow \begin{cases} x = -1 + \sqrt{3} \approx 0.732 \\ x = -1 - \sqrt{3} \approx -2.732 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{ح) } \begin{cases} u < -\Delta \\ u > -1 \end{cases} \\ \text{ب) } \begin{cases} u < -\Delta \\ u > -1 \end{cases} \\ \text{الف) } \begin{cases} u + 3 > 2 \\ u + 3 > 2 \rightarrow u > -1 \\ u + 3 < -2 \rightarrow u < -\Delta \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{ح) } \begin{cases} u < -\Delta \\ u > -1 \end{cases} \\ \text{ب) } \begin{cases} u < -\Delta \\ u > -1 \end{cases} \\ \text{الف) } \begin{cases} u - 3 = 7 \\ u - 3 = 7 \rightarrow |u - 3| = 7 \\ u - 3 = 7 \rightarrow u = 10 \\ u - 3 = -7 \rightarrow u = -4 \end{cases} \end{array}$$

نماین

۱ با استفاده از تعیین علامت، ضابطه هریک از توابع زیر را بدون استفاده از نماد قدر مطلق بنویسید.

$$\begin{array}{l} \text{الف) } f(x) = x|x| = \begin{cases} x(-x) = -x^2 & u > 0 \\ x(-x) = -x^2 & u < 0 \end{cases} \\ \text{ب) } g(x) = |x-1| = \begin{cases} x-1 & u \leq 1 \\ -x+1 & u > 1 \end{cases} \\ \text{پ) } h(x) = |x-1| + |x+1| = \begin{cases} x-u + (-u-1) = -2u & u \leq -1 \\ -u+1 + u+1 = 2 & -1 < u < 1 \\ x-1 + x+1 = 2x & u > 1 \end{cases} \end{array}$$

۲ بر روی محور طول ها چه نقاطی وجود دارد که مجموع فاصله های آنها از دو نقطه به طول های  $-1$  و  $3$  روی محور  $x$  ها

$$\begin{array}{l} \text{برابر } 6 \text{ باشد؟} \\ \begin{array}{c} \xrightarrow{-1} \xrightarrow{3} \\ |x+1| + |x-3| = 6 \\ \begin{cases} -2u+2 & u \leq -1 \\ -2u+4 & -1 < u < 1 \\ 2u-2 & u \geq 1 \end{cases} \end{array} \end{array}$$

۳ هر یک از عبارت های زیر را با استفاده از نماد قدر مطلق به صورت یک معادله یا نامعادله بنویسید و جواب را روی محور اعداد نمایش دهید.

- (الف) فاصله بین  $x$  و  $3$  برابر  $7$  است. **بالای صفحه**  
 (ب) دو برابر فاصله بین  $x$  و  $6$  برابر  $4$  است. **بالای صفحه**  
 (پ) فاصله بین  $x$  و  $-3$  بزرگتر از  $2$  است. **بالای صفحه**

۴ دو معادله زیر را حل کنید.

$$\begin{array}{l} \text{الف) } \frac{2-x}{|x-3|} = 1 \xrightarrow{x \neq 3} |u-3| = 2-u \quad \begin{cases} u-3 = 2-u \rightarrow 2u = 5 \rightarrow u = \frac{5}{2} \\ u-3 = u-2 \rightarrow -3 = -2 \end{cases} \\ \text{غیره} \end{array}$$


$$\text{ب) } \sqrt{x^2 - 2x + 1} = 2x + 1 \quad \begin{cases} u-1 = 2u+1 \rightarrow u = -2 \\ u-1 = -2u-1 \rightarrow u = 0 \end{cases}$$

۵ نمودار هریک از دو تابع زیر را رسم کنید، سپس به ازای  $y=3$  معادله های بدست آمده را به روش هندسی و جبری حل کنید.

$$\begin{array}{l} \text{الف) } y = x - \frac{x}{|x|} \quad \begin{cases} x - \frac{x}{x} = 0 & x > 0 \\ x - \frac{x}{-x} = 2 & x < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u+1 = 0 \rightarrow u = -1 \\ u+1 = 2 \rightarrow u = 1 \end{cases} \\ \text{ب) } y = x^2 - 6x \quad \begin{cases} u^2 - 4u = 3 & u^2 - 4u - 3 = 0 \\ u^2 - 4u - 3 = 0 \end{cases} \quad \Delta = 41 \end{array}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 \pm \sqrt{41}}{2} = 2 \pm \sqrt{41} \quad \begin{cases} x = 2 + \sqrt{41} \approx 4.44 \\ x = 2 - \sqrt{41} \approx -0.44 \end{cases}$$

۶ نمودار تابع  $|x-2|=f(x)$  را رسم کنید، سپس معادله  $f(x)=1$  را، هم به روش هندسی و هم به روش جبری، حل نمایید.




۷ نمودار تابع  $|x-2x|=f(x)$  را رسم کنید، سپس به دو روش هندسی و جبری معادله  $|x-2x|=2$  را حل نماید.

معنی تعاریر

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

## درس

### آشایی با هندسه تحلیلی



در سال‌های گذشته با دستگاه محورهای مختصات آشنا شده‌اید. محورهای مختصات، صفحه را به چهار ناحیه تقسیم می‌کنند که هر ناحیه یک ربع نامیده می‌شود. نقاط روی محورها در هیج ربعی نیستند.


به هر نقطه  $P$  در صفحه مختصات یک زوج مرتب  $(a, b)$  نظیر می‌شود. به این زوج مختصات نقطه  $P$  گفته می‌شود. طول نقطه  $P$  را با  $x_p$  و عرض آن را با  $y_p$  نشان می‌دهیم. در این درس با برخی از ویژگی‌های نقطه در صفحه مختصات آشنا می‌شویم.

#### فاصله بین دو نقطه

#### فعالیت

روی محور اعداد زیر به مبدأ  $O$ ، نقطه متناظر ۴ را با  $A$  و نقطه متناظر -۳ را با  $B$  مشخص کرده‌ایم؛

۱ طول پاره‌خط‌های  $OA$  و  $OB$  چقدر است؟



۲ طول پاره‌خط  $BA$  چقدر است؟

۳ فاصله دو نقطه  $A$  و  $B$  متناظر با ۴ و (-۳) از یکدیگر چقدر است؟

۴ بر روی هریک از دو محور زیر، در مورد فاصله بین دو نقطه  $A$  و  $B$  چه می‌توان گفت؟




$$|AB| = |x_B - x_A| = |x_A - x_B|$$

اگر طول نقاط متناظر با  $A$  و  $B$  روی محور اعداد را به ترتیب با  $x_A$  و  $x_B$  نشان دهیم، در این صورت فاصله بین  $A$  و  $B$  را به صورت  $|AB| = |x_B - x_A|$  تعریف می‌کنیم.

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۳۰


## فعالیت



۱ دو نقطه  $A(2, 5)$  و  $B(6, 3)$  را، در شکل رو به رو، در نظر بگیرید:  
 الف) روی محور افقی  $x_A$  و  $x_B$  و روی محور عمودی  $y_A$  و  $y_B$  را مشخص کنید.

ب) در مثلث قائم الزاویه  $AHB$  ( $\hat{H} = 90^\circ$ ) با استفاده از رابطه فیثاغورس، طول پاره خط  $AB$  را بدست آورید.

۲ در شکل رو به رو، اگر  $A(x_1, y_1)$  و  $B(x_2, y_2)$  دو نقطه دلخواه در صفحه مختصات باشند، طول  $AB$  را محاسبه کنید.




$$\begin{aligned} AB^2 &= AH^2 + BH^2 \\ AB^2 &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \\ AB &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned}$$

به طور کلی، اگر در صفحه مختصات دو نقطه  $A(x_1, y_1)$  و  $B(x_2, y_2)$  را داشته باشیم، طول پاره خط  $AB$  برابر است با:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

## کار در کلاس



سه نقطه  $(1, 3)$ ,  $(-1, 2)$  و  $(5, -5)$  سه رأس مثلث  $ABC$ ، در صفحه مختصات رو به رو، هستند.

الف) مثلث را رسم کنید.

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \\ AC &= \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80} \\ BC &= \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52} \end{aligned}$$

ب) نشان دهید مثلث  $ABC$  قائم الزاویه است.

$$BC^2 = AC^2 + AB^2 \quad \text{راطی خواهد بود که مطلقاً این سه}$$

ت) شب دو خط  $AB$  و  $AC$  را بدست آورید.

چه رابطه‌ای بین دو شب مشاهده می‌کنید؟

$$m_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2 - 3}{-1 - 1} = \frac{1}{2}$$

$$m_{AC} = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{-5 - 3}{5 - 1} = -2$$

$$m_{AB} \times m_{AC} = \frac{1}{2} \times -2 = -1$$

سینما / مخصوص و معتبر ملتمد حضظ برهم معورند


## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۳۱ فصل اول: جبر و معادله

مثال: در شکل زیر، معادله عمودمنصف پاره خطی را بنویسید که دو نقطه  $A(-2, 1)$  و  $B(3, 4)$  را به هم وصل کرده است.

حل: عمودمنصف یک پاره خط شامل همه نقاطی است که فاصله آنها از دو سر پاره خط به یک اندازه است. بنابراین اگر آنگاه  $P$  روی عمودمنصف  $AB$  قرار دارد. فرض کنیم  $P(x, y)$  آنگاه با استفاده از فرمول فاصله پاره خط می‌توان نوشت:

$$\sqrt{(x+2)^2 + (y-1)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y-4)^2}$$



با به توان دو رساندن طرفین و ساده کردن داریم:

$$5x + 3y = 10$$

این معادله برای تمام نقاطی که از  $A$  و  $B$  هم فاصله‌اند برقرار است، بنابراین، معادله عمودمنصف  $AB$  است.

در مثال بالا شیب خط  $AB$  برابر  $\frac{3}{5}$  و شیب خط عمودمنصف آن برابر  $-\frac{5}{3}$  است. چه رابطه‌ای بین این دو شیب مشاهده می‌شود؟

*سینما هرینه و عکوس گذاشته شد*

به طور کلی:

اگر خطوط  $d$  و  $d'$  به ترتیب با شیب‌های  $m$  و  $m'$  بر هم عمود باشند آنگاه  $mm' = -1$  و بر عکس.

کاردر کلاس

نشان دهید نقطه  $P(-12, 11)$  روی عمودمنصف پاره خط واصل دو نقطه  $A(0, -3)$  و  $B(4, 15)$  قرار دارد.

$$PA = \sqrt{11^2 + 8^2} = \sqrt{380} \rightarrow PA = PB$$

$$PB = \sqrt{11^2 + 18^2} = \sqrt{380}$$

جواب مطلوب از حسنه  $P$  را با فاصله اس-بنابراین  $P$  روی عمودمنصف  $AB$  قرار دارد

$$AB \text{ بوسیله } M \left| \begin{array}{l} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m \\ 10 - (-3) = 4 \end{array} \right. \quad m_{AB} = \frac{11}{4} = 3 \quad m = -\frac{1}{3}$$

روش سوم

$$P \left| \begin{array}{l} -11 = n \\ 11 = v \end{array} \right. \quad 11 = -\frac{1}{3}(-12) + v \rightarrow 11 = 8 + v \quad \checkmark \quad \text{تسا ای } AB$$

روش سوم

$$m_{PM} = \frac{9 - 11}{12 - (-12)} = -\frac{1}{4} \quad m_{AB} = \frac{10 - (-3)}{4 - 0} = 3$$

$$m_{AB} \times m_{PM} = -1 \rightarrow PM \perp AB \quad \text{تسا ای } AB \text{ عمودمنصف } PM$$

## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان




### مختصات نقطه وسط یک پاره خط

#### فعالیت

$$x_M = ?$$

در شکل زیر نقطه  $M$  وسط پاره خط  $AB$  است. طول نقطه  $M$  چقدر است؟



- ۱** چه ارتباطی بین طول نقطه  $M$  و طول نقاط  $A$  و  $B$  مشاهده می کنید؟
- ۲** اگر  $A$  و  $B$  دو نقطه دلخواه روی محور  $x$  باشند، طول نقطه  $M$  را بحسب طول های نقاط  $A$  و  $B$  به دست آورید.


$$AM=MB$$

$$x_M - x_A = x_B - x_M \quad x_M = x_A + x_B \quad x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$$

- ۳** اگر  $A$  و  $B$  روی محور  $y$  و عرض نقاط  $A$  و  $B$  را با  $y_A$  و  $y_B$  شان دهیم و  $M$  وسط پاره خط  $AB$  باشد، چه دستوری برای محاسبه عرض نقطه  $M$  می توان بیان کرد؟

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

#### کادر کلاس



اگر  $A(1, 5)$  و  $B(5, 3)$  دو سر پاره خط  $AB$  و  $M(a, b)$  وسط این پاره خط باشد:

(الف) تصویر نقاط  $A$  و  $B$  و  $M$  را روی محورهای مختصات مشخص کنید.

(ب) با توجه به تصویر نقاط  $A$  و  $B$  و  $M$  روی محورهای مختصات نقطه  $M$  را به دست آورید.

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{1+5}{2} = 3$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{5+3}{2} = 4$$


اگر  $A$  و  $B$  دو نقطه در صفحه مختصات و  $M$  وسط پاره خط  $AB$  باشد. مختصات نقطه  $M$  برابر است با:

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۳۳ فصل اول: جبر و معادله

## فاصله یک نقطه از یک خط




اگر خط  $d$  و نقطه  $A$  در خارج آن داده شده باشد، فاصله نقطه  $A$  از خط  $d$  را همان کوتاه‌ترین فاصله  $A$  از  $d$  تعریف می‌کنیم. با توجه به آنکه طول عمود از طول مایل کوتاه‌تر است (چرا؟) این فاصله را عمود  $AH$  در نظر می‌گیریم.

بنابراین برای بدست آوردن فاصله هر نقطه از خط کافی است از آن نقطه بر خط عمودی رسم و طول پاره خط عمود شده را اندازه‌گیری کنیم.

### فعالیت

در شکل رو به رو خط  $d$  به معادله  $A(4,3)$  داده شده است.



عمود  $AH$  را بر خط  $d$  رسم کنید.

رابطه بین شیب‌های دو خط  $d$  و  $AH$  را بدست آورید.

شیب  $AH$  را بدست آورده و معادله خط  $AH$  را بنویسید.

دستگاه متشکل از دو خط  $d$  و  $AH$  را تشکیل دهید و مختصات محل برخورد دو خط (نقطه  $H$ ) را بدست آورید.

طول پاره خط  $AH$  را محاسبه کنید.

$$m_d = -\frac{1}{2} \quad m_{AH} = \frac{1}{2} \quad y - 3 = \frac{1}{2}(x - 4)$$

$$\rightarrow 2y = 2x - 10$$

$$\rightarrow 2y = 2x - 10 \quad AH \text{ نسبت}$$

$$3y - 10 = 2x - 10$$

به طور کلی اگر بخواهیم فاصله نقطه  $(x_0, y_0)$  از خط  $ax + by + c = 0$  را بدست آوریم، با استفاده از مراحل فعالیت قبل می‌توان نتیجه گرفت که طول عمود  $AH$  برابر است با:

$$AH = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

که در آن، وجود علامت قدر مطلق در صورت کسر برای نامنفی شدن مقدار  $AH$  می‌باشد.<sup>۱</sup>

۱- از اثبات فرمول به دلیل طولانی شدن صرف نظر می‌شود. دانشآموزان علاقه‌مند می‌توانند خود به اثبات آن بپردازند.

$$\begin{aligned} & \rightarrow \begin{cases} 3y - 2y = 12 \\ 3y - 2y = -8 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 12 \\ y = -8 \end{cases} \\ & AH = \sqrt{(4 - \frac{12}{2})^2 + (4 - \frac{-8}{2})^2} = \sqrt{16 + 36} = \frac{\sqrt{52}}{2} = 2\sqrt{13} \end{aligned}$$

# گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۲۴

مثال: فاصله نقطه  $(-2, 4)$  از خط  $y = \frac{4}{3}x + 4$  را بدست آورید.

حل: ابتدا معادله خط را به صورت  $4x - 3y + 12 = 0$  می نویسیم. طبق فرمول فاصله نقطه از خط، فاصله نقطه  $A$  تا خط  $d$  را  $AH$  فرض می کنیم و داریم:

$$AH = \frac{|4(-2) - 3(4) + 12|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{|-8|}{5} = \frac{8}{5}$$


مثال: فاصله نقطه  $(1, -4)$  از خط  $8x + 6y = k$  برابر ۴ است. مقدار  $k$  چقدر است؟

حل: ابتدا معادله خط را به صورت  $8x + 6y - k = 0$  می نویسیم. مطابق فرمول فاصله نقطه از خط داریم:

$$AH = \frac{|8(1) + 6(-4) - k|}{\sqrt{8^2 + 6^2}} \Rightarrow 4 = \frac{|-16 - k|}{10} \Rightarrow |-16 - k| = 40$$

$$-16 - k = 40 \Rightarrow k = -56$$


$$-16 - k = -40 \Rightarrow k = 24$$




کاردکلاس

۱۱ اگر نقطه  $A(2, 3)$  رأس یک مربع و معادله یک ضلع مربع  $3x - 4y = 9$  باشد، مساحت مربع چقدر است؟

$$AH: \frac{|12(2) - 12(3) - 9|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{\sqrt{25}} = 3 \quad S = 3 \times 3 = 9$$



۱۲ دو خط  $2x - 3y = 2$  و  $2x + 2y = 1$  معادله های دو ضلع یک مستطیل اند و نقطه  $A(2, 5)$  یک رأس مستطیل است. مساحت مستطیل چقدر است؟



$$AH = \frac{|2(2) - 3(5) - 2|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{13}{\sqrt{13}}$$

$$AE = \frac{|3(2) - 2(5) - 1|}{\sqrt{2^2 + 2^2}} = \frac{10}{\sqrt{8}}$$

$$S = AH \times AE = \frac{13}{\sqrt{13}} \times \frac{10}{\sqrt{8}} = 10$$


$$m_{BC} = \frac{a}{9} \quad c \mid \begin{array}{l} y - 3 = \frac{a}{9}(x - 3) \\ 9y - 27 = ax - 3a \end{array} \quad (2)$$

$\Delta x - 9y + 27 = 0$  BC نویس

$$AH = \frac{|a(-1) - 9(2) + 27|}{\sqrt{a^2 + 9^2}} = \frac{24}{\sqrt{109}}$$

فصل اول: جبر و معادله ۳۵

### تمرین



$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{109} \\ BC &= \sqrt{9^2 + 6^2} = \sqrt{109} \rightarrow AB = BC \end{aligned}$$

مثلث ABC به رأس های A(-1, 7) و B(-6, -2) و C(3, 3) را در نظر بگیرید.

الف) مثلث رارسم کنید.


ب) نشان دهید مثلث متساوی الساقین است.

پ) معادله عمود منصف ضلع BC را بدست آورید.

ت) طول ارتفاع AH چقدر است؟

پاک و صحن

۶) نقاط A(0, 6) و B(8, -8) نقاط دوسر قطب یک دایره‌اند. مختصات مرکز و طول شعاع دایره را بدست آورید.



$$AB = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{109} \rightarrow M \mid \begin{array}{l} \frac{0+8}{2} = 4 \\ \frac{6+(-8)}{2} = -1 \end{array} \rightarrow M(-1, 4)$$

۷) شکل نمای جانبی عدسی از منحنی سهمی به معادله  $y = x^2 - 8x - 20$  مطابق شکل زیر مدل سازی می‌شود.


الف) مختصات نقطه انتهای عدسی A و B را بدست آورید.

ب) اگر x بر حسب سانتی متر باشد طول AB را بدست آورید.

پ) اگر عدسی کاملاً متقارن و y بر حسب میلی متر باشد پیشترین ضخامت آن چقدر است؟

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{8}{2} = 4 \rightarrow y_{min} = x^2 - 8x - 20 = -36$$

پیشترین ضخامت عدسی =  $| -36 | = 36$




۸) ثابت کنید فاصله دو خط موازی  $ax + by + c = 0$  و  $ax + by + c' = 0$  می‌باشد.

$$A(n_1, y_1) \rightarrow ax_1 + by_1 + c = 0 \quad (1) \quad A(n_2, y_2) \rightarrow ax_2 + by_2 + c' = 0 \quad (2)$$

$$AH = \frac{|an_1 + by_1 + c'|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|c - c'|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|c - c'|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

خط  $4x + 3y = 5$  بر دایره  $O(-1, 2)$  مماس است. طول شعاع دایره چقدر است؟


$$R = \frac{|4(-1) + 3(2) - 5|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{3}{5}$$



## گروه ریاضی متوسطه دوم استان خوزستان

۳۶

۶ نقطه  $S(x, \lambda)$  روی نیم دایره‌ای به شعاع  $10$  در شکل روبه‌رو داده شده است.



$$R = OS \sqrt{x^2 + y^2} = 10 \quad x^2 + y^2 = 100$$

ب) شیب خط‌های  $PS$  و  $SQ$  را به دست آورید.

ب) نشان دهید  $P\hat{S}Q$  قائم است.

$$S \left| \frac{q}{\lambda} \right. P \left| \frac{-1}{0} \right. \rightarrow m_{PS} = \frac{0 - \Lambda}{-\frac{1}{0} - q} = \frac{1}{r}$$

$$S \left| \frac{q}{\lambda} \right. Q \left| \frac{1}{0} \right. \rightarrow m_{SQ} = \frac{0 - \Lambda}{0 - \frac{1}{0}} = r$$

$$m_{PS} \times m_{QS} = \frac{1}{r} \times -\gamma_2 - 1$$

$$PS \perp QS$$

$$\hat{P}\hat{S}\hat{Q} = q_0$$

**v** اگر فاصله نقطه  $A(1,2)$  از خط  $ax+4y=1$  برابر ۲ باشد، مقدار  $a$  چقدر است؟

$$AH = \frac{|a(1) + 4(2) - 1|}{\sqrt{a^2 + 4^2}} = \frac{|a + 8 - 1|}{\sqrt{a^2 + 16}} = \frac{|a + 7|}{\sqrt{a^2 + 16}} = 2$$

$$|a + 7| = 2\sqrt{a^2 + 16}$$

$$a^2 + 49 = 4(a^2 + 16)$$


$$a^2 + 49 = 4a^2 + 64$$

$$3a^2 = 5$$

$$a^2 = \frac{5}{3}$$

$$a = \pm \sqrt{\frac{5}{3}}$$

سے، اس، مثلث  $ABC$ ،  $C(3,1)$ ,  $B(-3,2)$ ,  $A(-11,-12)$  می باشند.



الف) طوا عمودی، را که از رأس  $B$  به میانه نظیر رأس  $C$  وارد می شود به دست آورید.

ب) مختصات رأس  $D$  را حنان تعیین کنید که  $ABCD$  یک متوازی الاضلاع باشد.


جواہریں

۹) نقطه‌ای روی خط  $y=2x$  تعیین کنید که مجموع فاصله‌های آن تا مبدأ مختصات و نقطه  $A(2,4)$  برابر ۵ باشد.

جواہر لیڈز صنعت

نقطه  $A(4,2)$  و  $B(-1,-1)$  و  $C(8,-2)$  سه رأس مثلث  $ABC$  هستند. اگر  $H$  و  $M$  به ترتیب پای ارتفاع  $AH$  و میانه  $AM$

باشند طول MH را به دست آورید. جوا- باس صادر



$$M \left| \begin{array}{c} \frac{q+1}{r} = \frac{v}{p} \\ -1 + (-1) = -1 \end{array} \right. \rightarrow M \left| \begin{array}{c} v \\ -1 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow MH = \left| e - \frac{v}{\gamma} \right| = \frac{1}{\gamma}$$

Can BC 2nd M

$$\left. \begin{array}{l}
 y = P_x \cos M \text{ 代入} - 9 \\
 MO + MA = \Delta \\
 \frac{\partial Y + P_n^2 + \sqrt{(n-y)^2 + (P_n - \gamma)^2}}{1 + 1/n - 1} = \Delta \\
 \sqrt{n^2 + \sqrt{\Delta(n-y)^2}} = \Delta \\
 n - n + \gamma = \sqrt{\Delta} \\
 P_n = \gamma - \sqrt{\Delta} \\
 x = 1 - \frac{\sqrt{\Delta}}{\gamma} \quad \text{左} \\
 x - n + \gamma = \sqrt{\Delta} \\
 \gamma = \sqrt{\Delta} \quad \text{右}
 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l}
 AB k_{AB} M / \frac{-10 - 10}{\gamma} z - \frac{10}{\gamma} - 1 \\
 -10 + 10 z - \Delta \\
 m M C = \frac{1 - (-\Delta)}{\gamma - (-10)} = \frac{\gamma}{10} = \frac{10}{\gamma} \\
 y - 1 = \frac{10}{\gamma} (\alpha - \gamma) \rightarrow 10y - 10 = 10\alpha - 10\gamma \\
 \rightarrow 10\alpha - 10y - 10 = 0 \\
 CM \text{ 代入} \\
 BH = \frac{|10C - 10| - 10(\gamma - 10)}{\sqrt{10^2 + 10^2}} = \frac{100}{\sqrt{200}} \Delta
 \end{array} \right\}$$