

نام و نام خانوادگی :	رشته : علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳
مدت امتحان: ۱۲۰:۱۰/۰۳	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳	ساعت شروع: ۱۰: صبح
مرکز ارزشیابی و نویسنده نظام آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.gov.ir">http://aee.medu.gov.ir</a>		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۱

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد) [استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد]	نمره
------	---	------

۱	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. الف) تابع $y = 2x(1-3x^2) + 1$ یک تابع چند جمله ای از درجه سوم است. ب) نمودار تابع $y = x^3$ در بازه $(0, +\infty)$ پایین تراز، نمودار تابع $y = x^3$ است. پ) هر تابع یکنوا، یک به یک است. ت) مقدار عددی عبارت $\cos 15^\circ - \sin 15^\circ$ برابر $\frac{\sqrt{3}}{2}$ است.	۱
۰/۵	درجاهای خالی عبارت ریاضی مناسب قرار دهید. الف) اگر $f(x) = 2x^3 - 1$ باشد، حاصل $(f^{-1})^{15}$ برابر ..... است. ب) حاصل حد تابع $f(x) = \frac{2x}{3x^2 - 1}$ وقتی $x \rightarrow +\infty$ میل می کند برابر ..... است.	۲
۱/۲۵	اگر $f(x) = 7 - 4x^2$ و $g(x) = \sqrt{x+3}$ باشد: الف) دامنه تابع $fog$ را با استفاده از تعریف به دست آورید. ب) مقدار $(gof)(1)$ را محاسبه کنید.	۳
۰/۷۵	اگر دامنه تابع $y = f(x)$ برابر $[1, 3]$ و برد آن $[2, 7]$ باشد. دامنه و برد تابع $y = f(\frac{x}{3})$ را بیابید.	۴
۱/۷۵	نمودار تابع با ضابطه $y = a \cos bx + c$ به صورت مقابل رسم شده است. مقادیر $a$ , $b$ و $c$ را به دست آورید.	۵
۱	نمودار تابع با ضابطه $y = \sin x$ و خط به معادله $y = \frac{1}{2}$ در دستگاه مختصات زیر، رسم شده است. طول نقاط برخورد آنها را بیابید. 	۶

«ادامه سوالات در صفحه دوم»

نام و نام خانوادگی :	رشته : علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳
مدت امتحان: ۱۲۰:۱۴۰۱/۱۰/۰۳	تاریخ امتحان: ۱۰: صبح ساعت شروع:	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در فوبت دی ماه سال ۱۴۰۱
مرکز ارزشیابی و نویسنده نظام آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.gov.ir">http://aee.medu.gov.ir</a>		

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد) [استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد]	نمره
------	---	------

۷	<p>نمودار تابع <math>f</math> به شکل مقابل است حد های زیر را محاسبه کنید.</p> <p>(الف) <math>\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)</math></p> <p>(ب) <math>\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)</math></p> <p>(پ) <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)</math></p>	۰/۷۵
۸	<p>حد زیر را در صورت وجود محاسبه کنید.</p> $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x-1}}{x^2 - 1}$	۱
۹	<p>نمودار تابع <math>f</math> به صورت زیر رسم شده است. اگر خط <math>d</math> در نقطه <math>A</math> بر نمودار تابع <math>f</math> مماس باشد:</p> <p>(الف) حاصل <math>\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}</math> را بیابید.</p> <p>(ب) شیب خط های مماس در نقاط <math>A</math> و <math>B</math> را مقایسه کنید.</p>	۰/۷۵
۱۰	<p>نمودار تابع <math>f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} + 2 &amp; x \geq 1 \\ (x-1)^2 &amp; x &lt; 1 \end{cases}</math> به صورت مقابل است:</p> <p>(الف) آیا تابع <math>f</math> در نقطه <math>x = 2</math> مشتق پذیر است؟</p> <p>(ب) آیا تابع در بازه <math>(-\infty, 2)</math> مشتق پذیر است؟ چرا؟</p> <p>(پ) مشتق راست تابع <math>f</math> در نقطه <math>x = 2</math> را به دست آورید.</p>	۱/۵
۱۱	<p>مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست)</p> <p>(الف) <math>f(x) = x(x-1)(x+1)</math></p> <p>(ب) <math>g(x) = \left(\frac{2x-1}{x+1}\right)^3</math></p>	۱/۵
۱۲	<p>جسمی را از سطح زمین به طور عمودی پرتاپ می کنیم، جهت حرکت به طرف بالا را مثبت در نظر می گیریم.</p> <p>فرض کنیم ارتفاع این جسم از سطح زمین در هر لحظه از معادله <math>h(t) = -4t^3 + 40t^2 - 4t</math> به دست می آید.</p> <p>(الف) سرعت متوسط در بازه <math>[2, 4]</math> را بیابید.</p> <p>(ب) در چه زمانی سرعت لحظه ای آن برابر ۱۶ متر بر ثانیه است؟</p>	۱/۲۵

«ادامه سوالات در صفحه سوم»

نام و نام خانوادگی :	رشته : علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ساعت شروع: ۱۰:۰۰ صبح	
مرکز ارزشیابی و نویسنده نظام آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.gov.ir">http://aee.medu.gov.ir</a>		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۴۰۱

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد) [استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد]	نمره
------	---	------

۱۳	نمودار تابع با ضابطه $f(x) = x^3 + bx^2 + d$ به صورت شکل مقابل رسم شده است. مقادیر $b$ و $d$ را بیابید.	۱/۵	
۱۴	دو عدد حقیقی بیابید که تفاضل آنها ۱۰ باشد و حاصل ضربشان کمترین مقدار ممکن گردد.	۱/۵	
۱۵	اگر در بیضی مقابل مختصات کانون $(4, 0)$ و مختصات راس $(0, 3)$ باشد: الف) قطر بزرگ بیضی را بیابید. ب) محیط مثلث $\triangle MFF'$ را بیابید.	۱/۵	
۱۶	معادله گسترده یک دایره به شکل $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$ است. مختصات مرکز دایره و اندازه شعاع دایره را بیابید.	۱	
۱۷	دو ظرف یکسان داریم. ظرف اول شامل ۵ مهره سبز و ۳ مهره آبی و ظرف دوم شامل ۴ مهره سبز و ۶ مهره آبی است. از ظرف اول مهره‌ای انتخاب کرده و در ظرف دوم قرار می‌دهیم. سپس یک مهره به تصادف از ظرف دوم انتخاب می‌کنیم. با چه احتمالی این مهره سبز است؟	۱/۵	
۲۰	جمع نمره "موفق باشید"	۲۰	

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: علوم تجربی ۳	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: زیاضی ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.gov.ir">http://aee.medu.gov.ir</a>	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در فوتبال دی ماه سال ۱۴۰۱		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	(الف) درست (۰/۲۵) ب) نادرست (۰/۲۵) پ) نادرست (۰/۲۵)	۱
۲	(الف) ۲ (۰/۲۵) ب) $\frac{2}{3}$ (۰/۲۵)	۰/۵
۳	(الف) $D_{fog} = \underbrace{\{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}}_{(0/25)} = \underbrace{\{x \in [-3, +\infty) \mid \sqrt{x+3} \in R\}}_{(0/25)} = [-3, +\infty)$ (۰/۲۵)	۰/۷۵
۴	(ب) $(gof)(1) = g(\sqrt{6}) = \sqrt{6}$ (۰/۲۵)	۰/۵
۵	برد تغییر نمی کند (۰/۲۵)	۰/۷۵
۶	$2T = \frac{7\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2}) = 4\pi$ (۰/۲۵) $\rightarrow T = 2\pi$ (۰/۲۵) $\rightarrow \frac{2\pi}{ b } = 2\pi$ (۰/۲۵) $\rightarrow b = \pm 1$ (۰/۲۵) $c = \frac{4+(-2)}{2} = 1$ (۰/۲۵) $ a  = \frac{4-(-2)}{2} = 3 \rightarrow a = -3$ (۰/۲۵)	۱/۷۵
۷	ادامه راهنمای تصحیح در صفحه بعد	۱
	- $\infty$ (۰/۲۵) + $\infty$ (۰/۲۵) -۲ (۰/۲۵)	۰/۷۵

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: زیاضی ۳	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسرا سر کشور در فوبت دی ماه سال ۱۴۰۱		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.gov.ir">http://aee.medu.gov.ir</a>	
ردیف	راهنمای تصحیح	ردیف	ردیف
۸	۱ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x-1}}{x^2-1} \times \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)\sqrt{x+1}} = \frac{1}{4}$ (۰/۲۵)		
۹	۰/۵ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = f'(2) = 2$ (۰/۵) الف) ۰/۲۵ $m_A > m_B$ (۰/۲۵) ب)		
۱۰	الف) خیر (۰/۲۵) ب) بله، در تمام نقاط بازه $(-\infty, 2)$ مشتق پذیر است. (۰/۵) پ) $x \geq 2 : f(x) = \sqrt{x-1} + 2 \rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \rightarrow f'_+(2) = \frac{1}{2}$ (۰/۲۵)		
۱۱	۰/۵ $f(x) = x^3 - x \rightarrow f'(x) = 3x^2 - 1$ (۰/۲۵) ۱ $g'(x) = \underbrace{3(\frac{2x-1}{x+1})}_{(۰/۵)} \underbrace{(\frac{2(x+1)-1(2x-1)}{(x+1)^2})}_{(۰/۵)}$ در قسمت الف به سایر روش‌های صحیح نمره تعلق گیرد.		
۱۲	۰/۷۵ $\frac{h(4)-h(2)}{4-2} = \frac{h(4)-h(2)}{2} = \frac{96-64}{2} = 16$ سرعت متوسط (الف) ۰/۵ $h'(t) = -8t + 40 = 16$ (۰/۲۵) $\rightarrow t = 3$ (۰/۲۵)		
۱۳	۱/۵ $f'(2) = 0$ (۰/۲۵) $\rightarrow f'(x) = 3x^2 + 2bx$ (۰/۲۵) $b = -3$ (۰/۲۵) $f(2) = 1$ (۰/۲۵) $\rightarrow 8 + (-12) + d = 1$ (۰/۲۵) $d = 5$ (۰/۲۵)		
ادامه راهنمای تصحیح در صفحه بعد			

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: زیاضی ۳	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در فوبت دی ماه سال ۱۴۰۱		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.gov.ir">http://aee.medu.gov.ir</a>	
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	
۱۴	$x - y = 10 \quad (0/25)$ $p = xy = x(x - 10) = x^2 - 10x \quad (0/25)$ $p' (x) = 2x - 10 = 0 \quad (0/5) \rightarrow x = 5 \quad (0/25) \quad , \quad y = -5 \quad (0/25)$	۱/۵	
۱۵	$\begin{cases} b = 3 \quad (0/25) \\ c = 4 \quad (0/25) \end{cases} \rightarrow a^2 = b^2 + c^2 \quad (0/25) \rightarrow 2a = 10 \quad (0/25)$ الف)  $\text{محیط} = \underbrace{2a + 2c}_{(0/25)} = 18 \quad (0/25)$ ب)	۱	
۱۶	$O\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right) = (-1, -1) \quad (0/5) \quad , \quad r = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 - 4c} = \sqrt{10} \quad (0/5)$	۱	
۱۷	$P(A) = P(B_1)P(B_1 A) + P(B_2)P(B_2 A) \quad (0/25)$ $P(A) = \underbrace{\frac{5}{11}}_{(0/5)} \times \underbrace{\frac{5}{11}}_{(0/5)} + \underbrace{\frac{3}{11}}_{(0/5)} \times \underbrace{\frac{4}{11}}_{(0/5)} = \frac{37}{88} \quad (0/25)$ به روش حل نمودار درختی نمره تعلق گیرد.	۱/۵	
	«همکاران مصحح: به راه حل های صحیح به تناسب بارم، نمره تعلق گیرد»	۲۰	