


نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷	تعداد صفحه: ۴	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسرا سرکشور درنوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱ <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>				ساعت شروع: ۸ صبح

ردیف	نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)
۱	۱/۷۵	<p>توجه: استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.</p> <p>در هر مورد واژه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.</p> <p>(آ) عنصرهای دسته <math>\frac{p}{d}</math> « جدول دوره‌ای همگی فلزند.</p> <p>ب) سازنده اصلی برخی لوازم پلاستیکی « <math>\frac{\text{پلی اتن}}{\text{کلرو اتان}}</math> » است.</p> <p>پ) لیتیم اکسید (<math>\text{Li}_2\text{O}</math>) در آب « <math>\frac{\text{آبی}}{\text{باز}}</math> آرنیوس بوده و کاغذ <math>\text{H}\text{p}</math> در این محلول « <math>\frac{\text{سرخ}}{\text{آبی}}</math> » است.</p> <p>ت) در بای الکترونی عاملی است که چیدمان کاتیون‌ها را در شبکه بلوری « <math>\frac{\text{فلزها}}{\text{ترکیبات یونی}}</math> » حفظ می‌کند.</p> <p>ث) با افزایش دمای یک سامانه تعادلی، واکنش درجهت « <math>\frac{\text{صرف}}{\text{تولید}}</math> » گرمای پیش می‌رود و اگر این واکنش گرماگیر باشد، ثابت تعادل « <math>\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}</math> » می‌یابد.</p>
۲	۱/۷۵	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های <b>فادرست</b> را بنویسید.</p> <p>(آ) یک جعبه <b>سیاه‌رنگ</b>، همه طول موج‌های مرئی را بازتاب می‌کند.</p> <p>ب) مخلوط آب و روغن و صابون یک <b>کلویید</b> پایدار را تشکیل می‌دهد.</p> <p>پ) در مبدل کاتالیستی خودروهای <b>بنزینی</b> با ورود آمونیاک، گازهای <math>\text{NO}_x</math> و <math>\text{NO}_2</math> به گاز نیتروژن تبدیل می‌شوند.</p> <p>ت) شیمی‌دان‌ها برای اندازه‌گیری پتانسیل استاندارد (<math>E^\circ</math>) نیم‌سلول‌ها، از محلول‌های الکترولیتی با <b>غلظت ۱/۰ مولار</b> استفاده می‌کنند.</p>
۳	۰/۷۵	<p>نقشه پتانسیل رو به رو مربوط به مولکول یک مایع است. توضیح دهید آیا با نزدیک کردن میله شیشه‌ای باردار به باریکه این مایع می‌توان آن را از راستای حرکت خود منحرف نمود؟</p>
۴	۱	<p>اگر درصد یونش در محلولی از استیک اسید (<math>\text{CH}_3\text{COOH}</math>) برابر با <math>2/3\%</math> و غلظت یون هیدرونیوم در آن <math>2 \times 10^{-9} \text{ mol/l}</math> باشد.</p> <p>(آ) معادله یونش این اسید را بنویسید.</p> <p>ب) غلظت محلول را محاسبه کنید.</p>
		"ادامه سوالات در صفحه دوم"

۱/۲۵	<p>با توجه به نیم واکنش های داده شده، به پرسش های زیر پاسخ دهید.</p> <p><math>\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu(s)} \quad E^\circ = +/34 \text{ V}</math>      <math>\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag(s)} \quad E^\circ = +/80 \text{ V}</math></p> <p>(آ) در سلول گالوانی مس-نقره، کدام فلز نقش آند را ایفا می کند؟ چرا؟</p> <p>(ب) در این سلول گالوانی با گذشت زمان جرم کدام تیغه افزایش می یابد؟</p> <p>(پ) این سلول را حساب کنید.</p>	۵												
۱	<p>با توجه به واکنش زیر به پرسش ها پاسخ دهید.</p> <p><math>\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{اكسنده} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{H} &amp; \text{C} &amp; * \\   &amp; - &amp;   \\ \text{OH} &amp; &amp; \text{OH} \end{array}</math></p> <p>(آ) نام ترکیب (a) را بنویسید.</p> <p>(ب) اکسنده مناسب این واکنش چیست؟</p> <p>(پ) عدد اکسایش اتم کربن ستاره دار را به دست آورید.</p>	۶												
۱/۲۵	<p>با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>نسبت بار به ساعت</th> <th>شاعع (pm)</th> <th>یون</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>2 / 77 \times 10^{-2}</math></td> <td>۷۲</td> <td><math>\text{Mg}^{2+}</math></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>۱۰۲</td> <td><math>\text{Na}^+</math></td> </tr> <tr> <td><math>7 / 5 \times 10^{-3}</math></td> <td>۱۳۳</td> <td><math>\text{F}^-</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>(آ) نسبت بار به ساعت یون <math>\text{Na}^+</math> را حساب کنید.</p> <p>(ب) آنتالپی فروپاشی شبکه مینیزیم فلوئورید (<math>\text{MgF}_7</math>) بیشتر است یا سدیم فلوئورید (<math>\text{NaF}</math>)؟ چرا؟</p>	نسبت بار به ساعت	شاعع (pm)	یون	$2 / 77 \times 10^{-2}$	۷۲	$\text{Mg}^{2+}$	.....	۱۰۲	$\text{Na}^+$	$7 / 5 \times 10^{-3}$	۱۳۳	$\text{F}^-$	۷
نسبت بار به ساعت	شاعع (pm)	یون												
$2 / 77 \times 10^{-2}$	۷۲	$\text{Mg}^{2+}$												
.....	۱۰۲	$\text{Na}^+$												
$7 / 5 \times 10^{-3}$	۱۳۳	$\text{F}^-$												
۱/۲۵	<p>در سامانه تعادلی <math>2\text{SO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta H &gt; 0</math> حجم ظرف را در دمای ثابت از ۷ لیتر به ۲ لیتر کاهش می دهیم. در تعادل جدید هر یک از موارد زیر نسبت به تعادل اولیه چه تغییری می کند؟ چرا؟</p> <p>(آ) تعداد مول های <math>\text{SO}_2(\text{g})</math></p> <p>(ب) مقدار ثابت تعادل (K)</p>	۸												
۲	<p>دلیل هر یک از عبارت های زیر را بنویسید.</p> <p>(آ) مخلوط مس (II) سولفات و آب پخش نور ندارد.</p> <p>(ب) در ساخت متنها و ابزار برش شبشه از الماس استفاده می شود.</p> <p>(پ) نسبت به <math>\text{N}_2</math> در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع است.</p> <p>(ت) برخلاف حلبي از آهن گالوانيزه فمي توان برای ساختن ظروف بسته بندی مواد غذايی استفاده نمود.</p>	۹												
	"ادامه سوالات در صفحه سوم"													

۱/۲۵	<p>a) <math>Zn(s) + Cd^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cd(s)</math>  b) <math>Cd(s) + Pt^{2+}(aq) \rightarrow Cd^{2+}(aq) + Pt(s)</math>  c) <math>Zn(s) + Mg^{2+}(aq) \rightarrow</math> انجام نمی شود</p> <p>(آ) گونه های اکسیده و کاهنده را در واکنش «a» مشخص کنید.  (ب) آیا با قرار دادن تیغه پلاتینی (Pt) درون محلولی از یون های منیزیم (<math>Mg^{2+}</math>) واکنش انجام می شود؟ چرا؟</p>	۱۰										
۱	<p>شکل زیر نمودار انرژی - پیشرفت یک واکنش را در حضور کاتالیزگر و بدون کاتالیزگر نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.</p>  <p>(آ) تعیین کنید این واکنش گرماده است یا گرمایشی است؟ چرا؟  (ب) کدام نمودار مربوط به انجام واکنش در حضور کاتالیزگر است؟ چرا؟</p>	۱۱										
۱/۵	<p>با توجه به پاک کننده های داده شده به پرسش ها پاسخ دهید.</p> <p>(آ) کدام یک پاک کننده غیر صابونی است؟  (ب) تعیین کنید هر یک از بخش های «۱ و ۲» در پاک کننده آب دوست است یا آب گریز؟  (پ) برای باز کردن لوله فاضلابی که با اسیدهای چرب مسدود شده، کدام پاک کننده مناسب تر است؟ چرا؟</p> <table border="1" data-bbox="244 1256 775 1657"> <tbody> <tr> <th>فرمول ساختاری پاک کننده</th> <th>پاک کننده</th> </tr> <tr> <td>HCl</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td><math>C_{17}H_{25}-\overset{\text{COO}^-}{\underset{\text{Bخش}}{\text{K}^+}}</math></td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>NaOH</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td><math>C_{11}H_{25}-C_6H_4-SO_4^-Na^+</math></td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>	فرمول ساختاری پاک کننده	پاک کننده	HCl	A	$C_{17}H_{25}-\overset{\text{COO}^-}{\underset{\text{Bخش}}{\text{K}^+}}$	B	NaOH	C	$C_{11}H_{25}-C_6H_4-SO_4^-Na^+$	D	۱۲
فرمول ساختاری پاک کننده	پاک کننده											
HCl	A											
$C_{17}H_{25}-\overset{\text{COO}^-}{\underset{\text{Bخش}}{\text{K}^+}}$	B											
NaOH	C											
$C_{11}H_{25}-C_6H_4-SO_4^-Na^+$	D											
۱	pH محلول بازی BOH برابر <u>۱۳</u> است، غلظت یون هیدرونیوم و یون هیدروکسید را در این محلول محاسبه کنید.	۱۳										
	"ادامه سوالات در صفحه چهارم"											

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۴	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	سؤالات امتحان: شیمی ۳
ساعت شروع: ۸:۰۰	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسرا سرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱ <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>			

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱۴	<p>با توجه به جدول داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.</p> <p>(آ) باران اسیدی حاوی کدام اسیدها است؟</p> <p>ب) در شرایط یکسان، محلول کدام اسید رسانایی الکتریکی کمتری دارد؟ چرا؟</p> <p>پ) در دمای اتاق سرعت واکنش یک قطعه نوار منیزیم با <math>100 \text{ میلی لیتر محلول } 1\text{/}0\text{ مولار کدام اسید } \text{HNO}_3 \text{ یا HCOOH}</math> بیشتر خواهد بود؟ چرا؟</p>	۱/۷۵
۱۵	<p>شکل زیر یک سلول سوختی (هیدروژن - اکسیژن) را نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.</p> <p>(آ) این فرآیند در چه سلولی (گالوانی یا الکتروولتی) انجام می‌شود؟ چرا؟</p> <p>ب) به جای «A» و «B» واژه توصیفی یا نماد شیمیایی مناسب قرار دهید.</p> <p>پ) فراورده نهایی در این سلول سوختی چیست؟</p> <p>ت) یک چالش در کاربرد این سلول سوختی را بنویسید.</p>	۱/۵
	جمع نمره	پیروز باشید.

۱ H ۱/۰۰۸	راهنمای جدول تناوبی عنصرها										۲ He ۴/۰۰۳
۳ Li ۶/۹۴۱	عدد اتمی C جرم اتمی هیانگین										۱۰ Ne ۲۰/۱۸
۱۱ Na ۲۲/۹۹	۵ B ۱۰/۸۱										۱۶ F ۱۹/۰۰
۱۹ K ۳۹/۱۰	۲۰ Ca ۴۰/۰۸	۲۱ Sc ۴۴/۹۶	۲۲ Ti ۴۷/۸۷	۲۳ V ۵۰/۹۴	۲۴ Cr ۵۲/۰۰	۲۵ Mn ۵۴/۹۴	۲۶ Fe ۵۵/۸۵	۲۷ Co ۵۸/۹۳	۲۸ Ni ۵۸/۶۹	۲۹ Cu ۶۳/۵۵	۳۰ Zn ۶۵/۳۹
	۲۱ Ga ۶۹/۷۲	۲۲ Ge ۷۲/۶۴	۲۳ As ۷۴/۹۲	۲۴ Se ۷۸/۹۶	۲۵ Br ۷۹/۹۰	۲۶ Kr ۸۳/۸۰					

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷	ساعت شروع: ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	راهنمای تصحیح
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	(آ) $d(0/25)$ (ص ۸۷) ب) پلی اتن (۰/۲۵) (ص ۱۱۲) پ) باز (۰/۲۵)-آبی (۰/۲۵) (ص ۱۶) ت) فلزها (۰/۲۵) (ص ۸۲) ث) مصرف (۰/۲۵) - افزایش (۰/۲۵) (ص ۱۰۶)	۱/۷۵
۲	(آ) نادرست (۰/۲۵) یک جعبه سفید رنگ، همه طول موج‌های مرئی را بازتاب می‌کند. (ب) درست (۰/۲۵) (ص ۷) (پ) نادرست (۰/۲۵) در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی با ورود آمونیاک، گازهای $NO_2$ به گاز نیتروژن تبدیل می‌شوند. (ت) نادرست (۰/۲۵) شیمی دانها برای اندازه‌گیری پتانسیل استاندارد ( $E^\circ$ ) نیمسلول‌ها، از محلول‌های الکتروولیتی با غلظت ۱ مولار استفاده می‌کنند.	۰/۵
۳	بله (۰/۲۵) زیرا این مایع دارای مولکول‌های قطبی است و توزیع الکترون‌ها بر روی اتم‌های آن یکنواخت نیست (یا تراکم بار الکتریکی بر روی اتم‌های آن یکسان نیست). (۰/۵) (ص ۷۵)	۰/۷۵
۴	(آ) $CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$ (ب) $\frac{[H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{1/92 \times 10^{-2}}{[CH_3COOH]} \times 100 \rightarrow \frac{3/2}{[CH_3COOH]} \times 100 \rightarrow \frac{[CH_3COOH]}{(0/25)} = 0/6 mol.L^{-1}$ (۰/۵) (ص ۱۹)	۰/۵
۵	(آ) مس (۰/۲۵) پتانسیل کاهشی استاندارد آن کوچک‌تر بوده و تمایل آن به اکسید شدن بیشتر است. (ب) نقره (۰/۲۵) (پ) $emf = E_c^\circ - E_a^\circ \Rightarrow emf = +0/80 - (0/34) = 0/46 V$	۰/۲۵
۶	(آ) اتیلن گلیکول (۰/۲۵) (پ) محلول آبی و رقیق پتاسیم پرمanganat (۰/۵) (۰/۲۵) (ص ۱۱۶)	۰/۵
۷	(آ) $\frac{1}{102} = \frac{9/8 \times 10^{-3}}{(0/25)}$ نسبت بار به شاعع بار یون نسبت بار به شاعع یون (۰/۵) (ص ۷۸)	۰/۵
	"ادامه راهنمای تصحیح در صفحه دوم"	

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳	تعداد صفحه: ۳
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷	ساعت شروع: ۸ صبح	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>
ردیف	راهنمای تصحیح	راهنمای تصحیح	نمره
۸	آ) تعداد مول $\text{SO}_4^{2-}$ افزایش می‌باید ( $0/25$ ) – با کاهش حجم، فشار افزایش یافته ( $0/25$ ) و طبق اصل لوشا تلیه واکنش در جهت شمار مول‌های گازی کمتر پیش می‌رود. ( $0/25$ )		$0/25$
۹	ب) مقدار ثابت تعادل $K$ تغییر نمی‌کند ( $0/25$ ) – زیرا ثابت تعادل $K$ فقط به دما بستگی دارد (یا دما ثابت است). ( $0/25$ ) (ص ۶۳)		$0/5$
۱۰	آ) زیرا مخلوط این دو ماده، محلول است ( $0/25$ ) و اندازه ذرات تشکیل‌دهنده آنها به قدر کافی بزرگ نیست که توانایی پخش نور را داشته باشند. ( $0/25$ ) ص ۷		$0/5$
۱۱	ب) الماس جامد کووالانسی است ( $0/25$ ) و در سرتاسر ساختار آن اتم‌های کربن با پیوند اشتراکی به هم متصل‌اند. این ساختار، سخت و برای برش شبشه مناسب است. ( $0/25$ ) ص ۷۰		$0/5$
۱۲	پ) زیرا تفاوت بین نقاط ذوب و جوش آن بیشتر ( $0/25$ ) و نیروهای جاذبه میان ذره‌های سازنده آن قوی‌تر است. ( $0/25$ ) ص ۷۶		$0/5$
۱۳	ت) زیرا روی بخلاف قلع با مواد غذایی واکنش می‌دهد و باعث فساد و مسمومیت مواد غذایی می‌شود. ( $0/25$ ) ص ۵۹		$0/5$
۱۰	(آ) اکسیده ( $0/25$ ) $\text{Zn}^{2+}$ : کاهنده ( $0/25$ ) ص ۴۲		$0/5$
۱۴	ب) خیر ( $0/25$ ) زیرا قدرت کاهنده‌ی فلز پلاتین ( $Pt$ ) از فلز منیزیم ( $Mg$ ) کمتر است. ( $0/25$ ) ص ۴۳		$0/75$
۱۵	آ) گرماده ( $0/25$ ) زیرا سطح انرژی فراورده‌ها از واکنش‌دهنده‌ها پایین‌تر است. ( $0/25$ )		$0/5$
۱۶	ب) نمودار (۲) ( $0/25$ ) زیرا کاتالیزگر انرژی فعال‌سازی را کاهش می‌دهد. ( $0/25$ )		$0/5$
۱۷	(آ) پاک‌کننده $D$ ( $0/25$ ) ص ۱۰		$0/25$
۱۸	ب) بخش ۱: آب‌گریز ( $0/25$ ) بخش ۲: آب‌دوست ( $0/25$ ) ص ۶		$0/5$
۱۹	پ) پاک‌کننده $C$ یا $\text{NaOH}$ ( $0/25$ ) زیرا سبب خنثی شدن اسید چرب می‌شود ( $0/25$ ) در ضمیم با اسید چرب صابون تولید می‌کند و خود پاک‌کننده است. ( $0/25$ ) ص ۳۱		$0/75$
	"ادامه راهنمای تصحیح در صفحه سوم"		

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۳/۷	ساعت شروع: ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱	مركز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	http://aee.medu.ir
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۳	ص ۲۵ تا ۲۸ $\left[ \text{H}^+ \right] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow \left[ \text{H}^+ \right] = 10^{-13}$ $\left( \frac{-}{25} \right)$ $\left[ \text{H}^+ \right] \left[ \text{OH}^- \right] = 10^{-14} \Rightarrow \left[ \text{OH}^- \right] = \frac{10^{-14}}{10^{-13}} = \frac{1}{10} \text{ mol.L}^{-1}$ $\left( \frac{-}{25} \right)$	۱
۱۴	(۰/۲۵) $\text{HNO}_3$ و (۰/۲۵) $\text{H}_2\text{SO}_4$ (آ)	۰/۵
ب) (۰/۲۵) $\text{HCOOH}$ - زیرا یک اسید ضعیف است (۰/۲۵) و در آب به طور کامل یونیده نمی‌شود.	۰/۷۵	
پ) (۰/۲۵) $\text{HNO}_3$ - چون قدرت اسیدی بیشتری دارد. (۰/۲۵) ص ۲۳ تا ۲۴	۰/۵	
۱۵	آ) گالوانی (۰/۲۵) زیرا برای انجام آن نیاز به استفاده از باتری نیست (یا چون این واکنش به صورت خودبه‌خودی انجام می‌شود). (۰/۲۵)	۰/۵
ب) (۰/۲۵) $\text{B}$ : آند با کاتالیزگر (۰/۲۵)	۰/۵	
پ) آب (۰/۲۵)	۰/۲۵	
ت) (۰/۲۵) ص ۵۱ تا ۵۳ تمامی سوخت آن است.	۰/۲۵	
	همکار گرامی خسته نباشد.	جمع نمره ۲۰

همکار محترم: لطفاً در صورت مشاهده پاسخ‌های صحیح و مشابه کتاب درسی (به جز به کار بردن تناسب در حل مسائل عددی) نمره منظور فرمایید.