


۱. از آبکافت ۵,۳۴ کیلوگرم از استر زیر با بازده ۷۵ درصد، در صورتی که محصول دیگر واکنش ترکیبی با فرمول $C_3H_8O_3$ باشد، چند گرم اسیدچرب به دست می‌آید؟ ($CO = 16, C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1}$)



۳۸۳۴ [۲]

۱۲۷۸ [۴]

۵۱۱۲ [۱]

۶۸۱۶ [۳]

۲. اگر در واکنش: $Zn(s) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow Zn(NO_3)_2(aq) + 2Ag(s)$ ، که با وارد کردن تیغه فلز روی در ۲۰۰ میلیلیتر محلول ۲ مولار نقره نیترات انجام گرفته و کامل شده است، ۲,۴۱۶ گرم بر جرم تیغه روی افزوده شده باشد، بازده درصدی واکنش (براساس جرم ذرات نقره جانشین شده بر سطح تیغه روی)، کدام است؟ خارج از کشور-۱۳۹۵

(حجم محلول ثابت فرض شود: $Zn = 65, Ag = 108 : g \cdot mol^{-1}$)

۸۵ [۴]

۸۰ [۲]

۶۵ [۲]

۶۰ [۱]

۳. چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

قلم چی-۱۳۹۶

الف) پس از پدید آمدن ذره‌های زیر اتمی مانند الکترون، پروتون و نوترون، عنصرهای هیدروژن و هلیم پا به عرصه‌ی جهان گذاشتند.

ب) اگر در خورشید، در هر ثانیه پنج میلیون تن ماده به انرژی تبدیل شود، در هر ثانیه حدود $10^{26} \times 10^{24} / 5$ کیلوژول انرژی تولید می‌شود.

پ) حدود ۲۲ درصد از عنصرهای شناخته شده به طور مصنوعی ساخته می‌شوند.

ت) مرگ ستاره‌ها با یک انفجار بزرگ همراه است که سبب می‌شود عنصرهای تشکیل‌دهنده آن‌ها در سراسر گیتی پراکنده شوند.

۴ [۴]

۳ [۲]

۲ [۲]

۱ [۱]

۴. یک قطعه سیم مسی در $200mL$ محلول ۴ مولار نقره نیترات قرار داده شده است. اگر سرعت متوسط واکنش برابر $0,15 mol \cdot min^{-1}$ باشد، چند ثانیه زمان لازم است تا غلظت مس (II) نیترات به $1,0$ مول بر لیتر برسد و اگر $Ag(s)$ تنها بر روی قطعه مس بشیند، جرم این قطعه در این لحظه، چند گرم تغییر می‌کند؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید) ($Cu = 64, Ag = 108 : g \cdot mol^{-1}$)

۰,۸۸, ۱۴۰۰ [۴]

۳,۰۴, ۴۰۰ [۲]

۰,۸۸, ۸۰ [۲]

۳,۰۴, ۸۰ [۱]

۵. در عناصر دوره چهارم جدول تناوبی چه تعداد از عناصر دارای زیرلایه $3d$ کاملاً پر هستند و چه تعداد از عناصر در آخرین لایه خود بیش از یک الکترون دارند؟

قلم چی-۱۳۹۷

۱۷۶ [۴]

۱۵۶ [۲]

۱۷۶ [۲]

۱۵۶ [۱]

۶. اگر در شرایط استاندارد در یک سلول گالوانی «آهن - هیدروژن» پس از گذشت ۵ ثانیه وزن آند ۱,۶۸ گرم کاهش یابد، با گذشت ۱۰ ثانیه از شروع واکنش pH نیم‌سلول هیدروژن چه مقدار خواهد بود؟ (حجم محلول در هر دو نیم‌سلول $300mL$ است) ($Fe = 56 : g \cdot mol^{-1}$)

۰,۲ [۴]

۰,۱ [۲]

۰,۱۴ [۲]

۰,۰۶ [۱]

۷. اگر در آرایش الکترونی یون X^{2+} که مربوط به عنصری از تناوب چهارم است، نسبت به تعداد الکترون‌ها با $2 = l$ به تعداد الکترون‌ها با $1 = l$ باشد، در این کاتیون چند الکترون وجود دارد؟

قلم چی-۱۳۹۸

۲۴ [۴]

۲۲ [۲]

۲۱ [۲]

۲۳ [۱]

۸. در فرایند تعادلی تولید $SO_3(g)$ ، ۶ مول از هر یک از گازهای SO_2 و O_2 در یک ظرف ده لیتری واکنش می‌دهند. پس از خارج شدن ۲ مول از فراورده و برقراری دوباره‌ی تعادل، غلظت $SO_3(g)$ به $2,0$ مول بر لیتر رسیده است. مقدار ثابت تعادل این واکنش چند $L \cdot mol^{-1}$ است؟

خارج از کشور-۱۳۹۴

۲۵ [۴]

۱۲,۵ [۲]

۲,۵ [۲]

۱,۲۵ [۱]

۹. اگر انرژی لازم برای ذوب کردن ۳۶۰ تن آهن را از طریق واکنش هسته‌ای تبدیل هیدروژن به هلیم تأمین کنیم، چند میلی‌گرم ماده باید به انرژی تبدیل گردد؟ (فرض کنید برای ذوب شدن یک گرم آهن، ۲۵۰ ژول انرژی لازم است.)
قلم چی-۱۳۹۶

۱۰ [۴]

۱۰۰ [۳]

۱ [۲]

۱۰۰۰ [۱]

۱۰. در یک ظرف استوانه‌ای با پیستون روان با حجم ۳ لیتر، ۳ مول از هر یک از گازهای شرکت کننده در واکنش: $COCl_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + Cl_2(g)$ ، چند مول بر خارج از کشور-۱۳۹۴ لیتر می‌شود؟


۱,۵ [۴]

۲,۵ [۳]

۳ [۲]

۴ [۱]

۱۱. اگر ۵۰ درصد وزن تنی یک درخت را سلولز_n ($C_6H_{10}O_5$) تشکیل دهد، چند کیلوگرم زغال با خلوص ۹۰ درصد از حرارت دادن یک تنۀ درخت با جرم ۸۱ kg می‌توان به دست آورد؟ ($H = 1, C = 12, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$)
خارج از کشور-۱۳۹۸




۴۲ [۴]

۴۰ [۳]

۲۰ [۲]

۱۶,۲ [۱]

۱۲. ۱۲,۲ گرم کربن را وارد واکنش زیر کرده‌ایم. اگر مجموع جرم نوترون‌ها ۶,۰۵۴ گرم و مجموع جرم پروتون‌ها ۶,۰۵۴ گرم باشد، تغییرات انرژی در این واکنش چند ژول است؟ (سرعت نور $\frac{m}{s} = ۱۰^۸ \times ۳$ است.)
قلم چی-۱۳۹۶




 ۱,۸ × ۱۰^۶ [۴]

 ۵,۴ × ۱۰^{۱۲} [۳]

 ۲,۵۸ × ۱۰^۷ [۲]

 ۷,۷۴ × ۱۰^{۱۳} [۱]

۱۳. از تجزیۀ کامل ۴۰ گرم سدیم هیدروژن کربنات، طبق واکنش زیر ۳۳,۸ گرم ماده جامد در ظرفی باقی می‌ماند. درصد خلوص سدیم هیدروژن فار-۱۳۹۸ کربنات کدام است؟



۴۰,۵ [۴]

۴۲ [۳]

۴۳,۵ [۲]

۴۶ [۱]

۱۴. فرض کنید در واکنش هسته‌ای تولید یک مول هلیم از هیدروژن، حدود ۰,۰۲۴ g ماده به انرژی تبدیل می‌شود. انرژی حاصل از واکنشی که ۰,۰۲۴ g هلیم تولید کند، چند روز انرژی مورد نیاز یک کارگاه ذوب آهن، با توان تولید ۱ تن آهن در روز را تأمین می‌کند؟ ($C = ۱۰^{۱۷} \frac{m^3}{mol^2}$)
قلم چی-۱۳۹۶ جرم مولی هلیم و $J = ۲۴۰$ = انرژی لازم برای تولید یک گرم آهن)


۰,۰۲۴ روز [۴]

۲۴ روز [۳]


۱۰۰ روز [۲]

۱۰ روز [۱]

۱۵. در خلال مطالعه واکنش: $2N_2H_4(l) + N_2O_4(l) \rightarrow 3N_2(g) + 4H_2O(g)$ یک مهندس شیمی متوجه می‌شود که بازده_(g) به دست آمده کمتر از میزان مورد انتظار است و در می‌یابد که واکنش جنبی زیر اتفاق می‌افتد:



در یک آزمایش، وقتی $147/2$ گرم $N_2O_4(l)$ و مقدار کافی $N_2H_4(l)$ به کار گرفته شود، ۹ گرم از $NO(g)$ تشکیل می‌شود. بالاترین بازده مورد انتظار N_2 چه اندازه است؟



۷۶,۳۵ [۴]

۱۲۶ [۳]

۷۵,۵ [۲]

۱۱۰,۲۵ [۱]

۱۶. اگر با استفاده از تبدیل مقداری هیدروژن به انرژی، ۱۸ تن از بخار چاه‌ای آب شود، هیدروژن استفاده شده تقریباً شامل چند اتم بوده است؟ (فرض کنید برای ذوب هر گرم بخار ۳۲۰ ژول انرژی لازم است و $C = ۳ \times 10^8 \frac{m}{s}$)
قلم چی-۱۳۹۸

 ۱,۹۲ × ۱۰^{۱۶} [۴]

 ۳,۸۵ × ۱۰^{۱۶} [۳]

 ۱,۹۲ × ۱۰^{۱۹} [۲]

 ۳,۸۵ × ۱۰^{۱۹} [۱]

۱۷. مخلوطی از پتاسیم نیترات خالص و پتاسیم کلرات خالص که در مجموع یک مول ماده را تشکیل می‌دهد، به‌طور کامل حرارت می‌دهیم. اگر جمعاً گرم اکسیژن حاصل شود، درصد خلوص پتاسیم نیترات در این مخلوط تقریباً کدام است؟
خوشخوان- ۱۳۹۸

$$(KNO_3 = 101, O = 16, KClO_3 = 122.5 : g \cdot mol^{-1})$$



۸۶ [۴]

۳۲ [۳]

۴۶ [۲]

۷۱ [۱]

۱۸. پژوهش‌ها نشان داده است که یک ستاره با چگالی بالا و جرمی در حدود 10^4 برابر خورشید، در حدود 10^5 مرتبه بیشتر از خورشید، انرژی از خود گسیل می‌کند. اگر فرض کنیم خورشید روزانه به تقریب 10^{20} کیلوژول انرژی به اطراف آزاد کند و اگر انرژی آزاد شده از ستاره‌ی یاد شده به طور کامل توسط مقداری یخ صفر درجه ($H_2O(s)$) جذب شود، این مقدار انرژی در مدت 10^3 روز می‌تواند چند تن بخ را ذوب کند؟ (برای ذوب شدن 1~g بخ صفر درجه، حدود 60000 ژول انرژی نیاز است).
قلم‌چی- ۱۳۹۶


$$18 \times 10^{22}$$

$$18 \times 10^{19}$$

$$9 \times 10^{19}$$

$$9 \times 10^{22}$$

۱۹. در اثر تجزیه چند گرم سدیم آزید (NaN_3) 52% خالص با بازده درصدی 25% ، 84 میلی‌لیتر گاز N_2 با چگالی $\frac{g}{cm^3}$ تولید می‌شود؟
خوشخوان- ۱۳۹۸



۱۰۰ [۴]

۷۵ [۳]

۱۲۵ [۲]

۵۰ [۱]

۲۰. اگر در واکنش هسته‌ای تولید یک مول هلیم از هیدروژن، 2002 گرم ماده به انرژی تبدیل شود، انرژی حاصل از واکنشی هسته‌ای که در آن 2 گرم هلیم تولید شود، چند تن مس را ذوب خواهد کرد؟ ($He = 4g \cdot mol^{-1}$ و انرژی لازم برای ذوب شدن یک گرم مس 200 ژول می‌باشد).
قلم‌چی- ۱۳۹۷

$$150$$

$$450000$$

$$450$$

$$150000$$

۲۱. نسبت درصد جرمی اکسیژن در پتاسیم هیدروژن کربنات به درصد جرمی هیدروژن در کدام هیدروکربن، برابر با 3 است؟
سنجهش- ۱۳۹۴

$$(H = 1, C = 12, O = 16, K = 39 g \cdot mol^{-1})$$

۱۴ - تری متیل - ۲ - پنتن

۲ - تری متیل - ۱ - بوتان

۲ - تری متیل بوتان

۱ - تری متیل بوتان

۲۲. در آزمایشگاهی فلز آهن را از 2 واکنش زیر به دست می‌آورند. اگر برای هر دو واکنش جرم‌های یکسانی از هر یک از اکسیدها برداشته شده باشد، نسبت جرم فلز آهن تولید شده در واکنش (2) نسبت به واکنش (1) کدام است؟ ($O = 16, Fe = 56 : g \cdot mol^{-1}$) (واکنش‌ها موازن نشده‌اند)
۱) $FeO(s) + Zn(s) \rightarrow ZnO(s) + Fe(s)$
۲) $Fe_2O_3(s) + C(s) \rightarrow Fe(s) + CO_2(g)$




$$1,25$$

$$0,75$$

$$0,9$$

$$1,11$$

۲۳. در سوختن کامل آلkan A ، نسبت جرم آب تولید شده به جرم آلkan، $1/5$ است. آلkan مورد نظر کدام است؟
 $(O = 16, C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$



۲۴. طی تبدیل هر گرم هیدروژن به هلیم در واکنش‌های هسته‌ای $2,4$ میلی گرم ماده به انرژی تبدیل می‌شود. چند گرم هیدروژن به هلیم تبدیل شود تا در طی واکنش هسته‌ای $10^9 \times 10^8$ کیلوژول انرژی آزاد شود؟ ($C = 3 \times 10^8 m \cdot s^{-1}$)
قلم‌چی- ۱۳۹۷

$$50$$

$$5$$

$$0,5$$

$$0,05$$

۲۵. کدام یک از هیدروکربن‌های زیر بر اثر هیدروژن‌دار شدن کامل، بیشترین درصد افزایش جرم را خواهد داشت؟
 ۱۳۹۸ (FAR-۱) $H = 1, C = 12, Cl = 35,5 : g \cdot mol^{-1}$

۴ بنزن

۳ کلرواتن

۲ پروپین


۱ اتن

۲۶. اگر خورشید روزانه 10^5 ژول انرژی به سوی زمین گسیل کند، در طی یک سال به تقریب چند cm^3 از حجم خورشید بابت تابش به سمت زمین کاسته می‌شود؟ (یک سال را 365 روز در نظر بگیرید)
 ۱۳۹۸ (FAR-۲) $c = 3 \times 10^8 \frac{m}{s}, g = 1,4 cm^3$ = چگالی خورشید

 ۴ $4,2 \times 10^{10}$

 ۳ $4,2 \times 10^7$

 ۲ $2,9 \times 10^{10}$

 ۱ $2,9 \times 10^7$

 ۱۳۹۸ فار-۱
۱۳۹۸

۲۷. چند مورد از مطالب زیر درباره دو ترکیب زیر درست است؟ ($H = 1, C = 12, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$)

• هر دو، ترکیب‌هایی آروماتیک به شمار می‌آیند.

• ترکیب (I) بر اثر هیدروژن‌دار شدن کامل به تقریب $8,72$ درصد افزایش جرم پیدا می‌کند.

• تفاوت جرم مولی این دو ترکیب برابر 32 گرم است.

• تعداد پیوندهای $C - H$ در ترکیب (I)، 8 واحد کمتر از ترکیب (II) است.

۲ ۲

۴ ۴

۱ ۱

۳ ۳

۲۸. مقداری صابون جامد را در 2 مترمکعب محلول حاوی منیزیم کلرید با چگالی $1 g \cdot ml^{-1}$ حل می‌کنیم. پس از مدتی $292,5$ گرم نمک خوراکی به دست می‌آید. غلظت منیزیم کلرید در محلول اولیه بر حسب ppm چقدر بوده است؟
 ۱۳۹۸ (FAR-۲) $(Cl = 35,5, Mg = 24, Na = 23 : g \cdot mol^{-1})$

۴ ۱۱,۸۷۵

۳ ۲۳,۷۵

۲ ۱۱۸,۷۵

۱ ۲۳۷,۵

۲۹. در واکنش مخلوطی از ایزوتوپ‌های O^{16} و O^{18} با ایزوتوپ‌های Mg^{24} و Mg^{25} امکان تشکیل چند اکسید با جرم‌های مولی متفاوت وجود دارد و نسبت جرم مولی سنگین‌ترین این اکسیدها به جرم مولی سبک‌ترین آن‌ها، کدام است؟ (هر دو عنصر را بالاترین ظرفیت خود در نظر بگیرید. عدد جرمی را هم از جرم اتمی با یکای $mol^{-1} g$ فرض کنید).
 ۱۳۹۶ (FAR-۱) سراسری


۴ ۱,۰۲۵,۶

۳ ۱,۰۷۵,۴

۲ ۱,۰۲۵,۴

۱ ۱,۰۷۵,۶

۳۰. از آبکافت $5,34$ کیلوگرم از استر زیر با بازده 75 درصد، چند گرم اسید چرب به دست می‌آید، در صورتی که محصول دیگر واکنش ترکیبی با فرمول $C_3H_8O_3$ باشد؟ ($O = 16, C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1}$)



۴ ۱۲۷۸

۳ ۶۸۱۶

۲ ۳۸۳۴

۱ ۵۱۱۲

۳۱. اگر نیم عمر عنصری 10 دقیقه باشد و پس از 1 ساعت مقدار 630 گرم از آن متلاشی شده باشد، مقدار اولیه آن چقدر بوده است؟
 ۱۳۹۸ خوشخوان

۴ ۱۲۸۰

۳ ۱۲۸

۲ ۶۴۰

۱ ۶۴

۳۲. از هم جوشی هسته‌ای دو ذره هر کدام به جرم 1×10^{-19} گرم ذره‌ای به جرم 1×10^{-19} گرم تولید می‌شود. انرژی حاصل از این هم جوشی تقریباً چند کیلوگرم آب را تبخیر می‌کند؟ (اگر بدانیم برای تبخیر یک کیلوگرم آب به 2200 کیلوژول گرمانیاز است و $c = 3 \times 10^8 \frac{m}{s}$)

۸۱۸۰۰۰ [۴]

۸۱۸ [۳]

۴۰۹ [۲]

۴۰۹۰۰۰ [۱]

۳۳. اگر مخلوطی از کلرید آهن با دو نوع ظرفیت به جرم 706 گرم را در مقداری آب حل کرده و بر روی آن مقدار کافی سدیم هیدروکسید اضافه کنیم، با فرض رسوب تمام یون‌های آهن، اگر نسبت مولی رسوب سبز رنگ به رسوب قرمز قهقهه‌ای رنگ برابر $1/5$ باشد، به تقریب چند درصد از جرم مخلوط اولیه را آهن (II) کلرید تشکیل می‌دهد؟ ($Fe = 56, Cl = 35.5 : g \cdot mol^{-1}$)

۷۰ [۴]

۶۲ [۳]

۳۶ [۲]

۵۴ [۱]

۳۴. با توجه به واکنش: $SO_3(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4(aq)$, $\Delta H = -228 kJ$ در یک مخزن دارای 10×10^{-18} کیلوگرم آب، 10 مول گاز SO_3 با سرعت یکنواخت در مدت پنج دقیقه حل شده است. میانگین افزایش دمای مخزن در هر دقیقه، به تقریب چند $^{\circ}C$ است؟ (فرض شود گرمای سراسری-۱۳۹۸، تنها صرف گرمشدن آب شده است، $K^{-1} = 4.2 J \cdot g^{-1}$)

۱۰,۸۶ [۴]

۵,۴۲ [۳]

۱,۰۸ [۲]

۰,۵۴ [۱]

۳۵. اگر 22 گرم نمک A و 5 گرم نمک B در 200 گرم آب حل شوند، بدون آنکه بین آن‌ها واکنشی اتفاق بیفتد و تمام گرمای آزاد شده تنها توسط فار-

آب جذب شود، تغییر دمای آب تقریباً چند درجه خواهد بود؟

$$(A: g \cdot mol^{-1}) = 80, (B: g \cdot mol^{-1}) = 110$$

$$\Delta H_A = -90 kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\Delta H_B = -40 kJ \cdot mol^{-1}$$

$$C_{H_2O} = 4.2 J \cdot g^{-1}, C = 1^{\circ}C$$

۲۴,۴ [۴]

۵۷,۳ [۳]

۴,۶ [۲]

۱۹,۵۲ [۱]

۳۶. اگر در اثر تجزیه گرمایی کامل مقداری کلسیم کربنات ناخالص، جرم $CaCO_3$ حاصل با جرم ناخالصی‌ها برابر باشد، درصد خلوص $CaCO_3$ تقریباً چند است؟ ($Ca = 40, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$)



۷۳ [۴]



۲۷ [۳]

۶۴ [۲]

۳۲ [۱]

سنجش-۱۳۹۴

۳۷. با توجه به واکنش‌های زیر:



گرمای مبادله شده برای کاهش هر مول آهن (III) اکسید به فلز آهن، به تقریب چند کیلوژول است؟

-۷۰,۵ [۴]

+۲۰,۵ [۳]

-۹۲,۵ [۲]

+۱۰۳,۵ [۱]

۳۸. اگر در خورشید طی هر ثانیه 700 میلیون تن گاز هیدروژن به 695 میلیون تن گاز هلیم تبدیل شود، در هر دقیقه ژول انرژی در خورشید آزاد شده و این مقدار انرژی می‌تواند تقریباً مگا تن آب را تبخیر کند. (گرمای لازم برای تبخیر یک مول آب را تقریباً $42 kJ$ در نظر گرفته و $H = 1, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$)

$$17,51 \times 10^{12} - 27 \times 10^{27} [۴] \quad 11,57 \times 10^{18} - 2,7 \times 10^{25} [۳] \quad 11,57 \times 10^{12} - 27 \times 10^{27} [۲] \quad 17,51 \times 10^{18} - 2,7 \times 10^{25} [۱]$$

۳۹. با توجه به واکنش‌های زیر، با حل شدن ۱۰ مول از $BaO(s)$ در $200g$ آب با دمای $25^\circ C$ و دارای سولفوریک اسید کافی، طبق معادله: $BaO(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow BaSO_4(g) + H_2O(l)$ دمای نهایی آب، به تقریب به چند درجه سلسیوس می‌رسد؟ (فرض کنید که آنتالپی خارج از کشور-۱۳۹۸) واکنش فقط صرف تغییر دمای آب شده است: $(c_{H_2O} = ۴,۲ J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1})$



۴۱ [۴]

۳۱ [۳]

۱۹ [۲]

۱۶ [۱]

۴۰. در تبدیل هیدروژن به هلیم حدود ۵ میلی‌گرم ماده به انرژی تبدیل می‌شود. اگر برای ذوب یک گرم از فلز ۳۶۰ ژول انرژی لازم باشد و با فرض این که ۸۰ درصد انرژی آزاد شده در این واکنش هسته‌ای صرف ذوب شدن فلز مورد نظر گردد، چند تن از فلز یادشده ذوب می‌شود؟ قلم چی-۱۳۹۸

۵۰۰ [۴]

۱۰۰ [۳]



۱۰۰۰ [۲]

۵۰۰۰ [۱]

۴۱. با توجه به واکنش‌های داده شده به ازای مصرف ۷ گرم آمونیاک ۸۰ درصد خالص با بازده ۶۰٪ برطبق واکنش فار-۱۳۹۸



$$(N = ۱۴, H = ۱ : g \cdot mol^{-1})$$



۱۲,۵ [۴]

۱۴ [۳]

۲۲ [۲]

۱۱,۷ [۱]

۴۲. ۳۲۴ مترمکعب آب خالص با انرژی حاصل از یک واکنش هسته‌ای که در آن جرم واکنش دهنده برابر g است، تبخیر می‌شود. جرم نهایی واکنش دهنده این واکنش هسته‌ای چند گرم است؟ (برای تبخیر هر مول آب ۴۲ کیلوژول انرژی لازم است و چگالی آب برابر ۱ گرم بر میلی‌لیتر است و قلم چی-۱۳۹۸)

$$(H_2O = ۱۸ g \cdot mol^{-1})$$




۰,۰۰۰۸۴ [۴]

۰,۹۹۱۶ [۳]

۰,۹۱۶ [۲]

۰,۰۸۴ [۱]

۴۳. با توجه به گرمای واکنش‌های داده شده، برای تجزیه ۱۶ گرم N_2O_5 درصد خالص چند ژول انرژی لازم است؟ قلم چی-۱۳۹۸



۳۵۷,۲ [۴]

۱۳۷,۵ [۳]

۸۸۰ [۲]

۱۱۰ [۱]

۴۴. ۵۶,۸ گرم اسید چرب $C_{17}H_{35}COOH$ را با مقدار کافی از یک محلول بازی واکنش می‌دهیم تا صابون جامد حاصل شود. صابون جامد حاصل را در آب سختی که شامل کلسیم کلرید است، قرار می‌دهیم. در صورتی که به طور کامل با هم واکنش دهنده، چند گرم رسوب تشکیل می‌شود؟ (قلم چی-۱۳۹۸)

$$(O = ۱۶, Ca = ۴۰, C = ۱۲, H = ۱ : g \cdot mol^{-1})$$

۴۰,۴ [۴]


۲۰,۲ [۳]

۳۰,۳ [۲]

۶۰,۶ [۱]

۴۵. اگر ۴,۸ گرم بخار متانول را گرما دهیم و پس از گذشت ۲۰ ثانیه، ۴۰ درصد آن تجزیه شود، سرعت متوسط تجزیه آن چند مول بر دقیقه است و در این فاصله زمانی، به تقریب چند لیتر گاز در شرایط STP تشکیل می‌شود؟ (سنجش-۱۳۹۴)

$$(H = ۱, C = ۱۲, O = ۱۶ : g \cdot mol^{-1})$$



۴,۰,۲۷ [۴]

۴,۰,۱۸ [۳]

۳,۰,۱۸ [۲]

۳,۰,۲۷ [۱]

۴۶. اگر در واکنش هسته‌ای $n^9Be + ^4H \rightarrow ^{12}C + ^1n$ کاهش جرمی به اندازه $1,2 \times 10^{-3}$ گرم اتفاق بیفت، با تولید $2,4$ گرم کربن در این واکنش، به تقریب چند کیلوژول انرژی آزاد می‌شود؟ (قلم‌چی-۱۳۹۹)


$$1,08 \times 10^{10} \quad [4]$$

$$2,16 \times 10^{10} \quad [3]$$

$$1,08 \times 10^7 \quad [2]$$

$$2,16 \times 10^7 \quad [1]$$

۴۷. اگر در واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در اثر گرما که در ظرف سربسته به حجم 20 لیتر انجام می‌گیرد، سرعت متوسط تولید گاز نیتروژن $1,6 \times 10^{-4} mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ باشد، چند دقیقه طول می‌کشد تا $38,784$ گرم پتاسیم نیترات به طور کامل تجزیه شود؟ (سنجهش-۱۳۹۴)



$$1,5 \quad [4]$$

$$2 \quad [3]$$

$$0,5 \quad [2]$$

$$1 \quad [1]$$

۴۸. $16,7$ گرم صابون جامد 20 کربنی را وارد 4 لیتر آب سخت حاوی منیزیم کلرید کرده‌ایم. در صورتی که پس از مدتی غلظت نمک خوراکی در این آب به $2,5 \times 10^{-3}$ مولار برسد، چند درصد صابون در تشکیل لکه‌های سفیدرنگ شرکت نکرده است؟ (قلم‌چی-۱۳۹۹)

$$(Na = 23, C = 12, O = 16, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$$

$$70 \quad [4]$$


$$30 \quad [3]$$

$$80 \quad [2]$$

$$20 \quad [1]$$

۴۹. اگر در واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در اثر گرما که در ظرف سربسته به حجم 20 لیتر انجام می‌گیرد، سرعت متوسط تولید گاز نیتروژن $1,6 \times 10^{-4} mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ باشد، پس از گذشت 5 دقیقه، چند گرم پتاسیم نیترات به طور کامل تجزیه می‌شود؟ (سنجهش-۱۳۹۴)

$$(N = 14, O = 16, K = 39 : g \cdot mol^{-1})$$



$$29,088 \quad [4]$$

$$58,176 \quad [3]$$

$$43,632 \quad [2]$$

$$56,676 \quad [1]$$

۵۰. می‌خواهیم 100 کیلوگرم آهن را ذوب کنیم. برای این کار از انرژی آزادشده از واکنش $O^1H + ^1n \rightarrow ^{16}H + ^1n$ استفاده می‌کنیم که کاهش جرم آن برابر با $g \times 10^{-4}$ است. در این صورت چند گرم اتم اکسیژن تولید می‌شود؟ (انرژی لازم برای ذوب کردن هر گرم آهن برابر 243 ژول است). (قلم‌چی-۱۳۹۹)

$$(c = 3 \times 10^8 m \cdot s^{-1}, O = 16 g \cdot mol^{-1})$$

$$7,2 \times 10^{-3} \quad [4]$$

$$3,6 \times 10^{-5} \quad [3]$$

$$7,2 \times 10^{-5} \quad [2]$$

$$3,6 \times 10^{-2} \quad [1]$$

۵۱. یک تکه فلز مس درون ظرف دارای نیتریک اسید غلیظ انداخته شده است. پس از گرم کردن و کامل شدن واکنش: (موازن نشده): $Cu(s) + HNO_3(aq) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + NO_2(g) + H_2O(l)$. در مدت 10 دقیقه، 94 گرم ترکیب یونی به دست آمده است. سرعت متوسط تولید گاز NO_2 در این واکنش، چند $mL \cdot s^{-1}$ است؟ (حجم مولی گازها در شرایط آزمایش $24L$ است). خارج از کشور-۱۳۹۵

$$(Cu = 64, O = 16, N = 14, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$$


$$80 \quad [4]$$

$$60 \quad [3]$$

$$40 \quad [2]$$

$$20 \quad [1]$$

۵۲. در واکنش هسته‌ای زیر بهازای تولید یک مول هلیم $0,0024$ گرم ماده به انرژی تبدیل می‌شود. اگر در یک واکنشگاه هسته‌ای $4,0$ گرم هلیم تولید شود، انرژی مورد نیاز یک کارگاه ذوب آهن با توان تولید یک تن آهن در روز را به مدت چند روز تأمین می‌کند؟ (انرژی مورد نیاز برای تولید یک گرم آهن را برابر 240 ژول درنظر بگیرید). ($He = 4 g \cdot mol^{-1}$)



$$9000 \quad [4]$$

$$900 \quad [3]$$

$$90 \quad [2]$$

$$9 \quad [1]$$

۵۳. $44,8$ میلی‌لیتر $HCl(g)$ در شرایط STP در نیم‌لیتر آب مقطمر به‌طور کامل حل شده است. pH تقریبی محلول به دست آمده کدام و در این سراسری-۱۳۹۸ محلول، غلظت مولار یون هیدرونیوم چند برابر غلظت مولار یون هیدروکسید است؟ ($\log 4 \simeq 0,6$)


$$1,6 \times 10^9, 2,4 \quad [4]$$

$$1,5 \times 10^9, 2,4 \quad [3]$$

$$1,6 \times 10^9, 2,4 \quad [2]$$

$$1,5 \times 10^9, 2,4 \quad [1]$$

۵۴. درون یک لوله ۷۱ گرم از یک اسید چرب سیرشدۀ تک عاملی زنجیری رسوب کرده است. اگر برای ازین بردن کامل اسید چرب مورد نظر، ۱۲,۵ گرم سود ۸۰ درصد خالص نیاز باشد، جرم مولی صابون تولید شده برابر با کدام است؟



۳۲۰ [۴]

۲۹۲ [۳]

۲۸۴ [۲]

۳۰۶ [۱]

۵۵. در محلول x مولار $HA(aq)$ غلظت $H_3O^+(aq)$ مساوی $10^{-1,8}$ مولار و درجه یونش آن 10^{-3} و در محلول y مولار اسید $HB(aq)$ غلظت $H_3O^+(aq)$ مساوی $10^{-5,6}$ مولار و درجه یونش آن $10^{-1,8}$ است. نسبت $\frac{y}{x}$ کدام است؟

۱۳۹۸


 2×10^{-1} [۴]

 $10^{-2,3}$ [۳]

 2×10^{-2} [۲]

 $10^{1,7}$ [۱]

۵۶. از واکنش ۲ مول از یک اسید چرب سیرشدۀ با مقدار کافی محلول سود سوزآور طی واکنش با بازده ۵۰٪ مقدار ۲۹,۲ گرم صابون جامد تولید می‌شود. در قسمت ناقطبی این اسید چرب چه تعداد پیوند کووالانسی وجود دارد؟ ($Na = 23$ و $C = 12$ و $H = 1$ و $O = 16 g \cdot mol^{-1}$) (پیوند خوشخوان-۱۳۹۸) بین بخش ناقطبی و قطبی را محاسبه کنید



۴۶ [۴]


۴۹ [۳]

۵۲ [۲]

۸۵ [۱]

خوشخوان-۱۳۹۸

۵۷. با توجه به نمودار بعد از گذشت چند دقیقه حجم اکسیژن به ۱ لیتر می‌رسد؟



۲۰ [۴]

۱۵ [۳]

۱۰ [۲]

۵ [۱]

۵۸. اگر ۲۰ گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص ۸۴ درصد، بر اثر گرما به میزان ۵ درصد تجزیه شود، جرم جامد بر جای مانده چند گرم است؟ (گرماب ناخالصی اثر ندارد) ($H = 1$ ، $C = 12$ ، $O = 16$ ، $Na = 23$: $g \cdot mol^{-1}$) خارج از کشور-۱۳۹۴






۱۶,۹ [۴]

۱۳,۸ [۳]


۱۱,۶ [۲]

۵,۴ [۱]

۵۹. تغییر غلظت $A(aq)$ در واکنش: $A(aq) + 2X(aq) + H^+(aq) \rightarrow D(aq)$ در محلول با غلظت ۱ مولار HCl و مولار $A(aq)$ به صورت شکل زیر است. نمودار تغییر pH این محلول، به کدام صورت است؟ (D خصلت اسیدی و بازی ندارد)



۶۰. چنان‌چه در شرایط مناسب بازده درصدی واکنش زیر (پس از موازنی معادله‌ی آن)، برابر ۷۰ درصد باشد، از واکنش ۶۸ کیلوگرم آمونیاک، چند گرم نیتروژن دی اکسید با خلوص ۹۲ درصد به دست می‌آید؟ (N = ۱۴, O = ۱۶, H = ۱ : g · mol^{-۱})



۱,۱ × ۱۰^۳ [۴]

۱,۱ × ۱۰^۵ [۳]

۱,۴ × ۱۰^۳ [۲]

۱,۴ × ۱۰^۵ [۱]

۶۱. اگر pH محلول اسید ضعیف HA که در هر میلی‌لیتر آن 2.5×10^{-7} مول از آن موجود دارد برابر ۵ باشد، درصد یونش آن در شرایط آزمایش، کدام است؟ (با تغییر)

۳ [۴]

۴ [۳]

۰,۲ [۲]

۰,۴ [۱]

۶۲. در واکنش $Al_2(SO_4)_3(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 3SO_2(g)$ در مدت ۸ دقیقه به اندازه ۸۰ درصد پیشرفت می‌کند. مقدار آغازی آلومینیم سولفات و مقدار x به ترتیب چند مول است؟ (سرعت واکنش در ۲ دقیقه اول، ۳ برابر سرعت واکنش در ۲ دقیقه دوم است).


زمان (دقیقه)	۲	۴	۶	۸
Al ₂ O ₃	x	۰/۰۸	۰/۰۹۵	۰/۱

۰,۰۶ و ۰,۲۵ [۱]


۰,۲۴ و ۰,۱۲۵ [۲]

۰,۲۴ و ۰,۲۵ [۳]

۰,۰۶ و ۰,۱۲۵ [۴]



۶۳. مطابق واکنش زیر در 50°C میلی‌لیتر محلول یک مولار پتاسیم هیدروکسید، مقدار کافی ماده A وارد می‌کنیم، اگر سرعت تولید گاز X در شرایط خوشخوان-۱۳۹۸ $28\text{ میلی‌لیتر در دقیقه باشد، تغییرات }pH$ محلول پس از گذشت دو ساعت کدام است؟



۰,۴ [۴]



۰,۷ [۳]

۱,۵ [۲]

۲,۷ [۱]

۶۴. مقدار گوگرد موجود در یک سوخت فسیلی 16 ppm است. اگر اسید تولیدشده از سوختن یک تن از این سوخت را در 10°C ۱ لیتر محلول حاوی گرم پتاسیم هیدروکسید حل کنیم، محلول نهایی کدام است؟ (از تغییرات حجم طرف نظر شود)

$$(H = 1, O = 16, S = 32, K = 39 : g \cdot mol^{-1})$$



۱۳,۷ [۴]

۱۳,۳ [۳]

۱۲,۵ [۲]

۱۱,۷ [۱]

۶۵. اگر pH دو محلول جداگانه از اتانویک اسید ($K_a \approx 2 \times 10^{-5}$) و کلرواتانویک اسید ($K_a \approx 2 \times 10^{-3}$)، برابر 3 باشد، نسبت غلظت مولار محلول اسید قوی به غلظت مولار محلول اسید ضعیف، به تقریب کدام است؟ خارج از کشور-۱۳۹۵

۰,۳ [۴]

۰,۱ [۳]

۰,۰۳ [۲]

۰,۰۱ [۱]

۶۶. $200\text{ لیتر گاز اتن با چگالی }1.6\text{ g} \cdot L^{-1}$ در واکنش پلیمری شدن شرکت کرده و مقدار 1×10^{-5} مول پلی‌اتن به دست آمده است. شمار واحدهای تکرارشونده در پلیمر به دست آمده به تقریب کدام است؟ فار-۱۳۹۸

$$(H = 1, C = 12 : g \cdot mol^{-1})$$

 ۱,۵ $\times 10^6$ [۴]

 2×10^6 [۳]

 9.5×10^5 [۲]

 6.3×10^5 [۱]

۶۷. کدام مطلب درباره واکنش ... $\rightarrow CH_2 = CH_2(g) + Cl_2(g)$ نادرست است؟ فار-۱۳۹۸ (آنتالپی پیوندهای $C = C$ و $Cl - Cl$ ، $C - Cl$ ، $C - C$ ، $C - H$ ، HCl جدا شود به ماده‌ای می‌رسیم که به عنوان مونومر کاربرد زیادی دارد).

$$(H = 1, C = 12, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$

۱ واکنش گرماده بوده و از واکنش $14\text{ گرم گاز اتن با مقدار کافی گاز کلر، }76\text{ کیلوژول گرما آزاد می‌شود.}$




۲ نام فراورده واکنش $1,2\text{-دیکلرواتان ا است که می‌تواند در واکنش پلیمری شدن شرکت کند.}$

۳ کاتالیزگر واکنش، آهن (III) کلرید است که در حضور آن واکنش با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

۴ اگر از فراورده واکنش یک مول HCl جدا شود به ماده‌ای می‌رسیم که به عنوان مونومر کاربرد زیادی دارد.

۶۸. تفاوت جرم فراورده‌های حاصل از سوختن کامل $15\text{ مول از یک الکل یک‌عاملی سیرشده برابر }112\text{ گرم است. این الکل کدام گزینه می‌تواند باشد؟}$ فار-۱۳۹۸

$$(H = 1, C = 12, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$


 C_2H_5OH [۱]

۶۹. در واکنش آبکافت 10 g اتیل پروپانوات با بازده 70 درصد چه اسیدی حاصل می‌شود و مقدار آن چند گرم است؟ (O = 16, C = 12, H = 1 : g · mol⁻¹)

 ۴,۲ - $C_2H_5O_2$ [۴]

 ۵,۲ - $C_2H_5O_2$ [۳]

 ۶ - $C_2H_5O_2$ [۲]

 ۷,۴ - $C_2H_5O_2$ [۱]

۷۰. در محلول منیزیم هیدروکسید در آب، غلظت یون‌ها از رابطه: $[Mg^{2+}][OH^-]^2 = 1.5 \times 10^{-11} \text{ mol}^{-3} \cdot L^{-3}$. پیروی می‌کند. حداقل غلظت منیزیم سولفات قابل حل در محلول سدیم هیدروکسید با $pH = 9$ ، برابر چند مول بر لیتر است؟ خارج از کشور-۱۳۹۴

۰,۱۵ [۴]


۰,۳۰ [۳]

 3×10^{-6} [۲]


 1.5×10^{-6} [۱]

سراسری - ۱۳۹۵


۷۱. نمودار وابستگی pH محلول یک مولار باز BOH نسبت به درصد تفکیک آن، به کدام صورت است؟




۲



۴



۱



۳

۷۲. اگر pH محلولی که از انحلال $3,48\text{ g}$ از یک باز در 400 mL لیتر آب خالص در دمای $25^\circ C$ به دست آمده برابر $13,5$ باشد، آن باز کدام است؟ (همه بازها قوی هستند). ($Mg = 24, K = 39, Ca = 40, Na = 23, O = 16, H = 1 : g \cdot mol^{-1}$)

 $NaOH$
 $Ca(OH)_2$
 KOH
 $Mg(OH)_2$

۷۳. اگر $11,2\text{ mL}$ لیتر گاز هیدروژن کلرید در شرایط STP در 25 mL لیتر آب حل شود، pH محلول به تقریب کدام است و هر میلی لیتر از این محلول با چند میلی گرم کلسیم کربنات واکنش کامل می دهد؟

(حجم محلول ثابت و برابر حجم آب فرض شود: $C = 12, O = 16, Ca = 40 : g \cdot mol^{-1}$)

۱,۱,۳

۲,۱,۳

۲۰,۱,۷

۱,۱,۷

۷۴. اگر به 25 mL لیتر محلول $0,5\text{ M}$ مولار هیدروکلریک اسید، 25 mL لیتر محلول با غلظت 34 g بر لیتر نقره نیترات اضافه شود، pH محلول کدام است و محلول به دست آمده با چند میلی گرم سدیم هیدروکسید خنثی می شود؟ (رسوب خصلت اسیدی ندارد: $NaOH = 40\text{ g} \cdot mol^{-1}$)

سراسری - ۱۳۹۵

۲۰,۲

۲۰,۳

۴۰,۲

۴۰,۳

۷۵. $5,4\text{ g}$ دی نیتروژن پتوکسید در یک لیتر آب حل شده است. pH محلول کدام است و برای خنثی شدن 100 mL لیتر از این محلول، چند میلی لیتر محلول $0,5\text{ M}$ مولار پتابسیم هیدروکسید لازم است؟ ($N_2O_5(g) + H_2O(l) \rightarrow 2HNO_3(ag)$) ($O = 16, N = 14 : g \cdot mol^{-1}$)

سنجش - ۱۳۹۴

۲۵۰,۲

۲۵۰,۱

۲۰۰,۲

۲۰۰,۱

۷۶. مقداری N_2O_5 را در مقداری آب در دمای $25^\circ C$ حل کرده و به حجم دو لیتر رسانده ایم. سپس به محلول حاصل مقدار 168 mL میلی گرم پتابسیم هیدروکسید اضافه کردہ ایم. پس از انجام واکنش pH محلول نهایی برابر $11 = pH$ شد. مقدار N_2O_5 چند گرم بوده است؟

$(N_2O_5 = 108, KOH = 56 : g \cdot mol^{-1})$

۰,۰۲۱۶

۰,۰۳۲۴

۰,۰۵۴

۰,۰۱۰۸

۷۷. تقریباً چند میلی لیتر HCl با خلوص $36,5$ درصد و چگالی $1,2\text{ g} \cdot cm^{-3}$ دریاچه ای به حجم 100 mL با $pH = 1 = 10\text{ m}^3$ را می تواند خنثی کند؟ (فرض کنید محلول HCl می تواند در کل دریاچه پخش شود و با سایر مواد دریاچه واکنش نمی دهد.) ($H : 1, Cl : 35,5\text{ g} \cdot mol^{-1}$)

۸۳۳

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۳۲۱

۷۸. 10 mL از محلول غلیظ اسید قوی HA با چگالی $5\text{ g} \cdot mL^{-1}$ تا حجم 100 mL رقیق شده است و به آن $1,6\text{ g}$ مولی سدیم هیدروکسید افزوده شده و محلولی با $pH = 1$ حاصل شد. درصد جرمی محلول اسید اولیه کدام است؟ ($M_{NaOH} = 200\text{ g} \cdot mol^{-1}$ و $M_{HA} = 200\text{ g} \cdot mol^{-1}$)

۱۰

۳۰

۲۰

۶

۷۹. مقداری فلز آلومینیم در یک ظرف دارای 2 L لیتر محلول 1 M مولار سدیم هیدروکسید انداخته شده و طبق معادله (موازن نشده): $Al(s) + H_2O(l) + OH^- (aq) \rightarrow Al(OH)_4^- (aq) + H_2(g)$ وارد واکنش شده است. اگر سرعت متوسط تولید گاز H_2 برابر $50\text{ mL} \cdot s^{-1}$ باشد، pH محلول در ثانیه چندم پس از آغاز واکنش، به 13 می رسد؟ (حجم مولی گازها در شرایط واکنش، برابر 25 L است. فرض کنید فراورده محلول در آب، خاصیت بازی چندانی ندارد.)

سراسری - ۱۳۹۷

۱۳۵۰

۱۱۰۰

۶۷۵

۱۵۰

۸۰. در صورتی که 40 میلی لیتر از محلول HCl با چگالی $1,25$ گرم بر میلی لیتر تا 100 میلی لیتر رقیق شده و به آن $10,26$ گرم باریم هیدروکسید اضافه شود، محلولی با $pH = 1$ به وجود می آید. درصد جرمی اولیه محلول هیدروکلریک اسید چه قدر است؟
 $(Ba(OH)_2 = 171, HCl = 36,5 : g \cdot mol^{-1})$

۲,۹۵ [۴]

۳,۶۵ [۳]

۷,۳ [۲]

۱۴,۶ [۱]

۸۱. جمع جبری عدد اکسایش اتم‌های کربن در مولکول بنزوئیک اسید با عدد اکسایش کدام عنصر در ترکیب داده شده، برابر است؟
 $KClO_3$ در Cl [۴] N در فرمالدھید [۲] C در پتاسیم سولفید [۱]

۸۲. تغییر عدد اکسایش یک اتم کربن در واکنش سوختن کامل کدام دو ماده، باهم برابر است؟
 سراسری-۱۳۹۴ [۴] اتین و بنزن [۳] اتان و اتان [۲] اتان و اتین [۱]

۸۳. جمع جبری عده‌های اکسایش اتم‌های کربن در کدام ترکیب نسبت به هر یک از سه ترکیب دیگر بیشتر است؟
 سنجش-۱۳۹۴ [۴] استیک اسید [۳] دی متیل اتر [۲] گلیسرین [۱] اتانول

۸۴. کدام واکنش از نوع اکسایش-کاهش است و پس از موازنی، نسبت مولی بزرگ‌تری، در آن مشاهده می‌شود؟
 سنجش-۱۳۹۴ [۴] $SO_2(g) + KMnO_4(aq) + H_2O(l) \rightarrow K_2SO_4(aq) + MnSO_4(aq) + H_2SO_4(aq)$ [۱]
 $Al_2O_3(aq) + HF(aq) + NaOH(aq) \rightarrow Na_3AlF_6(s) + H_2O(l)$ [۲]
 $P_2(s) + KClO_3(s) \rightarrow P_2O_5(s) + KCl(s)$ [۳]
 $NH_3(g) + O_2(g) \rightarrow NO(g) + H_2O(g)$ [۴]

۸۵. مخلوطی به حجم 2240 لیتر شامل کربن مونوکسید و مقدار اضافی اکسیژن در شرایط STP است. اگر طی شرایط مناسب کربن مونوکسید با اکسیژن واکنش دهد، حجم مخلوط نهایی در شرایط STP به $6,49$ می‌رسد. در مخلوط اولیه چند مول جفت الکترون ناپیوندی وجود داشته است؟

خوشخوان-۱۳۹۸ [۴] 366 [۳] 400 [۲] 300 [۱] $274,5$

۸۶. حجم گازهای حاصل از تجزیه $45,4$ گرم $C_3H_5N_3O_9$ در شرایط STP تقریباً چند برابر حجم گازهای حاصل در دمای $273^{\circ}C$ و فشار $1 atm$ است؟ $(O = 16, N = 14, C = 12, H = 1 g \cdot mol^{-1})$
 خوشخوان-۱۳۹۸

۸۷. با توجه به فرآیند هابر برای تولید آمونیاک اگر 336 لیتر آمونیاک تولید کنیم شمار مول N_2 استفاده شده، a مول خواهد بود. اگر مجموع کل ضرایب مواد در واکنش $CaCl_2 + NaF \rightarrow NaCl + CaF_2$ باشد، حاصل $\frac{a}{b}$ کدام است؟

۱,۲۵ [۴]

۰,۶۲۵ [۳]

۵ [۲]

۲,۵ [۱]

۸۸. اگر در این فرآیند $32,5$ گرم از یک قطعه آلیاژ روی و مس را در مقدار کافی محلول 4 مولار هیدروکلریک اسید قرار داده و گرم می‌کنیم تا واکنش کامل انجام گیرد. اگر در این واکنش $2,24$ لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد آزاد شده باشد، درصد جرمی مس در این آلیاژ کدام است و برای انجام کامل این واکنش، دست کم چند میلی لیتر از محلول این اسید لازم است؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید): $(Cu = 64, Zn = 65 g \cdot mol^{-1})$ خارج از کشور-۱۳۹۵
 $E^\circ(Zn^{2+}(aq)/Zn(s)) = -0,76$ و $E^\circ = (Cu^{2+}(aq)/Cu(s)) = +0,34$

۵۰,۸۰ [۴]

۲۵,۸۰ [۳]

۵۰,۶۰ [۲]

۲۵,۶۰ [۱]

۸۹. اگر در مقداری معین از یک نمونه آب، به ترتیب 72 و 184 گرم از یون‌های Mg^{2+} و Na^+ و SO_4^{2-} وجود داشته باشد، پس از تبخیر آب، نسبت جرم نمک بدون آب سدیم به جرم نمک بدون آب منیزیم، به تقریب کدام است؟
 سراسری-۱۳۹۸ [۴] $(O = 16, Na = 23, Mg = 24, S = 32 : g \cdot mol^{-1})$

۱,۴۵ [۴]

۱,۵۸ [۳]

۲,۱۵ [۲]

۲,۲۵ [۱]

۹۰. در سلول $(Al - H_2)$ به ازای اکسایش یافتن $Al = 27 \frac{g}{mol}$ با بازده ۵۰٪ چند میلی لیتر H_2 در شرایط STP تولید می شود؟ (خوشخوان- ۱۳۹۸)

$$(E^\circ \frac{Al^{3+}}{Al} = -1,66V \text{ و } E^\circ \frac{H^+}{H_2} = 0,00V)$$

۲۲۴ [۴]

۴۴۸ [۳]

۳۳۶ [۲]

۶۷۲ [۱]

۹۱. در یک فرآیند شیمیایی، پتاسیم دی کرومات به صورت محلول سیرشده در دمای $90^\circ C$ به دست می آید. با کاهش دمای محلول به $25^\circ C$ ، چند درصد آن رسوب می کند و درصد جرمی آن در محلول باقیمانده، به تقریب کدام است؟ (انحلال پذیری این ماده در $90^\circ C$ و $25^\circ C$ به ترتیب برابر ۷۰ و سراسری- ۱۳۹۴) ۱۴ گرم در $100g$ آب است.

۱۲,۳,۸۰ [۴]

۲۰,۸۰ [۳]

۲۰,۹۰ [۲]

۱۲,۳,۹۰ [۱]

۹۲. چند میلی لیتر از یک محلول $36,5$ درصد جرمی هیدروکلریک اسید، با چگالی $1,2 g \cdot mL^{-1}$ باید به 10 لیتر آب اضافه شود تا غلظت یون کلرید به سراسری- ۱۳۹۸ تقریب برابر $10,5 ppm$ شود؟

$$(d_{\text{محلول}} = 1g \cdot mL^{-1}, H = 1, CI = 35,5g \cdot mol^{-1})$$

۵,۲ [۴]

۲,۵۷ [۳]

۱,۰۸ [۲]

۰,۵۲ [۱]

۹۳. اگر 120 گرم محلول سیرشده نمکی در آب 60 درجه سلسیوس سرد کنیم مقداری رسوب تشکیل می شود، به تقریب چند گرم آب $40^\circ C$ به محلول اضافه کنیم تا دوباره کل رسوب در محلول حل شود؟ (حالیت نمک در دماهای 60 و $40^\circ C$ درجه سلسیوس به ترتیب خوشخوان- ۱۳۹۸ و 15 گرم است).

۱۳۳,۳ [۴]

۱۰۰ [۳]

۶۶,۶ [۲]

۳۳,۳ [۱]

۹۴. اگر در سلول سوختی به جای هیدروژن از سوخت ارزان تر و کم خطرتری مانند متان استفاده شود؛ برای عبور همان شمار الکترون ناشی از مصرف یک مول هیدروژن از مدار، چند گرم متان باید مصرف شود؟ (سراسری- ۱۳۹۴) ($C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1}$)

۳۲ [۴]


۱۶ [۳]

۸ [۲]

۴ [۱]

۹۵. برای تأمین سوخت در یک سلول سوختی هیدروژن - اکسیژن اسیدی از واکنش بخار آب با متان طبق واکنش زیر استفاده می شود. اگر بازده این واکنش 46 درصد باشد و در این فرایند $30 kg$ متان مصرف شود، پس از وارد شدن سوخت تولید شده به آند سلول سوختی کیلو گرم اکسیژن در کاتد مصرف شده و مول پروتون از غشا عبور می کند. (فار- ۱۳۹۸)

$$(H = 1, C = 12, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$



۷۲۰۰ _ ۵۷,۶ [۴]


۳۶۰۰ _ ۵۷,۶ [۳]

۷۲۰۰ _ ۲۸,۸ [۲]

۳۶۰۰ _ ۲۸,۸ [۱]

۹۶. از برقکافت $250 mL$ محلول قلع (II) کلرید با غلظت $1,0$ مولار (طبق واکنش زیر)، $2,374$ گرم فلز قلع جمع آوری شده است. چند گرم یون خارج از کشور- ۱۳۹۵ کلرید در این محلول باقی مانده است؟

برگفکت



$$(Sn = 118,7, Cl = 35,5 : g \cdot mol^{-1})$$

۰,۷۱ [۴]

۰,۹۵ [۳]

۰,۳۵۵ [۲]

۰,۴۷۴ [۱]

۹۷. در یک آزمایش تجزیه آب به عنصرهای سازنده آن از $1 kg$ آب نمک با غلظت 1% به عنوان الکتروولیت استفاده شده است. اگر آزمایش تا زمانی ادامه یابد که غلظت آب نمک به 2% برسد، حجم گازهای تولید شده در شرایط STP به تقریب چند لیتر است؟ ($O = 16, H = 1 : g \cdot mol^{-1}$) (سراسری- ۱۳۹۸) معادله موازن شود، $(H_2O(l) \rightarrow H_2(g) + O_2(g))$

۱۸۶۶ [۴]

۹۳۳ [۳]

۶۲۲ [۲]

۳۱۱ [۱]

۹۸. در یک کارگاه، از گاز کلر حاصل از یک سلول دانز برای تعیه‌ی مایع سفید کنندهٔ خانگی (محلول ۵٪ جرمی از $NaClO(aq)$)، طبق واکنش (موازن نشده): $NaOH(aq) + Cl_2(g) \rightarrow NaCl(aq) + NaClO(aq) + H_2O(l)$ استفاده می‌شود. در این کارگاه به ازای تولید ۱,۱۵۰ kg فلز سدیم، به تقریب چند لیتر محلول سفید کننده ($d \approx 1 g \cdot mL^{-1}$) تولید می‌شود؟
 $Na : ۲۳, Cl : ۳۵/۵, O : ۱۶ (g, mol^{-1})$

۷۴,۵ [۴]

۵۱,۵۶ [۳]

۳۷,۲۵ [۲]

۳۵,۷۸ [۱]

۹۹. در دو ظرف جداگانه، ترکیب‌های مذاب $Cu(NO_3)_2$ و X را برقافت می‌کنیم. اگر مقدار جریان الکتریسیتهٔ عبور داده شده در این دو ظرف برابر باشد و پس از مدت زمان معینی، جرم رسوب تنهشین شده در این دو ظرف به ترتیب برابر ۶,۶۴ و ۱,۶۴ g باشد، جرم مولی فلز X بر حسب $1 g \cdot mol^{-1}$ کدام است؟ (در این فرایند فلز X به پایین ترین عدد اکسایش خود می‌رسد) ($Cu = ۶۴ g \cdot mol^{-1}$)

۹۸,۴ [۴]

۵۲ [۳]

۵۶ [۲]

۱۹۷ [۱]

۱۰۰. در آبکاری یک قطعهٔ فولادی، به وزن $10 kg$ ، از یک لیتر محلول ۱ مولار یون‌های کروم (III) و الکترود کروم در آند استفاده شده است. در آبکاری قطعهٔ مشابه (با جرم برابر) با نقره، از یک محلول ۱ مولار نقره‌نیترات و آند نقره‌ای استفاده شده است. با عبور یک مول الکترون، از هر دو محلول، تفاوت جرم دو قطعهٔ آبکاری شده، به تقریب چند گرم است؟ ($Ag = ۱۰۸, Cr = ۵۲ : g \cdot mol^{-1}$)

۹۰,۶ [۴]

۸۲ [۳]

۵۶ [۲]

۲۵,۴ [۱]

۱۰۱. در فرآیند تولید آلومینیم به روش هال، به ازای عبور $10 \times ۲,۴۰۸$ آنالکترون از مدار بیرونی چند گرم آلومینیم خالص تولید می‌شود و چند لیتر گاز CO_2 با چگالی ۱,۵ گرم بر لیتر تولید می‌شود؟ (ناخالصی‌های موجود در کانی آلومینیم در واکنش شرکت نمی‌کنند).
 $(Al = ۲۷, O = ۱۶, C = ۱۲ : g \cdot mol^{-1})$

۰,۶ - ۰,۳۶ [۴]

۰,۳ - ۰,۷۲ [۳]

۰,۶ - ۰,۷۲ [۲]

۰,۳ - ۰,۳۶ [۱]

۱۰۲. به $200 mL$ مولار نمک وانادیم (V)، $325 mg$ از فلز روی اضافه شده است. با توجه به جدول زیر، رنگ نهایی محلول، کدام خارج از کشور-۱۳۹۸ است؟

$(V^{5+}(aq) + Zn(s) \rightarrow \dots + Zn^{2+}(aq) : Zn = 65 : g \cdot mol^{-1})$

عدد اکسایش وانادیم				
(II)	(III)	(IV)	(V)	رنگ محلول
بنفش	سبز	آبی	زرد	

[۴] سبز

[۳] زرد

[۲] آبی

[۱] بنفش

۱۰۳. واکنش گرم‌گیر فرضی: $E_a' : ۲A + B \rightarrow ۲C$ برابر x کیلوژول است. در حضور کاتالیزگر این مقدار به اندازه ۵۰ درصد تغییر می‌کند. اگر این واکنش در حضور کاتالیزگر برابر $\frac{x}{5}$ باشد، در این صورت مجموع انرژی‌های فعال‌سازی رفت و برگشت در غیاب کاتالیزگر به تقریب چند برابر همین مقدار در حضور کاتالیزگر است؟
 فار-۱۳۹۸

۳,۸ [۴]

۲,۹ [۳]

۳,۴ [۲]

۲,۴ [۱]

۱۰۴. اگر $100,08$ گرم گاز فسفر پنتاکلرید را در یک ظرف دو لیتری دربسته گرما دهیم و پس از تشکیل $28,4$ گرم گاز کلر، تعادل گازی $(P = ۳۱, Cl = ۳۵, ۵ g \cdot mol^{-1} \cdot L^{-1})$ برقرار شود، مقدار ثابت این تعادل برابر چند mol^{-1} است؟
 سنجش-۱۳۹۴

۲,۲۵ [۴]

۲ [۳]

۱,۲۵ [۲]

۱ [۱]

۱۰۵. مخلوطی از $۱,۶$ گرم گاز هیدروژن و ۷۲ گرم بخار برم در یک ظرف سربسته ۲ لیتری را تا رسیدن به حالت تعادل گرم می‌کنیم. اگر در حالت تعادل $۰,۰۵$ مول برم در ظرف واکنش وجود داشته باشد، ثابت تعادل کدام است؟ (همه مواد شرکت‌کننده در تعادل گازی شکل‌اند).
 سنجش-۱۳۹۴

$(H = 1, Br = ۸۰ : g \cdot mol^{-1})$

۸۰ [۴]

۳۲ [۳]

۱۶ [۲]

۸ [۱]

۱۰۶. ۱۲,۹۶ گرم گاز N_2O_5 را در یک ظرف یک لیتری دربسته تا رسیدن به تعادل گازی: $4NO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 4N_2O_5(g)$ می‌کنیم.
اگر در حالت تعادل ۲,۱۶ گرم از آن در ظرف وجود داشته باشد، ثابت تعادل این فرآیند چند $mol^3 \cdot L^{-3}$ است؟
سنجهش-۱۳۹۴

$$(N = 14, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$

۰,۰۵ [۴]

۰,۲۵ [۳]

۰,۲ [۲]

۰,۰۲ [۱]

۱۰۷. در واکنش به حالت تعادل: $A(g) + D(g) \rightleftharpoons X(g) + Y(g)$ که در یک ظرف سربسته دو لیتری قرار دارد. مقدار هر یک از مواد برابر ۴ مول است. اگر در همان دمای آزمایش، این مخلوط تعادلی به یک ظرف سربسته ۴ لیتری منتقل شود. مقدار (X) در تعادل جدید، به تقریب برابر چند خارج از کشور-۱۳۹۶ مول خواهد بود؟ ($\sqrt{0,2} \simeq 0,45$)

۰,۸۵ [۴]

۰,۶۵ [۳]

۰,۵ [۲]

۰,۱ [۱]

۱۰۸. در یک فرایند، مقدار ۱۰ مول $N_2O_4(g)$ در یک ظرف ۵ لیتری وارد شده است. پس از گرم شدن و برقراری تعادل: $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ ، $K = 4mol \cdot L^{-1}$ مولتیپلیکاتور-۱۳۹۴ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید).

۱۵,۲ [۴]

۱۰,۲ [۳]

۱۵,۴ [۲]

۱۰,۴ [۱]

۱۰۹. واکنش تعادلی زیر را در نظر بگیرید. اگر در حالت تعادل، $Ba^{2+}(aq)$ باشد، غلظت یون‌های Ba^{2+} در محلول ۱,۰ مولار سدیم سولفات پس از افزودن مقدار زیادی $BaSO_4(s)$ ، به تقریب برابر چند $mol \cdot L^{-1}$ است؟
سنجهش-۱۳۹۴
 $BaSO_4(s) \rightleftharpoons Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$

 ۲ × ۱۰^{-۷} [۴]

 ۲ × ۱۰^{-۱۱} [۳]

 ۴,۵ × ۱۰^{-۵} [۲]

 ۴,۵ × ۱۰^{-۷} [۱]

۱۱۰. اگر یک مول گاز هیدروژن با دو مول گاز کربن دی‌اکسید در یک ظرف یک لیتری دربسته مخلوط شده، به گونه‌ی تعادلی با هم واکنش دهنده و برابر ۱,۸ باشد، نسبت جرم $H_2O(g)$ به جرم $H_2(g)$ در مخلوط به حالت تعادل، کدام است؟ ($H = 1, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$) خارج از کشور-۱۳۹۶

۲۷ [۴]

۹ [۳]

۵,۲ [۲]

۳,۶ [۱]

۱۱۱. اگر در واکنش زیر ۲ مول از N_2O_4 و ۱ مول از NO_2 در ظرف یک لیتری وارد کنیم تا زمان رسیدن به تعادل فرآورده چند درصد نسبت به مقدار اولیه دچار تغییر می‌شود؟ ($N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ و $K = 2$)

$$\sqrt{21} \sim 4,5$$


۷۵ [۴]

۵۰ [۳]

۳۷,۵ [۲]

۲۵ [۱]

۱۱۲. با توجه به واکنش‌های تعادلی فرضی رو به رو، در شرایطی که هر یک از آن‌ها در یک ظرف یک لیتری دربسته و با یک مول ماده اولیه آغاز شده باشد و بازده درصدی واکنش (I) برابر ۵۰٪ و بازده درصدی واکنش (II) برابر ۸۰٪ باشد، نسبت مقدار K_2 به K_1 کدام است؟ خارج از کشور-۱۳۹۴



۲ [۴]

۱,۵ [۳]

۱ [۲]

۰,۵ [۱]

۱۱۳. اگر در واکنش تعادلی: $D_2(g) \rightleftharpoons 2A_2(g)$ ، مقدار K برابر $1 L \cdot mol^{-1}$ باشد، بیشینه بازدهی درصدی این واکنش هنگامی که غلظت اولیه A_2 برابر $1 mol \cdot L^{-1}$ باشد، کدام است؟ سراسری-۱۳۹۴


۸۵ [۴]

۷۵ [۳]

۵۰ [۲]

۲۵ [۱]

۱۱۴. مقداری روی گربنات مطابق واکنش تعادلی زیر در دمای معین حل می‌شود. غلظت این ماده در آب، به تقریب چند ppm است؟ فار-۱۳۹۸
($ZnCO_3 = 125g \cdot mol^{-1}$ است)
چگالی محلول برابر $1 g \cdot mL^{-1}$



۲,۴ [۴]

۰,۱۲ [۳]

۰,۵ [۲]

۰,۷ [۱]

۱۱۵. اگر در یک ظرف ۲ لیتری با پیستون متحرک، در دمای معین مقداری PCl_5 گرم داده شود، پس از تشکیل $PCl_3(g) + Cl_2(g)$ ، $K = 1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ برقرار می‌شود. چنانچه در این شرایط و دمای ثابت حجم ظرف واکنش نصف شود؛ سراسری-۱۳۹۴
واکنش در کدام جهت جابه‌جا شده و مقدار PCl_5 اولیه چند مول بوده است؟ ($Cl = ۳۵, 5 \text{ g} \cdot mol^{-1}$)


۱، ۵ [۴]

۲، ۵ [۳]

۱، ۵ [۲]

۲، ۵ [۱]

۱۱۶. ۱۰ مول گاز نیتروژن و ۳۰ مول گاز هیدروژن در شرایط بهینه واکنش داده شده‌اند. حداکثر چند گرم آمونیاک، در ظرف خارج از کشور-۱۳۹۸
واکنش تشکیل خواهد شد؟ ($N = ۱۴, H = ۱ : g \cdot mol^{-1}$)



۱۲۹, ۲ [۲]

۳۴۰ [۴]

۹۵, ۲ [۱]

۱۷۰ [۳]

۱۱۷. اگر از واکنش کامل ترفتالیک اسید با مقدار کافی اتیلن گلیکول، ۹ کیلوگرم از جرم مواد آلی کاسته شده باشد، حدوداً چند پلیمر با میانگین شمار خوشخوان-۱۳۹۸
واحدهای تکرارشونده برابر با صدهزار می‌توان تولید کرد؟ ($O = ۱۶, H = ۱ : g \cdot mol^{-1}$)

 ۳, ۰۱ $\times ۱۰^{۲۳}$ [۴]

 ۳, ۰۱ $\times ۱۰^{۲۲}$ [۳]

 ۳, ۰۱ $\times ۱۰^{۲۱}$ [۲]

 ۳, ۰۱ $\times ۱۰^{۲۰}$ [۱]

۱۱۸. ۵۴ گرم FeO با خلوص ۸۰ درصد و ۳۰ گرم Na_2O با خلوص ۷۹, ۵ درصد را وارد ظرفی سرباز که دارای مقدار کافی کربن جامد است، کرده و حرارت می‌دهیم تا واکنش انجام شود. نسبت درصد جرمی Na_2O در مخلوط جامد نهایی به درصد خلوص O اولیه تقریباً چقدر است؟ قلم چی-۱۳۹۸
($Fe = ۵۶, O = ۱۶, C = ۱۲, Na = ۲۳ : g \cdot mol^{-1}$)



۰, ۳۷ [۴]

۰, ۳۴ [۳]

۰, ۴۷ [۲]

۰, ۴۰ [۱]

۱۱۹. مخلوطی از برآده آهن و زنگ آهن ($Fe_2O_۳$) به جرم ۲۰۰ g را ابتدا در مقداری محلول هیدروکلریک اسید کافی حل می‌کنیم. طی این واکنش در شرایط $۳۳, ۶ L STP$ ، ۳۳ گاز هیدروژن تولید می‌شود. سپس به محلول به دست آمده به مقدار کافی $NaOH$ می‌افزاییم تا هیچ‌کدام از یون‌های $Fe^{۳+}$ در ظرف به حالت محلول باقی نمانند. به ترتیب از راست به چپ چند درصد از مخلوط اولیه را آهن خالص تشکیل داده است و مقدار کل افزوده شده در مرحله دوم چند گرم است؟ (قلم چی-۱۳۹۸)
($Fe = ۵۶, O = ۱۶, Na = ۲۳, H = ۱ : g \cdot mol^{-1}$)



۵۹۲ - ۴۲ [۴]

۵۹۲ - ۲۱ [۳]

۲۹۴ - ۴۲ [۲]

۲۹۴ - ۲۱ [۱]

۱۲۰. اکسیدی از آهن به جرم ۴۶, ۴ گرم در واکنش با کربن، ۱۶, ۸ گرم آهن و مقداری کربن دی‌اکسید تولید کرده است. اگر بدانیم پیشرفت واکنش ۵۰% بوده، چند لیتر گاز کربن دی‌اکسید با چگالی $1 g \cdot L^{-1}$ تولید شده است؟ (قلم چی-۱۳۹۸)
($Fe = ۵۶, O = ۱۶, C = ۱۲ : g \cdot mol^{-1}$)

۴, ۲ [۴]

۵, ۶ [۳]

۸, ۷ [۲]

۸ [۱]

۱۲۱. اگر نیم عمر عنصر فرضی X ، ۲ ساعت باشد و پس از گذشت ۱۶ ساعت جرم هسته‌های باقی‌مانده از عنصر X برابر با جرم هسته‌های تجزیه شده‌ی عنصر Y باشد، نیم عمر عنصر فرضی Y چند ساعت است؟ (جرم اولیه هر هسته‌ی عنصر X ، ۱۹۲ برابر جرم اولیه هر هسته‌ی عنصر Y است.)

قلم چی-۱۳۹۷

۰, ۵ [۴]

۴ [۳]

۲ [۲]

۸ [۱]

۱۲۲. اگر برای تبخیر یک مول آب در دمای $۱۰۰^{\circ}C$ به ۴۵ کیلوژول گرمای نیاز باشد، گرمای حاصل از سرد کردن ۱۰۰ m^3 گاز اکسیژن با چگالی $۱, ۵$ گرم بر لیتر از دمای ۸۵ کلوین به دمای ۰ کلوین، تقریباً چند لیتر آب $۱۰۰^{\circ}C$ را به بخار آب $۵۰^{\circ}C$ تبدیل می‌کند و نسبت ظرفیت گرمایی ۲ گرم آب به ۳ گرم گاز اکسیژن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ ($H = ۱, O = ۱۶ : g \cdot mol^{-1}$)

(چگالی آب، ظرفیت گرمایی ویژه آب و اکسیژن را به ترتیب از راست به چپ برابر ۱ گرم بر میلی‌لیتر، ۴, ۲ و ۱ ژول بر گرم درجه سلسیوس در نظر بگیرید).



۲, ۸ - ۴, ۱ [۴]

۱, ۹ - ۸, ۳ [۳]

۱, ۹ - ۴, ۱ [۲]

۲, ۸ - ۸, ۳ [۱]

۱۲۳. با توجه به واکنش‌های زیر:



اگر مخلوطی شامل گازهای N_2 , N_2H_4 و H_2 به جرم ۱۰۲ گرم که فشار گاز N_2H_4 در مخلوط ۲ برابر فشار گاز N_2 می‌باشد، به طور کامل با یکدیگر واکنش دهنده، مقدار گرمای آزاد شده به تقریب می‌تواند دمای چند کیلوگرم آب را به اندازه ۵ درجه سلسیوس افزایش دهد؟ (ظرفیت گرمایی ویژه آب برابر $C = 4,2 J \cdot g^{-1} \cdot ^\circ C^{-1}$ است.)



۲,۴ [۴]

۱,۸ [۳]

۱,۱ [۲]

۰,۸ [۱]

۱۲۴. با توجه به واکنش‌های زیر، اگر برای تبدیل یک گرم گاز هیدروژن به اتم‌های سازنده‌اش ۲۱۸ کیلوژول گرما لازم باشد، آنتالپی پیوند $N \equiv N$ چند کیلوژول بر مول است؟ (آنتالپی پیوند $N - N$ برابر ۱۶۳ کیلوژول بر مول است).



۹۸۰ [۴]

۹۴۶ [۳]

۸۶۰ [۲]

۸۱۰ [۱]

۱۲۵. در یک ظرف واکنش، در مدت زمان چهار دقیقه بعد از آغاز واکنش تجزیه PCl_5 گازی، سرعت متوسط تولید گاز کلر $L \cdot s^{-1}$ است. اگر ۱۹۹,۸۴ گرم از PCl_5 پس از گذشت این زمان در ظرف واکنش باقی بماند، چند درصد از PCl_5 تجزیه شده است؟ (حجم مولی گازها در دمای واکنش $P = ۳۱$ و $Cl = ۳۵,۵ : g \cdot mol^{-1}$)

۳۵,۰۲ [۴]

۷۰,۰۴ [۳]

۵۰,۰۴ [۲]

۲۵,۰۲ [۱]

۱۲۶. مخلوطی از کلسیم کربنات و سدیم هیدروژن کربنات به جرم ۹,۲ گرم را گرمایی دهیم تا تجزیه شوند. اگر سرعت تولید CO_2 در هر دو واکنش یکسان و تا پایان واکنش ثابت و برابر $1 mol \cdot min^{-1}$ باشد و پس از ۲,۵ دقیقه سدیم هیدروژن کربنات به طور کامل مصرف شود، چند دقیقه دیگر نیاز است تا کلسیم کربنات نیز به طور کامل مصرف شود؟ ($Ca = ۴۰$, $Na = ۲۳$, $O = ۱۶$, $C = ۱۲$, $H = ۱ : g \cdot mol^{-1}$)



۱۰ [۴]

۷,۵ [۳]

۵ [۲]

۲,۵ [۱]

۱۲۷. تغییرات غلظت دو ماده از مواد شرکت کننده در واکنش $A(l) + 2B(g) \rightarrow 3C(g) + D(g)$ به صورت زیر است. در ثانیه‌ی پنجم، مجموع شمار مول‌های گازی موجود در ظرف یک لیتری واکنش برابر ۹ است. اگر سرعت واکنش در پنج ثانیه‌ی دوم پس از شروع واکنش برابر ۱۳۹۵ باشد، حاصل $b + d$ کدام است؟

زمان (s)	۰	۵	۱۰	۱۵
[X] (mol · L ⁻¹)	۱,۶	a	b	۱
[Y] (mol · L ⁻¹)	۰	c	d	۰,۹

۱,۸۸ [۲]

۱,۸۲ [۴]

۲,۰۵ [۱]

۱,۹۵ [۳]

۱۲۸. مقادیر برابر $5 N_2O$ خالص و Li_2O خالص را در دمای اتاق وارد مقداری آب خالص می‌کنیم. پس از مدتی pH آب دوباره به ۷ می‌رسد. درصد خلوص Li_2O تقریباً چند درصد است؟ (ناخالصی‌ها را خنثی در نظر بگیرید).

$$(Li = ۷, O = ۱۶, N = ۱۴ : g \cdot mol^{-1})$$

۵۵ [۴]

۴۴,۴۶ [۳]

۲۷,۷۷ [۲]

۷۲,۲۲ [۱]

۱۲۹. V میلی‌لیتر محلول هیدروکسید حاصل از فلزی که آخرین دو الکترون اتم آن دارای عده‌های کواترموئی $6 = l = n = ۰$ می‌باشد و دارای $pH = ۱۱,۳$ است، می‌تواند نیم‌لیتر محلول دو مولار یک اسید را به طور کامل خنثی نماید. اگر V برابر باشد، اسید دارای مرحله‌ی یونش است. (با تغییر)


۱۰۰۰ [۴]

۵۰۰ [۳]

۱۰۰۰ [۲]

۵۰۰ میلی‌لیتر - یک [۱]

۱۳۰ . ارتوزایلن (ترکیب a) در اثر اکسایش در شرایط مناسب به فتالیک انیدرید (ترکیب b) تبدیل می‌شود. مجموع تغییر اعداد اکسایش اتم‌های کربن گروه‌های ایجاد شده در آن، چند واحد با مجموع اعداد اکسایش اتم‌های کربن گروه‌های عاملی در آسپرین تفاوت دارد؟



۶ [۲]


۷ [۳]

۸ [۴]

۱۳۱ . با توجه به واکنش موازن نشده‌ی زیر، نسبت مقدار جرم MnO_2 مصرفی برای تهیه ۲ لیتر گاز کلر در دمای ${}^{\circ}C$ و فشار $72 atm$ تقریباً چند برابر مقدار مول HCl مصرفی برای تهیه ۸ لیتر گاز کلر در دمای $473 K$ و فشار $6 atm$ است؟

قلم‌چی-۱۳۹۶

$$(H = 1, Cl = 35.5, Mn = 55, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$



۱۱,۶ [۴]

۱۱,۳ [۳]




۵,۶ [۲]

۵,۸ [۱]

۱۳۲ . ۱ گرم از نمونه‌ای حاوی سدیم هیدروکسید و کلسیم هیدروکسید را در اختیار داریم. این نمونه را در $100 {}^{\circ}C$ هنگام انحلال CO_2 مولکول‌های کربن دی‌اکسید با آب کاملاً واکنش داده (طبق واکنش I) و H_2CO_3 را تشکیل می‌دهند. از آنجایی که در دما و فشار انحلال پذیری CO_2 در $100 {}^{\circ}C$ آب است، در یک کیلوگرم آب به مقدار کافی (سیر شدن) CO_2 حل می‌کنیم. دو محلول ذکر شده را باهم مخلوط کرده و مطابق واکنش‌های موازن نشده (II) و (III) که به طور کامل انجام می‌شوند، ۱ گرم رسوب کاملاً نامحلول کلسیم کربنات تشکیل می‌شود. تقریباً چند درصد جرم نمونه اولیه از عنصر سدیم تشکیل شده است؟ (از تغییرات دما در روند حل مسئله صرف نظر کنید.)

قلم‌چی-۱۳۹۶

$$(Ca = 40, Na = 23, O = 16, C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$$



۶۱,۹ [۴]

۶۴,۴ [۳]

۳۵,۶ [۲]

۳۸,۱ [۱]

۱۳۳ . مقداری پتاسیم پرمanganات ($KMnO_4$) را وارد یک ظرف سربسته می‌کنیم و حرارت می‌دهیم تا مطابق واکنش زیر به طور کامل تجزیه شود. اگر اختلاف جرم $KMnO_4$ و MnO_2 تولیدی از این واکنش برابر 2.75 گرم باشد، حجم O_2 تولید شده چند لیتر بوده است؟ (واکنش در شرایط استاندارد انجام می‌شود.)

$$(Mn = 55, O = 16, K = 39 : g \cdot mol^{-1})$$



۵,۹۶ [۴]

۰,۸۸ [۳]



۰,۵۶ [۲]

۰,۳۲ [۱]

۱۳۴ . مخلوطی به حجم 11.2 لیتر از گازهای هیدروژن و متان را در شرایط STP در حضور اکسیژن کافی طبق معادله‌های موازن نشده زیر می‌سوزانیم. در صورتی که جرم بخار آب حاصل از هر دو واکنش برابر 11.25 گرم باشد به صورت تقریبی چند درصد حجمی از مخلوط گاز اولیه را متان تشکیل می‌دهد؟

قلم‌چی-۱۳۹۷

$$(C = 12, O = 16, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$$




۷۵ [۴]

۴۵ [۳]

۲۵ [۲]

۱۵ [۱]

۱۳۵. پتاسیم پرمنگنات مطابق واکنش زیر تجزیه می‌شود. اگر مقداری پتاسیم پرمنگنات خالص را وارد محفظه واکنش کنیم و در اثر حرارت 75% آن تجزیه شود، جرم جامد باقی‌مانده در ظرف برابر 292 گرم خواهد شد. حجم گاز اکسیژن آزاد شده در اثر تجزیه کامل پتاسیم پرمنگنات و در شرایط قلم چی- 1397 چند لیتر است؟ ($K = 39, Mn = 55, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$) STP



۳۳, ۶ [۴]

۴۴, ۸ [۲]

۲۲, ۴ [۲]

۱۱, ۲ [۱]

۱۳۶. 100 میلی‌لیتر محلول پتاسیم کلرید با غلظت مولی 1000 مولار را به 1000 میلی‌لیتر محلول کلسیم کلرید با غلظت مولی 100 مولار اضافه کنیم. غلظت یون کلرید در محلول حاصل تقریباً چند ppm است؟

$$(Ca = 40, K = 39, Cl = 35.5 : g \cdot mol^{-1})$$

۴۸۴, ۰۸ [۴]

۶۴۵, ۴۶ [۲]

۳۲۲, ۷۳ [۲]

۲۹۰, ۴۵ [۱]

۱۳۷. درون بشر «الف» 58.5 گرم سدیم کلرید در 500 میلی‌لیتر آب مقطر و درون بشر «ب» 170 گرم نقره نیترات در 500 میلی‌لیتر آب مقطر حل می‌کنیم، و سپس این دو را با یکدیگر مخلوط می‌کنیم. چند مورد از مطالب زیر درست‌اند؟

$$(Ag = 108, Cl = 35.5, Na = 23, O = 16, N = 14 : g \cdot mol^{-1})$$

(الف) در اثر واکنش میان این دو ترکیب رسوب قرمز رنگی تشکیل می‌شود.

(ب) درصد جرمی نیتروژن در نقره نیترات به تقریب 2% برابر درصد جرمی سدیم در سدیم کلرید است.

(پ) جرم رسوب تشکیل شده برابر 71.75 گرم می‌باشد.

(ت) غلظت یون نیترات در مخلوط نهایی برابر 5% مولار است که در طول واکنش ثابت می‌ماند.


۱ [۴]

۲ [۲]

۳ [۲]

۴ [۱]

۱۳۸. با توجه به شکل‌های زیر چند مورد از مطالب داده شده درست است؟ (هر ذره حل‌شونده هم ارز با 2×10^{-5} مول می‌باشد.)



- مولاریتۀ محلول‌های (۱) و (۴) باهم برابرند.

- نسبت مولاریتۀ محلول در شکل (۲) به شکل (۳) برابر 3 می‌باشد.

- با افزودن محلول‌های (۱) و (۳) به یکدیگر مولاریتۀ محلول حاصل با مولاریتۀ محلول (۲) برابر می‌شود.

- غلظت محلول‌های (۳) و (۴) بر حسب ppm دقیقاً باهم یکسان است.

- کمترین مولاریتۀ محلول در این شکل‌ها مربوط به شکل (۵) می‌باشد.

۱ [۴]

۲ [۲]

۳ [۲]

۴ [۱]

۱۳۹. از حل کردن کدام یک از ترکیب‌های زیر به صورت جداگانه در یک کیلوگرم آب غلظت یون کلر، به تقریب $30 ppm$ می‌شود؟

$$(K = 39, Ca = 40, Na = 23, O = 16, Cl = 35.5, Fe = 56 : g \cdot mol^{-1})$$

۱۰, ۰۵g [۴]

۱۰, ۰۵g [۲]

۱۰, ۰۵g [۲]

آهن (III) کلرید [۱]

۱۳۹۷

۱۴۰. با توجه به جدول‌های انحلال‌پذیری A و B در دماهای مختلف، کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

$\theta(^{\circ}C)$	۱۰	۲۰	۳۰
S_A	۷۵	۷۸	۸۱

$\theta(^{\circ}C)$	۱۰	۲۰	۳۰
S_B	۵۵	۶۲	۶۹

[۱] تأثیر دما بر روی انحلال‌پذیری ماده B از A بیشتر است.



[۲]

در دمایی که انحلال‌پذیری این دو ماده باهم برابر است، غلظت مولی و درصد جرمی محلول A و B نیز باهم برابر است.

[۳] اگر 76 گرم محلول سیر شده A در دمای $6^{\circ}C$ را تا دمای $40^{\circ}C$ سرد کنیم 2.4 گرم رسوب تشکیل می‌شود.

[۴] اگر در $40^{\circ}C$ در 400 گرم آب، 400 گرم نمک B را حل کنیم یک ترکیب سیر نشده به دست می‌آید.

۱۴۱. واکنش‌های تعادلی زیر را در نظر بگیرید، واکنش (I) با یک مول (g) CO_2 و ۴ مول (g) H_2 و واکنش (II) با یک مول از هر دو واکنش دهنده شروع می‌شود. پس از برقراری تعادل در هر دو واکنش، نسبت بازده درصدی واکنش (I) به بازده درصدی واکنش (II) کدام است؟
قلم چی- ۱۳۹۵



$$\frac{72}{70} \quad [4]$$

$$\frac{68}{72} \quad [3]$$

$$\frac{83}{80} \quad [2]$$

$$\frac{50}{78} \quad [1]$$

قلم چی- ۱۳۹۹

۱۴۲. کدام موارد از مطالب زیر صحیح هستند؟

آ - در یک اسیدچرب راستزنجیر و سیرشد، تعداد اتم‌های H دوبرابر C است.

ب - گریس با فرمول تقریبی $C_{18}H_{38}$ نسبت به بنزین کمتر فرار است و برخلاف روغن زیتون، در آب نامحلول می‌باشد.

پ - در واکنش موازن‌شده سوختن کامل روغن زیتون، نسبت مجموع ضرایب فراورده‌ها به مجموع ضرایب واکنش دهنده‌ها، $\frac{109}{81}$ است.

ت - برای سوختن کامل ۱ مول واژلین، به $2/85$ لیتر هوا در شرایط STP نیاز است. (درصد حجمی O_2 در هوا ۲۰٪ است).

$$[4] \quad \text{آ و ب و ت}$$

$$[3] \quad \text{آ و ب}$$


$$[2] \quad \text{ب و ب}$$

$$[1] \quad \text{آ و ب و ت}$$

۱۴۳. با توجه به واکنش زیر، برای تهیه ۲۱ گرم گاز کلر (Cl_2)، تقریباً به چند گرم منگنز (IV) اکسید با خلوص ۹۰ درصد نیاز است؟

قلم چی- ۱۳۹۷

$$(Mn = 55, Cl = 35.5, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$



$$[4] \quad 57,2$$

$$[3] \quad 28,6$$


$$[2] \quad 51,4$$

$$[1] \quad 25,7$$

۱۴۴. برای واکنش کامل ۲۰ گرم سولفوریک اسید ($H_2SO_4(aq)$) ۴۹٪ خالص، چند گرم سدیم هیدروکسید با خلوص ۸۰ درصد لازم است؟

قلم چی- ۱۳۹۷

$$(Na = 23, H = 1, O = 16, S = 32 : g \cdot mol^{-1})$$



$$[4] \quad 20$$

$$[3] \quad 15$$


$$[2] \quad 10$$

$$[1] \quad 5$$

۱۴۵. اگر در واکنش (موازن‌نشده): $Li_2N(s) + H_2O(l) \rightarrow LiOH(aq) + NH_3(aq)$ ۵ مول لیتیم نیترید مصرف شود و بازده درصدی

قلم چی- ۱۳۹۶

واکنش ۸۰ درصد باشد، فراورده‌های واکنش در مجموع با چند مول HCl واکنش کامل می‌دهند؟



۱۴۶. با مصرف ۷۰ تن فلز منیزیم ناخالص در واکنش زیر، ۹۸۰۰ کیلوگرم سیلیسیم خالص به دست آمده است. اگر بازده واکنش ۴۰٪ باشد، درصد

خلوص فلز منیزیم چه قدر است؟
قلم چی- ۱۳۹۷ $2Mg + SiCl_4 \rightarrow 2MgCl_2 + Si$ $(Mg = 24, Si = 28 : g \cdot mol^{-1})$

$$[4] \quad 70$$

$$[3] \quad 60$$


$$[2] \quad 50$$

$$[1] \quad 40$$

۱۴۷. در پایان واکنش تجزیه ۵۰ گرم کلسیم کربنات ناخالص، جرم مواد جامد موجود در ظرف به $39g$ کاهش می‌یابد، درصد خلوص این نمونه کلسیم

قلم چی- ۱۳۹۷

کربنات کدام است؟ (ناخالصی‌ها به صورت جامد در ظرف باقی می‌مانند).




$$[4] \quad 90$$

$$[3] \quad 75$$

$$[2] \quad 50$$

$$[1] \quad 25$$

۱۴۸. از واکنش تجزیه ۱۰۰ گرم کلسیم کربنات با خلوص ۷۵% در یک ظرف در باز به میزان ۸۰٪، چند گرم ماده جامد در ظرف واکنش باقی ماند؟ (ناخالصی‌ها در واکنش شرکت نمی‌کنند و به صورت جامد باقی می‌باشد.)
قلم‌چی-۱۳۹۷




۸۷,۷ [۴]

۷۳,۶ [۳]

۶۶,۴ [۲]

۳۳,۶ [۱]

۱۴۹. اگر جرم یک نمونه اتانول ناخالص با خلوص ۵۰٪ با جرم یک نمونه منگنز (II) کربنات ($MnCO_3$) خالص برابر باشد، نسبت شمار مول‌های اتانول به منگنز (II) کربنات کدام است؟
قلم‌چی-۱۳۹۷





۱ [۴]

۰,۲ [۳]

۱,۲۵ [۲]

۵ [۱]

۱۵۰. اگر از تجزیه کامل جرم‌های یکسانی از هر یک از واکنش‌دهنده‌ها در شرایط STP ، حجم گاز اکسیژن آزاد شده در دو واکنش برابر باشد، نسبت درصد خلوص کدام عدد نزدیک‌تر است؟ (ناخالصی‌ها در واکنش شرکت نمی‌کنند).
قلم‌چی-۱۳۹۷




۱,۱۲ [۴]

۱ [۳]

۰,۷۵ [۲]

۰,۲۵ [۱]

۱۵۱. ۱۹,۶ گرم پتابسیم کلرات خالص را در یک ظرف سر باز حرارت می‌دهیم تا تجزیه شود. در پایان واکنش جرم مواد درون ظرف ۱۵,۷۶ گرم گزارش شده است. بازده درصدی واکنش کدام است؟
قلم‌چی-۱۳۹۷




۵۰ [۴]

۶۰ [۳]

۲۵ [۲]

۷۵ [۱]

۱۵۲. به منظور تهیه ۲۵۰ میلی‌لیتر محلول سدیم هیدروکسید با غلظت ۲ مولار، چند گرم سدیم هیدروکسید با خلوص ۸۰٪ لازم است و از واکنش میلی‌لیتر از این محلول با مقدار کافی آهن (III) کلرید، تقریباً چند گرم رسوب، در صورتی که بازده واکنش ۸۷٪ باشد، به دست می‌آید؟
قلم‌چی-۱۳۹۷




۶,۲ - ۲۵ [۴]

۷,۱ - ۱۶ [۳]

۶,۲ - ۱۶ [۲]

۷,۱ - ۲۵ [۱]

۱۵۳. اگر دو نمونه ناخالص پتابسیم کلرات و سدیم نیترات به جرم‌های برابر، هر یک جداگانه تجزیه شوند و در اثر تجزیه آن‌ها مقدار گاز اکسیژن یکسانی تولید شود، نسبت درصد خلوص پتابسیم کلرات به سدیم نیترات تقریباً کدام است؟
($KClO_3 = ۱۲۲, ۵, NaNO_3 = ۸۵ : \frac{g}{mol}$)
قلم‌چی-۱۳۹۷





۲,۵ [۴]

۱,۱ [۳]

۱ [۲]

۰,۴۸ [۱]

۱۵۴. اگر از واکنش ۴۱,۱ گرم بوکسیت طی واکنش موازن نشده زیر، ۲۰۰ گرم آلومینیم مذاب با خلوص ۷۴ درصد به دست آید، درصد خلوص آلومینیم اکسید در نمونه بوکسیت تقریباً چه قدر است؟ (بازده درصدی واکنش برابر ۸۰٪ می‌باشد).
قلم‌چی-۱۳۹۷



۹۷ [۴]

۸۵ [۳]

۶۸ [۲]

۴۳ [۱]

۱۵۵ . در کدام واکنش انجام شده از واکنشهای زیر، بازده درصدی %۸۰ است؟
 قلم چی-۱۳۹۷

$$(Fe = 56, Al = 27, O = 16, C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$$

(تمام مواد را خالص در نظر بگیرید).

۱) واکنش ترمیت که طی آن ۲۸ گرم ماده مذاب از ۸۰ گرم ماده اکسید اولیه تولید شود.

۲) واکنش مقدار کافی ماده‌ای که به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می‌رود با ۳ مول کربن مونوکسید که طی آن ۸۹,۶ گرم ماده جامد تولید شود.

۳) واکنش استخراج آهن از سنگ معدن آن در فولاد مبارکه، که طی آن با مصرف ۳۶ گرم واکنش دهنده عنصری، ۲۴ گرم آهن تولید شود.

۴) واکنش تولید سوز سبز از تخمیر گلوکز موجود در بقایای گیاهی که با مصرف ۹۰ گرم گلوکز، ۵,۳۶ گرم سوز سبز تولید شود.

۱۵۶ . در یک آزمایش در اثر حرارت دادن ۱۳,۸ گرم نمک خشک $M(XO_3)_2$ با خلوص ۷۵ درصد، ۴,۸ گرم گاز اکسیژن به همراه ۵,۵۵ گرم MX_2 جامد تولید می‌شود. هرگاه MX_2 حاصل از واکنش اول با مقدار کافی محلول نقره نیترات به میزان ۸۰ درصد واکنش دهد و طی واکنش ۱۱,۴۸ گرم رسوب AgX به دست آید، اختلاف جرم مولی M و X بر حسب گرم بر مول در کدام گزینه به درستی ارائه شده است؟ (ناخالصی‌ها در هیچ کدام از واکنش‌ها شرکت نمی‌کنند).
 قلم چی-۱۳۹۷

$$(Ag = 108, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$

۳,۵ [۴]


۴,۵ [۳]

۱۱,۵ [۲]

۴۰ [۱]

۱۵۷ . در واکنش‌های زیر جرم‌های یکسانی از N_2 و O_2 ناخالص مصرف و جرم‌های یکسانی از فراورده‌ها تولید می‌شود. درصد خلوص O_2 حدوداً چند برابر درصد خلوص N_2 است؟ (در هر دو واکنش، H_2 به مقدار کافی وجود دارد).
 قلم چی-۱۳۹۷

$$(H = 1, N = 14, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$



۱,۰۸ [۴]




۱,۲۶ [۳]

۰,۵۲ [۲]

۰,۸۵ [۱]

۱۵۸ . مطابق شکل زیر، مقدار زیادی پتاسیم کلرات در ظرف (۱) در حالت تجزیه شدن است. همچنین ۱۱۵ گرم سدیم با خلوص ۸۰٪ در ظرف (۲) با آب واکنش می‌دهد. بازده واکنش در ظرف (۳) چند درصد باشد تا گازهای حاصل در واکنش کامل با هم بتوانند حداقل ۱۶ لیتر بخار آب با چگالی ۰,۹ گرم بر لیتر را تولید کنند؟ ($Na = 23, H = 1, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$)
 قلم چی-۱۳۹۷



۲۰ [۱]

۴۰ [۲]

۶۰ [۳]

۸۰ [۴]

۱۵۹ . به منظور یافتن درصد خلوص سیلیسیم موجود در یک قطعه، جامد شفاف حاوی اکسید آن، سیلیسیم به صورت پودر درآورده و با کربن خالص در دمای بسیار بالا به طور کامل واکنش می‌دهیم، به طوری که هیچ کدام از واکنش‌دهنده‌های خالص، باقی نمی‌مانند. اگر پس از پایان واکنش همچنان ۲,۴۶ گرم ماده جامد باقی مانده و ۴۲,۰ گرم مایع از قطعه اولیه تولید شده باشد، چند درصد نمونه اولیه را سیلیسیم تشکیل می‌دهد؟
 قلم چی-۱۳۹۷

$$(Si = 28, O = 16, C = 12 : g \cdot mol^{-1})$$



۱۷,۸ [۴]

۱۲,۵ [۳]

۲۵ [۲]

۴۶,۶۷ [۱]

۱۶۰ . در شرایط STP حجم CO_2 تولید شده از سوختن کامل جرم‌های یکسانی از متان و پروپان با هم برابر است. نسبت درصد خلوص متان به درصد خلوص پروپان به تقریب کدام است؟ ($H = 1, C = 12 : g \cdot mol^{-1}$)
 قلم چی-۱۳۹۷



۰,۳۶ [۴]

۰,۹۱ [۳]

۱,۰۹ [۲]

۲,۷۵ [۱]

۱۶۱. مخلوطی به جرم ۱۵ گرم از گازهای متان و پروپان در مجاورت اکسیژن کافی به طور کامل می‌سوزد. اگر در پایان واکنش ۲۷ گرم بخار آب حاصل شده باشد، چند درصد از جرم مخلوط اولیه را متان تشکیل می‌دهد؟ ($C = 12, H = 1, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$)

قلم چی-۱۳۹۷

 ۲۰ ۴

 ۳۳,۳ ۳

 ۲۶,۷ ۲

 ۳۰ ۱

۱۶۲. عنصر اصلی سازنده سلول‌های خورشیدی سیلیسیم است. برای استخراج این عنصر از واکنش اکسید آن با فرمول SiO_2 با کربن استفاده می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم واکنش بدیری این عنصر از کربن است. چنانچه ۷۰ گرم کربن به طور کامل با هم واکنش دهنده برابر بر اثر این واکنش ۳۲ گرم Si و ۵۶ گرم گاز کربن مونوکسید تولید شود، درصد خلوص سیلیسیم به دست آمده در این واکنش تقریباً برابر است.

قلم چی-۱۳۹۷

 ۷۲,۷ ۴


 ۳۶,۳ ۳

 ۷۲,۷ ۲

 ۳۶,۳ ۱

۱۶۳. به منظور استخراج آهن از سنگ معدن آن، دو واکنش زیر هر کدام با بازده ۹۰٪ انجام می‌شود. به منظور تولید ۶۷۲ کیلوگرم آهن به تقریب به چند گرم متان با خلوص ۸۰٪ نیاز است؟ ($C = 12, H = 1, Fe = 56 : g \cdot mol^{-1}$)

قلم چی-۱۳۹۸


 ۲,۹ × ۱۰^۵ ۴

 ۴ × ۱۰^۵ ۳

 ۴,۴ × ۱۰^۵ ۲

 ۳,۶ × ۱۰^۵ ۱

۱۶۴. اگر در واکنش (g) $Al_2O_3(s) + 3SO_2(g) \rightarrow Al_2O_3(s) + 3SO_2(g)$ ۳۳,۵ گرم آلومینیم سولفات با خلوص ۸۰٪ وارد واکنش شود، زمانی که جرم جامد تولید شده با جرم ناخالصی برابر می‌شود، حجم گاز تولید شده در شرایط استاندارد تقریباً چند میلی‌لیتر است؟ ($Al = 27, S = 32, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$)

قلم چی-۱۳۹۸

 ۶۵,۸ ۴

 ۶۵۸۲ ۳

 ۴۴۱۰ ۲

 ۵,۵۵ ۱

۱۶۵. تفاوت جرم مولی یک پاک‌کننده غیرصابونی که گروه R در آن ۱۴ اتم کربن دارد با یک پاک‌کننده صابونی ۱۸ کربنی کدام است؟ (Na^+ کاتیون موجود در هر دو نوع پاک‌کننده است، گروه R و بخش هیدروکربنی صابون را سیرشده و خطی در نظر بگیرید.)

قلم چی-۱۳۹۸

$$(H = 1, C = 12, O = 16, S = 32 : g \cdot mol^{-1})$$

 ۷۰ ۴

 ۴۸ ۳

 ۷۹ ۲

 ۶ ۱

۱۶۶. کربن دی‌اکسید تولیدشده در اثر واکنش استخراج فلز از یک نمونه ۴۰۰ گرمی کانه هماتیت با درصد خلوص ۸۰ درصد چندباربر کربن دی‌اکسید تولیدشده از تخمیر بی‌هوایی ۳۶ کیلوگرم پسماند گیاهی شامل ۲۰٪ گلوکز است؟ (بازده درصدی واکنش اول ۷۰ درصد و بازده درصدی واکنش دوم ۷۵ درصد است.)

قلم چی-۱۳۹۸

$$(Fe = 56, O = 16, C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$$

 ۰,۰۷ ۴

 ۳ × ۱۰^{-۳} ۳

 ۱۸ × ۱۰^{-۳} ۲

 ۳۵ × ۱۰^{-۳} ۱

۱۶۷. طبق واکنش موازن نشده تجزیه آمونیوم دی‌کرومات، یک مول واکنش‌دهنده تا چند درصد تجزیه می‌شود که جرم آمونیوم دی‌کرومات باقی مانده با فراورده جامد برابر گردد؟ ($N = 14, Cr = 52, O = 16, H = 1 : g \cdot mol^{-1}$)

قلم چی-۱۳۹۸


 ۴۵ ۴

 ۵۵ ۳

 ۳۸ ۲

 ۶۲ ۱

۱۶۸. برای جوش دادن خطوط راه‌آهن از واکنش ترمیت استفاده می‌شود و برای جوش دادن هر کیلومتر خط راه‌آهن به ۲,۸ کیلوگرم آهن مذاب نیاز است. برای جوش دادن یک مسیر ۹۵۰ کیلومتری به تقریب چند کیلوگرم آلومینیم با درصد ناخالصی ۲۰ درصد نیاز داریم؟ (بازده درصدی واکنش ترمیت ۶۰ درصد است.)

قلم چی-۱۳۹۸

$$(Fe = 56, Al = 27 : g \cdot mol^{-1})$$

 ۲,۶۷۲ × ۱۰^۴ ۴

 ۹۶۲ ۳

 ۲۶۷۲ ۲

 ۱۷۱۰ ۱

۱۶۹. یکی از روش‌های بیرون کشیدن فلز از لابه‌لای خاک، استفاده از گیاهان است. در این روش در معدن یا خاک دارای فلز، گیاهانی را می‌کارند که می‌توانند آن فلز را جذب کنند. سپس گیاه را برداشت می‌کنند، می‌سوزانند و از خاکستر حاصل، فلز را جداسازی می‌کنند. با توجه به این موضوع و جدول زیر، پاسخ صحیح هر سه پرسش در کدام گزینه آمده است؟

قلم چی-۱۳۹۸

نماد شیمیایی فلز	قیمت هر کیلوگرم فلز (ریال)	بیشترین مقدار فلز در یک کیلوگرم از گیاه (گرم)	درصد فلز در سنگ معدن
Au	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۱	۰,۰۰۲
Ni	۸۲۰۰۰	۳۸	۲
Cu	۲۴۵۰۰	۱۴	۰,۵
Zn	۱۵۵۰۰	۴۰	۵

الف) اگر در پالایش طلا به کمک گیاهان در هر هکتار بتوان ۲۰ تن گیاه برداشت کرد، در هر هکتار چند گرم طلا از زمین بیرون کشیده می‌شود؟

ب) یک کیلوگرم از گیاهی که برای پالایش نیکل به کار می‌رود، ۱۵۲ گرم خاکستر می‌دهد. درصد نیکل در این خاکستر کدام است؟


پ) این روش برای استخراج کدام فلزها مفروض به صرفه نمی‌باشد؟

۱) ۲۰۰۰ - ۲۵ - روی و نیکل ۲) ۲۰۰ - ۲۵ - روی و مس ۳) ۲۰۰ - ۲۰ - روی و نیکل ۴) ۲۰۰ - ۲۰ - روی و مس

۱۷۰. دانشجویی مقدار ۴۰ گرم آهن (III) اکسید (Fe_2O_3) را با مقدار کافی کربن در شرایط مناسب وارد واکنش نموده است و مقدار ۳۶ گرم آهن را جداسازی کرده است. کدام یک از اتفاقات زیر می‌تواند باعث بروز این خطا شده باشد؟ (C = ۱۲ : g · mol⁻¹, O = ۱۶ : g · mol⁻¹)

۱) اشتباه در اندازه‌گیری با ترازو ۲) انجام واکنش‌های جانبی ۳) عدم انجام واکنش به طور کامل ۴) استفاده از واکنش‌دهنده ناخالص

۱۷۱. برای تولید ۱۲,۱ تن آهن مطابق واکنش زیر، تن آهن (III) اکسید با خلوص ۸۰ درصد و تن تیتانیم خالص مورد نیاز است. (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید). (C = ۱۲ : g · mol⁻¹, Fe = ۵۶, Ti = ۴۸, O = ۱۶ : g · mol⁻¹)




۱) ۵,۷۲ - ۲ ۲) ۱,۶ - ۰,۷۲ ۳) ۰,۲۴ - ۲ ۴) ۰,۲۴ - ۱,۶

۱۷۲. ۴۰ گرم از یک نمونه ناخالص آهن (III) اکسید دارای ۱۴ گرم آهن و ۵۰ گرم از یک نمونه ناخالص کلسیم کربنات دارای ۱۶ گرم کلسیم است. درصد خلوص آهن (III) اکسید و کلسیم کربنات در هر نمونه به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ (C = ۱۲ : g · mol⁻¹, Ca = ۴۰, O = ۱۶ : g · mol⁻¹)



۱) ۵۰ - ۸۰ ۲) ۸۰ - ۵۰ ۳) ۵۰ - ۵۰ ۴) ۸۰ - ۵۰

۱۷۳. از واکنش ۹ گرم فلز آهن با خلوص ۷۰ درصد با مقدار کافی محلول هیدروکلریک اسید، در شرایطی که چگالی گاز هیدروژن برابر ۰,۰۸ گرم بر لیتر است، به تقریب چند لیتر گاز هیدروژن به دست می‌آید؟ (H = ۱, Fe = ۵۶ : g · mol⁻¹)



۱) ۲,۸۱ ۲) ۳,۱ ۳) ۲,۷۱ ۴) ۳,۲

۱۷۴. اگر از تجزیه گرمایی ۷,۲۳ گرم پتانسیم پرمنگنات به میزان ۸۰ درصد، مطابق معادله موازنه نشده زیر، تفاوت جرم فراورده‌های جامد قلم چی-۱۳۹۸ به دست آمده برابر ۵,۵ گرم باشد، درصد خلوص پتانسیم پرمنگنات به تقریب کدام است؟



۱) ۳۳,۳ ۲) ۴۲,۷ ۳) ۶۶,۷ ۴) ۸۳,۳

۱۷۵. فرض کنید برای تولید فلز آهن از Fe_2O_3 ، از دو روش استفاده می‌کنیم. در روش اول ۴۰ گرم Fe_2O_3 را با کربن کافی واکنش داده و ۱۹,۶ گرم آهن تولید می‌شود. در روش دوم، ۱۰ گرم Fe_2O_3 را با کربن مونوکسید کافی واکنش داده و ۵,۲ گرم Fe تولید می‌شود. بازده درصدی کدام واکنش بیشتر است و در مجموع دو واکنش، چند لیتر گاز CO_2 در شرایط STP تولید می‌شود؟ (C = ۱۲ : g · mol⁻¹, O = ۱۶ : g · mol⁻¹)

۱) ۹ - واکنش دوم ۲) ۵,۸۸ - واکنش اول ۳) ۵,۸۸ - واکنش اول ۴) ۹ - واکنش اول

۱۷۶. اگر در واکنش تخمیر بی‌هوایی گلوکز پس از پایان یافتن واکنش جرم گاز تولید شده با جرم واکنش دهنده باشد، بازده درصدی واکنش تقریباً چند درصد است؟ ($H = 1, O = 16, C = 12 : g \cdot mol^{-1}$)
قلم چی- ۱۳۹۸




۸۵ [۴]

۳۴ [۲]

۶۷ [۲]

۹۲ [۱]

۱۷۷. در مجتمع فولاد مبارکه که مقداری سنگ معدن هماتیت (Fe_2O_3) را با کربن واکنش کامل می‌دهیم. اگر پس از پایان واکنش، جرم مخلوط اولیه ۴۴kg کاهش یابد، به تقریب چند کیلوگرم آهن تولید خواهد شد و گاز تولید شده در این واکنش چنانچه در شرایط STP قرار داده شود چه حجمی پیدا کند؟ ($Fe = 56, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$)
قلم چی- ۱۳۹۸




۲۲۴L - ۵۶۰kg [۴]

۲۲۴۰L - ۷۴,۶۷kg [۲]

۲۲۴۰L - ۵۶۰kg [۲]

۲۲۴L - ۷۴,۶۷kg [۱]

۱۷۸. مقداری پتانسیم نیترات (KNO_3) را مطابق واکنش زیر در یک ظرف سر باز به‌طور کامل تجزیه می‌کنیم. اگر جرم جامد باقی مانده در ظرف و حجم گاز تولید شده در شرایط STP به ترتیب برابر با ۵۲,۵ گرم و ۶,۵ لیتر باشد، جرم اولیه پتانسیم نیترات و درصد خلوص آن به تقریب در کدام گزینه آمده است؟ (ناخالصی‌ها در واکنش بی‌اثر هستند، گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید). ($K = ۳۹, O = 16, N = ۱۴ : g \cdot mol^{-1}$)
قلم چی- ۱۳۹۸




۷۳,۵ - ۵۰,۵ [۴]

۷۳,۵ - ۶۰,۵ [۲]

۸۳,۵ - ۵۰,۵ [۲]

۸۳,۵ - ۶۰,۵ [۱]

۱۷۹. اگر بخواهیم از گاز آزاد شده در واکنش (I) برای آزادسازی نافلز در واکنش (II)، ۲۰ گرم نافلز با خلوص ۸۰% به‌دست‌آورده باشیم، جرم کل MnO_2 واردشده در واکنش (I) تقریباً چند گرم است؟ (بازده هر واکنش را ۶۰ درصد درنظر بگیرید) ($Br = ۸۰, Mn = ۵۵, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$)
قلم چی- ۱۳۹۸



۲۴,۱۷ [۴]

۱۹,۳۴ [۲]


۸,۷ [۲]

۱۴,۵ [۱]

۱۸۰

برای تهیه سوخت سبز، از واکنش تخمیر بی‌هوایی گلوکز استفاده می‌کنند. اگر بخشی از گلوکز مورد استفاده در این تخمیر، دچار اکسایش هوایی شده باشد و مجموعاً ۷۳۶ کیلوگرم آب به‌دست آمده باشد، بازده درصدی واکنش تهیه سوخت سبز چقدر است؟
قلم چی- ۱۳۹۸

$$(C=12, O=16, H=1 : g/mol)$$



۸۸,۸۸ [۴]

۸۰ [۲]

۷۵ [۲]

۶۰ [۱]

۱۸۱. طبق واکنش موازن نشده زیر، از تجزیه ۲۸۵ گرم آلومینیم سولفات با خلوص ۷۵ درصد، پس از پایان واکنش، جرم ماده جامد موجود در ظرف گرم بوده و لیتر گاز در شرایط استاندارد تولید می‌شود. (بازده درصدی واکنش را ۸۰% در نظر بگیرید) ($O = 16, S = ۳۲, Al = ۲۷ : g \cdot mol^{-1}$)
قلم چی- ۱۳۹۸



۶۶,۳ - ۵۱ [۴]


۳۳,۶ - ۵۱ [۲]

۶۶,۳ - ۱۶۵ [۲]

۳۳,۶ - ۱۶۵ [۱]

۱۸۲ . ۹۲ گرم Li_2O_2 با خلوص ۷۵ درصد و ۱۲۵ گرم $LiOH$ ناخالص هر دو با مقدار کافی کربن دی اکسید واکنش داده و مقدار برابر لیتیم کربنات (Li_2CO_3) تولید می کنند. درصد خلوص $LiOH$ تقریباً کدام است؟ (بازده واکنش I را ۱۰۰ درصد واکنش II را ۶۰ درصد در نظر بگیرید.)
 قلم چی- ۱۳۹۸

$$(Li = 7, O = 16, H = 1, C = 12 : g \cdot mol^{-1})$$



۴۷,۵ [۴]

۳۷ [۳]

۳۴,۵ [۲]

۴۳ [۱]

۱۸۳ . در آزمایشگاه برای تولید گاز کلر، منگنز دی اکسید و هیدروکلریک اسید را طبق واکنش موافق نشده زیر با یکدیگر واکنش می دهند. اگر از واکنش کامل ۱۰۰g MnO_2 با درصد خلوص ۸۷٪ و x میلی لیتر HCl با غلظت ۸٪ مول بر لیتر، y لیتر گاز در شرایط STP تولید شود، در شرایطی که بازدهی واکنش ۷۵ درصد باشد، x و y به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟
 قلم چی- ۱۳۹۸



۱۶,۸ - ۲۵۰۰ [۴]

۲۲,۴ - ۵۰۰۰ [۳]

۱۶,۸ - ۵۰۰۰ [۲]

۲۲,۴ - ۲۵۰۰ [۱]

۱۸۴ . پتانسیم نیترات در دمای بالای $50^{\circ}C$ مطابق معادله موافق نشده زیر تجزیه می شود. از تجزیه ۸۰,۸ گرم پتانسیم نیترات با خلوص ۸۷٪ درصد، چند گرم گاز تولید می شود؟ (بازده درصدی واکنش را ۷۵ درصد در نظر بگیرید).
 قلم چی- ۱۳۹۸

$$(KNO_3(s) \rightarrow K_2O(s) + N_2(g) + O_2(g)) \quad (K = 39, N = 14, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$


۲۵,۹۲ [۴]

۱۹,۴۴ [۳]

۲۸,۸ [۲]

۵۷,۶ [۱]

۱۸۵ . در واکنش‌های زیر جرم‌های یکسانی از N_2 و O_2 ناخالص مصرف و جرم‌های یکسانی از فرآورده‌ها تولید می شود. درصد خلوص O_2 حدوداً چند برابر درصد خلوص N_2 است؟ (در هر دو واکنش، H_2 به مقدار کافی وجود دارد).
 قلم چی- ۱۳۹۸

$$(H = 1, N = 14, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$


۱,۰۸ [۴]

۱,۲۶ [۳]

۰,۵۲ [۲]

۰,۸۵ [۱]

۱۸۶ . از تخمیر بی‌هوایی گلوكز ۲۲۰ گرم گاز کربن دی اکسید و مقداری سوخت سبز به دست آمده است. برای تهیه همین مقدار ماده سوختی، چند گرم اتن در دمای ۵۰ درصد خالص را باید با آب واکنش داد؟ (بازده واکنش اتن با آب ۵۰ درصد است).
 قلم چی- ۱۳۹۸

$$(C = 12, O = 16, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$$

۲۲۴ [۴]

۸۷,۵ [۳]

۳۵۰ [۲]

۵۶ [۱]

۱۸۷ . در یک پاک‌کننده صابونی جامد با زنجیره هیدروکربن سیر شده، درصد جرمی کربن، $\frac{45}{8}$ برابر درصد جرمی اکسیژن است. اگر تعداد اتم‌های هیدروژن در این پاک‌کننده برابر با تعداد اتم‌های هیدروژن در یک پاک‌کننده غیر صابونی با فرمول $RC_6H_4SO_3Na$ باشد، درصد جرمی اتن گوگرد در این پاک‌کننده غیر صابونی به تقریب کدام است؟ (R را زنجیره هیدروکربنی سیرشده در نظر بگیرید).
 قلم چی- ۱۳۹۹

$$(C = 12, H = 1, O = 16, S = 32, Na = 23 : g \cdot mol^{-1})$$


۷,۶ [۴]

۱۰,۲ [۳]

۹,۲ [۲]

۸,۸ [۱]

۱۸۸ . اگر جرم اکسیژن آزادشده در واکنش اول، شش برابر جرم اکسیژن آزاد شده در واکنش دوم باشد، به ازای تجزیه ۱۲۱,۲ گرم پتانسیم نیترات با خلوص ۶۰٪، چند گرم KCl در واکنش دوم تولید می شود؟ ($K = 39, Cl = 35, N = 14, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$) (ناخالصی‌ها وارد واکنش نمی شود).




۲,۹۸ [۴]

۵۳,۶۴ [۳]

۳,۹۴ [۲]

۴,۹۷ [۱]

۱۸۹. مخلوطی از سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروژن کربنات ($KHCO_3$) را مطابق با واکنش‌های زیر گرما می‌دهیم تا تجزیه شوند. اگر $1\text{ g}\cdot mol^{-1}$ گرم بخار آب و $3,52\text{ g}$ کربن دی‌اکسید در این دو واکنش تولید شده باشد، حدوداً چند درصد جرمی از مخلوط اولیه را سدیم هیدروکسید تشکیل می‌دهد؟
قلم‌چی-۱۳۹۹



۶۶,۷


۷۱,۴

۷۵,۶

۸۲,۵

۱۹۰. استرها مطابق واکنش زیر به کربوکسیلیک اسیدها و الکل‌ها تبدیل می‌شوند. اگر تعداد اتم‌های کربن زنجیر هیدروکربنی یک صابون جامد برابر تعداد اتم‌های کربن کربوکسیلیک اسید حاصل از استر A و تعداد اتم‌های کربن زنجیر هیدروکربنی یک پاک‌کننده غیرصابونی برابر تعداد اتم‌های کربن الکل حاصل از استر A باشد، تفاوت جرم مولی این دو پاک‌کننده چند گرم بر مول است؟ (کاتیون سازنده دو پاک‌کننده Na^+ در نظر بگیرید).
قلم‌چی-۱۳۹۹

$$(C = 12, H = 1, S = 32, O = 16, Na = 23 : g \cdot mol^{-1})$$






۱۵۷

۱۶۱

۱۲۲

۱۲۶

۱۹۱. برای تولید آهن از دو واکنشگاه مطابق شکل استفاده می‌شود. $144\text{ g} FeO$ و $320\text{ g} Fe_2O_3$ را به ترتیب وارد واکنشگاه‌های (۱) و (۲) می‌کنیم تا به طور جداگانه مطابق واکنش‌های داده شده به ترتیب با سدیم (Na) و کربن (C) واکنش دهند. کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ مول گاز خروجی و بازده درصدی واکنشگاه (۱) و (۲) را به درستی معلوم کرده است؟ (O = 16, Na = 23, Fe = 56 : g · mol⁻¹)
قلم‌چی-۱۳۹۹



۲۵% - ۷۵% - ۰,۲۵mol


۷۵% - ۷۵% - ۰,۲۵mol

۲۵% - ۲۵% - ۰,۷۵mol

۲۵% - ۷۵% - ۰,۷۵mol

۱۹۲. حجم گاز CO_2 حاصل از واکنش 250 g کلسیم کربنات ناخالص با مقدار کافی محلول هیدروکلریک اسید با حجم گاز CO_2 حاصل از سوختن کامل 32 g گاز متان برابر است. درصد خلوص کلسیم کربنات برابر با کدام است؟ (واکنش‌ها در شرایط STP انجام می‌شوند و ناخالصی‌ها در واکنش شرکت نمی‌کنند).
قلم‌چی-۱۳۹۹

$$(H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40 : g \cdot mol^{-1})$$





۴۰

۸۵

۸۰

۷۵

۱۹۳. هرگاه نسبت جرم فلز آهن تولیدشده در واکنش «I» به جرم فلز آهن تولیدشده در واکنش «II» برابر با ۸ بوده و در واکنش «I» مقدار 336 g گرم CO با مقدار کافی Fe_2O_3 به طور کامل واکنش داده باشد، جرم آلومینیم مصرف شده در واکنش «II» بر حسب گرم برابر با کدام است؟ (O = 16, Al = 27, Fe = 56 : g · mol⁻¹)
قلم‌چی-۱۳۹۹



۸۱

۵۴

۲۷

۱۳,۵

۱۹۴. از واکنش کامل m گرم فلز آلومینیم با مقدار کافی هیدروکلریک اسید، مقدار $89,6$ لیتر گاز H_2 در شرایط STP تولید شده است. از واکنش کامل همین مقدار فلز آلومینیم با مقدار کافی Fe_2O_3 ، به تقریب چند گرم فلز آهن تولید می‌شود؟ ($Al = 27, Fe = 56 : g \cdot mol^{-1}$) قلم چی-۱۳۹۹

$$2Al(s) + 6HCl(aq) \rightarrow 2AlCl_4(aq) + 3H_2(g)$$

$$2Al(s) + Fe_2O_3(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 2Fe(l)$$




۷۴,۶۶ [۴]

۱۰۸,۶۶ [۳]

۱۴۹,۳۳ [۲]

۵۴,۳۳ [۱]

۱۹۵. واکنش‌های زیر به صورت پی‌درپی در کیسه‌های خودرو انجام می‌شوند. برای آنکه $100,8$ لیتر گاز N_2 با چگالی $9g \cdot L^{-1}$ کیسه‌های را پر کند به چند گرم سدیم آزید (NaN_3) با خلوص 90% لازم است و چند گرم $NaHCO_3$ تولید می‌شود؟ (بازده درصدی هر سه واکنش را 100% در نظر بگیرید). ($Na = 23, N = 14, H = 1, C = 12, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$) قلم چی-۱۳۹۹




۱۴۴,۸۱, ۱۶۵ [۴]

۱۴۴,۸۱, ۱۵۶ [۳]

۱۸۱,۴۴, ۱۶۵ [۲]

۱۸۱,۴۴, ۱۵۶ [۱]

۱۹۶. از واکنش 200 تن سنگ معدن آهن با مقدار کافی کربن، 84 تن آهن تولید شده است. در صورتی که بازده درصدی واکنش برابر 75 درصد باشد، درصد خلوص سنگ معدن آهن کدام است؟ ($Fe = 56, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$) قلم چی-۱۳۹۹





۷۵ [۴]

۸۰ [۳]

۸۵ [۲]

۹۰ [۱]

۱۹۷. 112 گرم تیغه آهنی که دارای 5% ناخالصی است را با مقدار کافی هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهیم. اگر در پایان واکنش 16 لیتر گاز هیدروژن با چگالی 19 گرم بر لیتر تولید شود، بازده درصدی این واکنش برابر با کدام است؟ (ناخالصی‌ها در واکنش شرکت نمی‌کنند). قلم چی-۱۳۹۹






۸۵ [۴]

۷۰ [۳]

۷۶ [۲]

۸۰ [۱]

۱۹۸. 560 گرم گاز N_2 ناخالص مطابق معادله‌های موازن‌شده واکنش‌های زیر در نهایت 736 گرم اکسید قهوه‌ای رنگ تولید می‌کند؛ اگر بازده واکنش اول برابر 100 درصد و بازده واکنش دوم برابر 50 درصد باشد، درصد خلوص گاز نیتروژن وارد شده در واکنش اول برابر با کدام است؟ قلم چی-۱۳۹۹






۶۰ [۴]

۵۰ [۳]

۸۰ [۲]

۷۰ [۱]

۱۹۹. اگر مطابق معادله‌های واکنش‌های زیر طی تجزیه همزمان نیتروگلیسیرین مایع و سدیم آزید (NaN_3) در مجموع 8 گرم گاز اکسیژن و 112 گرم گاز نیتروژن حاصل شود، چند مول فراورده جامد در نهایت تولید شده است؟ (واکنش‌ها موازن نشده‌اند). قلم چی-۱۳۹۹



۴ [۴]

۴ [۳]

۵ [۲]

۳ [۱]

قلم چی-۱۳۹۶

۲۰۰. اگر در اتم فرضی، پس از گرفتن 3 الکترون، تعداد الکترون‌ها نصف عدد جرمی شود، تفاوت نوترون و پروتون چه قدر است؟ قلم چی-۱۳۹۶

۵ [۴]

۸ [۳]

۶ [۲]

۳ [۱]

قلم چی-۱۳۹۶

۲۰۱. در دو گونه‌ی X^{3+} و Y^{2-} تعداد الکترون‌ها با هم و تعداد نوترون‌ها نیز با هم برابر هستند. عدد جرمی X چه قدر است؟ قلم چی-۱۳۹۶

۲۹ [۴]

۳۶ [۳]

۳۷ [۲]

۳۹ [۱]

قلم چی-۱۳۹۶

۲۰۲. یون X^{3-} دارای m الکترون و $6 + m$ نوترون می‌باشد، چند مورد از اتم‌های زیر می‌توانند ایزوتوپ اتم X باشد؟

$${}_{m-3}^{2m+6}F, {}_{m-3}^{2m}E, {}_{m-3}^{2m}D, {}_{m-3}^{2m+3}C, {}_{m-3}^{2m+6}B, {}_{m-3}^{2m+3}A$$

۴ [۴]

۳ [۳]

۲ [۲]

۱ [۱]

۲۰۳. اگر نسبت شمار نوترون‌ها به الکترون‌ها در اتم خنثی از عنصری برابر $\frac{\Lambda}{\gamma}$ باشد و از طرفی اختلاف شمار پروتون‌ها و نوترون‌ها برابر ۵ باشد،

قلم چی-۱۳۹۶

خواص شیمیایی این عنصر با کدام عنصر مشابه است؟

${}_6^1C$	${}_7^1N$	${}_8^1O$	${}_9^1F$
${}_{14}^1Si$	${}_{15}^1P$	${}_{16}^1S$	${}_{17}^1Cl$
${}_{32}^{74}Ge$	${}_{33}^{74}As$	${}_{34}^{74}Se$	${}_{35}^{75}Br$
${}_{50}^{110}Sn$	${}_{51}^{111}Sb$	${}_{52}^{112}Te$	${}_{53}^{113}I$

۴ [۴]

۳ [۳]

۲ [۲]

۱ [۱]

قلم چی-۱۳۹۶

۲۰۴. اگر تعداد الکترون‌های ${}_{n-2}^{m+1}X^{3+}$ برابر تعداد نوترون‌های ${}_{2n+2}^{m+1}Y^{-}$ باشد، تعداد نوترون‌های Z را تعیین کنید.

۱۱ [۴]

۷ [۳]

۲ [۲]

۱۰ [۱]

۲۰۵. مجموع تعداد ذرات زیر اتمی در یک گونه برابر با ۴۹ می‌باشد. اگر تفاوت تعداد پروتون‌ها و نوترون‌های آن یک واحد و تفاوت تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها در آن دو واحد باشد، می‌توان گفت که یون پایدار این گونه فرضی به صورت بوده و در ساختار خود دارای نوترون می‌باشد.

قلم چی-۱۳۹۷

 ۱۶ و X^{3-} [۴]

 ۱۷ و X^{3-} [۳]

 ۱۶ و X^+ [۲]

 ۱۷ و X^+ [۱]

۲۰۶. تعداد الکترون‌های موجود در ${}_{14}^{35}Al$ از یون پایدار ${}_{13}^{36}Al^{3+}$ به تقریب با تعداد الکترون‌های موجود در چند گرم یون پایدار ${}_{15}^{37}P^{3-}$ برابر است؟ ($P = ۳۱, Al = ۲۷ : g \cdot mol^{-1}$)

قلم چی-۱۳۹۷

۴,۶۵ [۴]





۳,۴۴ [۳]

۸,۲۷ [۲]

۵,۳۷ [۱]

۲۰۷. در ۱۲۶ گرم از یک هیدروکربن پایدار، تعداد $10^{۲۴} \times ۱۶,۲۵۴$ اتم از آن ترکیب وجود دارد. کدام یک از ساختارهای زیر می‌تواند متعلق به این ترکیب آلتی باشد؟ ($C = ۱۲, H = ۱ : g \cdot mol^{-1}$)

قلم چی-۱۳۹۹



۲۰۸. عنصری دارای ۲ ایزوتوپ X^A و X^{A+2} است. اگر تعداد نوترون‌های A^-X^A با تعداد نوترون‌های آن برابر باشد و درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین تر برابر $۳۷/۵$ درصد باشد و جرم اتمی میانگین این عنصر $۳۵,۷۵$ باشد، عدد اتمی این عنصر کدام است؟

قلم چی-۱۳۹۹

۱۸ [۴]

۱۵ [۳]

۱۶ [۲]

۱۷ [۱]

۲۰۹. اگر مجموع تعداد ذرات باردار یون ${}_{n-3}^{3m+6}A^+$ ، ${}_{n-2}^{3m+6}B^{2-}$ باشد، تعداد نوترون‌های یون ${}_{n-2}^{6m+3}C^+$ کدام است؟

قلم چی-۱۳۹۷

۱۱ [۴]

۷ [۳]

۱۲ [۲]

۶ [۱]

۲۱۰. از سوختن کامل $3,6$ گرم از چند نوع آلkan متفاوت، $9,45$ گرم بخار آب تولید می‌شود؟ ($C = 12, O = 16, H = 1 : g \cdot mol^{-1}$)

قلم چی - ۱۳۹۷

۵ [۴]

۴ [۳]

۳ [۲]

۱ [۱]

۲۱۱. اگر در مولکول اتان، هیدروژن‌های یکی از کربن‌ها را با گروه‌های متیل و هیدروژن‌های کربن دیگر را با گروه‌های اتیل جایگزین کنیم، چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد ترکیب حاصل نادرست است؟

$(O = 16, C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$

آ) اختلاف درصد جرمی کربن و هیدروژن در این ترکیب تقریباً برابر $69,24$ می‌باشد.

ب) در این ترکیب چهار اتم کربن وجود دارد که با هیچ اتم هیدروژنی، الکترون به اشتراک نگذاشته است.

پ) نام ترکیب «۲،۲-دی متیل - ۳،۳-دی اتیل پنتان» می‌باشد.

ت) از سوختن کامل $23,4$ گرم از این ترکیب، به ترتیب $32,4$ گرم آب و تقریباً 47 لیتر گاز کربن دی‌اکسید در شرایط استاندارد تولید می‌شود.

۱ [۴]

۴ [۳]

۳ [۲]

۲ [۱]

۲۱۲. نسبت شمار H به C در آلkanی برابر $2,4$ می‌باشد. چند مورد از مطالب زیر درباره آن درست است؟

$(C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$

* این آلkan در دمای اتاق به حالت گازی می‌باشد.

* نقطه جوش آن از نقطه جوش بوتان کمتر است.

* تفاوت جرم مولی آن با جرم مولی ساده‌ترین آلkan برابر 42 می‌باشد.

* شمار اتم‌های هیدروژن در آن دو برابر شمار اتم‌های هیدروژن در اتان می‌باشد.

۱ [۴]

۲ [۳]

۳ [۲]

۴ [۱]

۲۱۳. چند مورد از مطالب زیر درست‌اند؟

قلم چی - ۱۳۹۷

* پروپین دومین عضو خانواده آلکین‌هاست که نسبت شمار اتم‌های H به C در آن برابر $75,0$ می‌باشد.

* در جوشکاری کاربیدی از سوختن گاز اتین، دمای لازم برای جوش دادن قطعه‌های فلزی تأمین می‌شود.

* نسبت شمار اتم‌های هیدروژن به کربن در سیکلوهگزان و پروپن یکسان است.

* شمار پیوندهای دوگانه در نفتالن دو برابر شمار پیوندهای دوگانه در بنزن می‌باشد.

* شمار اتم‌های کربن در نفتالن با شمار اتم‌های H در بوتان برابر است.

۲ [۴]

۳ [۳]

۴ [۲]

۵ [۱]

۲۱۴. از واکنش یک مول آلانکن با برم کافی، 216 گرم ترکیب سیرشده حاصل شده است. فرمول این آلانکن کدام است و در این آلانکن نسبت شمار اتم‌های

هیدروژن به شمار جفت الکترون‌های پیوندی آن کدام می‌باشد؟

$(C = 12, H = 1, Br = 80 : g \cdot mol^{-1})$

$\frac{3}{2} - C_F H_A$ [۴]

$\frac{2}{3} - C_F H_A$ [۳]

$\frac{3}{2} - C_3 H_2$ [۲]

$\frac{2}{3} - C_3 H_2$ [۱]

۲۱۵. در صورتی که آلkan A جرم مولی برابر $142 g \cdot mol^{-1}$ و آلkan B فرمول مولکولی $C_{15}H_{32}$ داشته باشد کدام مطلب درست است؟

قلم چی - ۱۳۹۷

$(H = 1, C = 12 : g \cdot mol^{-1})$

[۱] دمای جوش A پایین‌تر و در شرایط یکسان گاز حاصل از آن آسان‌تر از گاز B به مایع تبدیل می‌شود.


[۲] نسبت تعداد کربن‌های ترکیب A به ترکیب B برابر $\frac{5}{3}$ و تعداد هیدروژن‌های ترکیب B به ترکیب A برابر $\frac{11}{10}$ است.

[۳] آلkan A نسبت به B فرارتر بوده و جاذبه بین مولکولی آن قوی‌تر است.

[۴] نسبت تعداد هیدروژن‌های ترکیب B به ترکیب A برابر $\frac{16}{11}$ و دمای جوش B بالاتر است.

قلم چی-۱۳۹۷

۲۱۶. چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد بنزن و نفتالن درست می‌باشد؟ ($C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1}$)

الف) فرمول ساختاری نقطه – خط نفتالن به صورت  می‌باشد.

ب) تفاوت جرم مولی بنزن و نفتالن ۵۰ گرم می‌باشد.

ج) تعداد جفت الکترون‌های پیوندی در بنزن ۹ تا کمتر از نفتالن می‌باشد.

د) بنزن و نفتالن هر دو از ترکیب‌های هیدروکربنی سیر نشده و آروماتیک می‌باشند.

۱ [۴]

۲ [۳]

۳ [۲]

۴ [۱]

۲۱۷. اگر تفاوت تعداد نوترон و پروتون در گونه A^{3+}_{25} ، نصف این تفاوت در گونه B^{-}_{35} باشد و تفاوت تعداد الکترون‌ها در این دو یون، یکی کمتر از تفاوت تعداد نوترون‌ها در دو گونه A و B باشد، مجموع تعداد نوترون‌ها در گونه A و B کدام است؟

۷۵ [۴]

۴۵ [۳]

۶۰ [۲]

۳۰ [۱]

۲۱۸. در گونه M^{4+}_{2x-6} تفاوت تعداد نوترون‌ها و نصف الکترون‌های آن برابر ۲۶ است و تعداد پروتون‌ها ۸۰ درصد تعداد نوترون‌ها می‌باشد. x چند است؟

۲۹ [۴]

۴۴ [۳]

۳۶ [۲]

۳۹ [۱]

۲۱۹. مخلوطی به جرم ۳۳ گرم از اتان و پنتان را در مقدار کافی اکسیژن می‌سوزانیم تا کربن دی‌اکسید و بخار آب حاصل شود. اگر تعداد مول‌های بخار آب تولید شده، $\frac{4}{3}$ تعداد مول‌های کربن دی‌اکسید تولید شده باشد، چند گرم از مخلوط اولیه را پنتان تشکیل می‌دهد؟

$(C = 12, O = 16, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$

۱۵ [۴]

۱۸ [۳]

۲۱ [۲]

۱۲ [۱]

۲۲۰. از واکنش ۲۲,۴ گرم از یک آلکن با آب در حضور H_2SO_4 ، مقدار ۲۹,۶ گرم از یک ترکیب اکسیژن‌دار تولید شده است. اگر بازده درصدی این واکنش ۱۰۰ فرض شود، در هر مولکول از این آلکن چند اتم وجود دارد؟

$(H = 1, C = 12, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$

۹ [۴]

۱۵ [۳]

۱۲ [۲]

۶ [۱]

۲۲۱. تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن و کربن در آلکان A دو برابر نسبت شمار اتم‌های هیدروژن به کربن در آلکان B می‌باشد. اگر جرم مولی B ۱۴ گرم برمول بیشتر از جرم مولی A باشد، عبارت کدام گزینه نادرست است؟

۱ هر دو آلکان A و B در دمای اتاق به حالت گازی‌اند.

۲ از سوختن یک مول از آلکان A در شرایط STP ، ۷ مول گاز تولید می‌شود.

۳ نقطه‌جوش آلکان B از نقطه‌جوش آلکان A بیشتر است.

۲۲۲. مخلوطی به جرم ۶۷ گرم از اتان و استیلن را در اختیار داریم. به این مخلوط به مقدار کافی گازهیدروژن اضافه می‌کنیم تا تمام مخلوط به طور کامل سیر شود. اگر در پایان ۷۵ گرم ماده سیرشده در ظرف وجود داشته باشد، به تقریب چند درصد از جرم مخلوط اولیه استیلن بوده است؟

$(C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$

۶۷,۱۷ [۴]


۷۷,۶۱ [۳]

۷۲,۲۱ [۲]

۸۱,۱۹ [۱]

۲۲۳. کدام یک از مقایسه‌های زیر در مورد هیدروکربن‌های بنزن، نفتالن و سیکلوهگزان صحیح می‌باشد؟ ($C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1}$)

۱ دو مورد از آن‌ها سیر نشده و آروماتیک بوده و یک مورد سیرشده می‌باشد.




۲ فرمول نقطه – خط نفتالن به صورت رو به رو می‌باشد.

۳ برای افزودن ۳ مول اتم هیدروژن به یک مول بنزن می‌توان به یک مول سیکلوهگزان دست یافت.

۴ درصد جرمی کربن در بنزن بیشتر از این مقدار در دو ترکیب دیگر است.

۲۲۴. درصد جرمی کربن در آلکانی برابر ۸۰ می‌باشد. برای جذب CO_2 حاصل از سوختن کامل ۸,۰ مول از این آلکان چند گرم منیزیم اکسید لازم است؟ (H = ۱, C = ۱۲, O = ۱۶, Mg = ۲۴ : g · mol^{-۱})



۳۲ [۴]

۶۴ [۳]

۴۰ [۲]

۳۶ [۱]

۲۲۵. نسبت شمار اتم‌های H به C در فرمول مولکولی آلکانی برابر ۲,۴ است. کدام مورد از مطالب زیر در مورد این آلکان درست‌اند؟ (H = ۱, C = ۱۲ : g · mol^{-۱})

آ) در بین آلکان‌های راست‌زنگیر مایع کمترین نقطه جوش را دارد.

ب) برای آن می‌توان دو ساختار متفاوت دارای یک شاخهٔ فرعی متیل رسم کرد.

پ) تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن آن با اتم‌های هیدروژن نفتالن برابر ۲ است.

ت) از سوختن کامل ۱,۰ مول از این آلکان، ۱۱,۲ لیتر گاز CO_2 در شرایط STP تولید می‌شود.

ث) تفاوت جرم مولی آن با ساده‌ترین آلکان برابر ۵۶ گرم است.

(آ), (ت), (ث) [۴]

(ب), (پ), (ت), (ث) [۳]

[۲]

(آ), (ت), (ث) [۱]

۲۲۶. اتم خنثی X، در مجموع ۲۳۱ ذره بنیادی دارد. با فرض این‌که شمار نوترون‌های آن ۳۰ درصد بیشتر از شمار پروتون‌هایش باشد، چند مورد از مطالب زیر در ارتباط با اتم X نادرست هستند؟

الف) تفاضل شمار پروتون‌ها از نوترون‌ها برابر با ۲۱ می‌باشد.

ب) عدد جرمی اتم X, ۲,۳ برابر عدد اتمی آن است.

پ) در یون XH_4^+ تعداد کل الکترون‌ها ۱۸ واحد کمتر از تعداد کل نوترون‌ها است. (H¹ را در نظر بگیرید).

ت) در صورتی که عدد جرمی یون A^{3+} با عدد جرمی اتم X^{3x+5} برابر باشد، آن‌گاه مجموع شمار پروتون‌های اتم X و شمار نوترون‌های یون A برابر است.

۴ [۴]

۲ [۳]

[۲]

۳ [۱]

۲۲۷. در اتم عنصر A، نسبت شمار پروتون به نوترون برابر با ۸,۰ و شمار الکترون‌های A^{3+} چهار واحد بیشتر از شمار نوترون‌های اتم عنصر B_۷ است، نسبت عدد جرمی A به عدد جرمی B برابر با کدام است؟

۱,۳ [۴]

۱,۵ [۳]

[۲]

۱,۸ [۱]

۲۲۸. در واکنش سوختن کامل آلکانی در شرایط STP, $2L$, ۱۷۹,۲ g گاز اکسیژن مورد استفاده قرار گرفته است. فرمول شیمیایی هیدروکربن موردنظر کدام است؟ (H = ۱, C = ۱۲, O = ۱۶ : g · mol^{-۱})

C_6H_{14} [۴]

C_7H_8 [۳]

C_6H_{10} [۲]

C_5H_{12} [۱]

۲۲۹. در مخلوطی از سیکلوهگزان و هپتان، درصد جرمی اتم‌های کربن ۸۵٪ است. اگر این دو هیدروکربن را به‌طور کامل بسوزانیم، جرم کربن دی‌اکسید تولیدشده در فرآیند سوختن هپتان، چند برابر جرم بخار آب تولیدشده در فرآیند سوختن سیکلوهگزان است؟ (O = ۱۶, C = ۱۲, H = ۱ : g · mol^{-۱})

۱,۴۲ [۴]

۰,۷ [۳]

[۲]

۱,۱۱ [۱]

۲۳۰. نسبت تعداد اتم‌های H به تعداد اتم‌های C در هر مولکول سیکلوهگزان، با نسبت بیان شده در کدام گزینه برابر است؟

۱) نسبت تعداد اتم‌های H به در اтанول

۲) نسبت تعداد اتم‌های H به تعداد اتم‌های Br در هر مولکول ۱,۲ – دی‌برمواتان

۳) نسبت تعداد اتم‌های C به تعداد اتم‌های H در دومین عضو خانواده آلکین‌ها

۴) نسبت تعداد اتم‌های C در هر مولکول نفتالن به تعداد اتم‌های C در هر مولکول بنزن

۲۳۱. مخلوطی به جرم ۳۰ گرم از پروپان و پروپین در ظرفی وجود دارد. اگر این مخلوط با ۹,۶ لیتر گاز هیدروژن به طور کامل واکنش دهد، در مخلوط اویله نسبت مقدار مول‌های گاز واکنش‌پذیرتر به گاز دیگر برابر با کدام است؟ (حجم مولی گازها در شرایط آزمایش را ۲۴ لیتر بر مول فرض کنید و قلم‌چی-۱۳۹۹)

$$(C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$$

۵,۷۵ [۴]

۱,۵ [۳]

۲,۵ [۲]

۰,۴ [۱]

۲۳۲. اگر اتم نافلز تشکیل‌دهنده یک ترکیب یونی دارای سه الکترون در آخرین زیرلایه خود باشد و به‌ازای تشکیل یک مول از این ترکیب، شش مول الکترون میان یون‌ها مبادله شود، در یک واحد فرمولی از این ترکیب، چند اتم وجود دارد و اگر عنصر فلزی سازنده آن با عنصری با عدد اتمی ۲۵ هم‌دوره باشد و متعلق به دسته d نباشد، عدد اتمی آن کدام است؟ (قلم‌چی-۱۳۹۹)

۱۲ - ۵ [۴]

۲۰ - ۶ [۳]

۱۲ - ۶ [۲]

۲۰ - ۵ [۱]

۲۳۳. جرم مولی آلکن A ، ۷,۰ برابر جرم مولی آلکن B است. اگر تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن آلکان B و آلکان A به اندازه یک واحد بیشتر از تعداد اتم‌های کربن آلکن A باشد، از سوختن کامل یک مول آلکان B ، چند مول فراورده تولید می‌شود؟ (قلم‌چی-۱۳۹۹)

$$(C = 12, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$$

۱۷ [۴]

۱۵ [۳]

۹ [۲]

۱۱ [۱]

۲۳۴. نسبت شمار اتم‌های H به C در فرمول مولکولی آلکانی برابر ۲,۴ است. کدام موارد از مطالب زیر در مورد این آلکان درست‌اند؟ (قلم‌چی-۱۳۹۹)

$$(H = 1, C = 12 : g \cdot mol^{-1})$$

آ) در بین آلکان‌های راست‌زنگیر مایع، کم‌ترین نقطه جوش را دارد.

ب) برای آن می‌توان دو ساختار متفاوت دارای یک شاخهٔ فرعی متیل رسم کرد.

پ) تفاوت شمار اتم‌های هیدروژن آن با اتم‌های هیدروژن نفتالن برابر ۲ است.

ت) از سوختن کامل ۱,۰ مول از این آلکان، ۱۱,۲ لیتر گاز CO_2 در شرایط STP تولید می‌شود.

ث) تفاوت جرم مولی آن با نخستین عضو خانوادهٔ آلکان‌ها برابر ۶ گرم است.

(آ)، (ت)، (ث) [۴]

(ب)، (پ)، (ت)، (ث) [۳]

(آ)، (ت)، (ث) [۲]

(آ)، (ت)، (ث) [۱]

۲۳۵. ۱۰۰ گرم از رادیوایزوتوپ فرضی A که نیم‌عمرش ۲ سال است را در اختیار داریم. پس از گذشت چند سال، مقدار این رادیوایزوتوپ به ۱۲,۵ گرم می‌رسد؟ (قلم‌چی-۱۳۹۶)

۶ [۴]

۵ [۳]

۳ [۲]

۸ [۱]

۲۳۶. طیف سنج جرمی دستگاهی است که به کمک آن می‌توان به جرم مولی دقیق یک ترکیب پی برد. بدین صورت که این دستگاه به ازای وجود هر ترکیب با جرم مولی مشخص و منحصر به فرد، یک داده به ما می‌دهد. حال اگر بدانیم نیتروژن تنها از دو ایزوتوپ پایدار با جرم‌های اتمی ۱۴ و ۱۵ (amu) هیدروژن از ۳ ایزوتوپ پایدار با جرم‌های اتمی ۱۰,۳ و ۱ (amu) تشکیل شده‌اند، از قرار دادن یک نمونه حاوی مولکول‌های آمونیاک در دستگاه طیف سنج جرمی، حداقل چند نوع داده‌ی مختلف می‌توان از دستگاه گرفت؟ (قلم‌چی-۱۳۹۶)

۱۷ [۴]

۱۸ [۳]

۷ [۲]

۸ [۱]

۲۳۷. مقدار انرژی آزاد شده از واکنش هسته‌ای که میزان کاهش جرم، طی آن به اندازه جرم اتم ناپایدارترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن است، چند ثول می‌باشد؟ (سرعت نور در $\lambda = ۳ \times 10^{-۳} \text{ m}$ و جرم هر پروتون و نوترون را معادل $1.66 \times 10^{-۲۴} \text{ g}$ در نظر بگیرید). (قلم‌چی-۱۳۹۷)

1.694×10^{-۱۶} [۴]

4.482×10^{-۱۱} [۳]

4.482×10^{-۸} [۲]

1.694×10^{-۱۹} [۱]

۲۳۸. اتم X را در نظر بگیرید، اگر تعداد الکترون‌ها در یون فرضی X^{4+} برابر عدد اتمی در گروه ۱۰ و دوره ۵ باشد، با فرض نسبت ۱ به ۱ میان تعداد پروتون‌ها و نوترون‌های این یون، کدام یک از ایزوتوپ‌های اتم X محسوب می‌شود؟ (قلم‌چی-۱۳۹۷)

$^{۹۷}_{\text{۴۶}}X$ [۴]

$^{۱۰۳}_{\text{۵۰}}X$ [۳]

$^{۹۳}_{\text{۴۶}}X$ [۲]

$^{100}_{\text{۵۰}}X$ [۱]

۲۴۹. با توجه به جدول زیر، تفاوت جرم کربن دی اکسید حاصل از سوختن ۱۰۰ گرم زغال سنگ با خلوص ۸۰ درصد و جرم کربن دی اکسید حاصل از سوختن ۵۰ گرم بنزین با خلوص ۹۰ درصد به تقریب کدام است؟
قلم چی- ۱۳۹۸

نام سوخت	$\frac{kJ}{g}$	گرمای آزاد شده	مقادیر CO_2 تولید شده (g) به ازای هر kJ انرژی تولید شده
بنزین	۴۸	۰,۰۶۵	
زغال سنگ	۳۰	۰,۱۰۴	

۱۵۶,۸ [۴]

۱۳۲,۵ [۳]

۱۲۵,۸ [۲]

۱۰۹,۲ [۱]

۲۴۰. در واکنش سوختن کامل آلکانی در شرایط $STP, 2L$ گاز تولید شده است و $46g$ گاز اکسیژن مورد استفاده قرار گرفته است. فرمول شیمیایی هیدروکربن مورد نظر کدام است؟
قلم چی- ۱۳۹۸

C_6H_{14} [۴]

C_4H_{10} [۲]

C_5H_{12} [۱]

۲۴۱. برای عنصر A نسبت فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر به ایزوتوپ سبک‌تر برابر $\frac{2}{5}$ است. این عنصر دارای دو ایزوتوپ A^{M+1} و A^{M-1} است. جرم اتمی میانگین این عنصر کدام است؟
قلم چی- ۱۳۹۶

$M + \frac{2}{5}$ [۴]

$M - \frac{5}{7}$ [۳]

$\frac{2M+5}{7}$ [۲]

$M - \frac{3}{7}$ [۱]

۲۴۲. عنصر فرضی A در طبیعت به دو صورت ^{12}A و ^{13}A یافت می‌شود. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ ^{12}A برابر ۳۰ درصد باشد، جرم اتمی میانگین را برای این عنصر محاسبه کنید. از طرفی به دست آورید در هر ۱ گرم از ایزوتوپ A تقریباً چه تعداد اتم وجود دارد؟
قلم چی- ۱۳۹۶

$6,02 \times 10^{23} - 12,3$ [۴]

$6,02 \times 10^{23} - 12,7$ [۳]

$4,63 \times 10^{23} - 12,3$ [۲]

$4,63 \times 10^{23} - 12,7$ [۱]

۲۴۳. در یک نمونه مخلوط کربن دارای ایزوتوپ ^{12}C و ^{13}C و لیتیم نیز دارای ایزوتوپ‌های ^{7}Li و ^{6}Li می‌باشد. اگر نسبت درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر به سبک‌تر عنصرهای کربن و لیتیم به ترتیب $\frac{47}{19}$ و $\frac{1}{3}$ باشد، مجموع جرم اتمی میانگین کربن و لیتیم در این مخلوط برحسب amu کدام است؟ (جمله اتمی هر ایزوتوپ را برابر عدد جرمی آن ایزوتوپ در نظر بگیرید).
قلم چی- ۱۳۹۶

۱۹,۸۸ [۴]

۱۸,۹۹ [۳]

۱۸,۸۹ [۲]

۱۷,۸۹ [۱]

۲۴۴. اگر اتم X^{7a+b}_{2a+b} دو نوترون بیشتر از اتم X^{-2a+3b}_{-2a+3b} داشته باشد و این دو اتم ایزوتوپ یکدیگر باشند، مجموع تعداد الکترون‌ها، نوترون‌ها و پروتون‌ها در ایزوتوپ سبک‌تر کدام است؟ (a و b عده‌های مثبتی هستند).
قلم چی- ۱۳۹۷

۲۶ [۴]

۱۸ [۳]

۲۴ [۲]

۱۶ [۱]

۲۴۵. نیم عمر یکی از ایزوتوپ‌های عنصر X ، ۶ ساعت است. پس از گذشت یک شبانه‌روز، نسبت جرم مقداری از ماده‌ی مورد نظر که چار فروپاشی شده است به جرمی از این ماده که باقی‌مانده است، کدام است؟
قلم چی- ۱۳۹۷

$\frac{1}{4}$ [۴]

۱۵ [۳]

۴ [۲]

$\frac{1}{15}$ [۱]

۲۴۶. نیم عمر نوعی آلیاژ خاص ۲۷ دقیقه می‌باشد، در صورتی که یک کیلوگرم از این آلیاژ را در اختیار داشته باشیم، بعد از چه مدتی میزان انرژی که می‌تواند از متلاشی شدن ماده باقی مانده آلیاژ آزاد شود $10 \times 10^{16} \times 6,75 \times 10^8$ زول از مقدار انرژی آزاد شده اولیه کمتر است؟ (با تغییر $(\frac{m}{s})^3 = 3 \times 10^8$)
قلم چی- ۱۳۹۷

۲۷ دقیقه [۴]

۱۳,۵ دقیقه [۳]

۸۱ دقیقه [۲]

۵۴ دقیقه [۱]

۲۴۷. برای هیدروژن سه ایزوتوب و برای نیتروژن ایزوتوب‌های پایدار N_1^1 و N_7^{14} فرض شده است، به ترتیب از راست به چپ، پاسخ سؤالات زیر در کدام گزینه آمده است؟
کلم چی- ۱۳۹۷

الف) چند نوع مولکول آمونیاک (NH_3) پایدار قابل تشکیل است؟

ب) نسبت مجموع تعداد نوترون‌های سنگین ترین مولکول آمونیاک به مجموع تعداد پروتون‌های سبک ترین مولکول آمونیاک کدام است؟

۱,۵ - ۸ [۴]

۱,۵ - ۱۸ [۳]

۲,۱۵۴ - ۱۸ [۲]

۲,۱۵۴ - ۸ [۱]

۲۴۸. با توجه به داده‌های جدول زیر در یک نمونه طبیعی که شامل ۱۰۰۰۰۰ اتم هیدروژن پرتوزا است بعد از گذشت ۶۱ سال، اتم هیدروژن پرتوزا در آن باقی می‌ماند و درصد ایزوتوب‌های پایدار در آن
کلم چی- ۱۳۹۷

نماد ایزوتوب	${}_1^1 H$	${}_1^2 H$	${}_1^3 H$	${}_1^4 H$	${}_1^5 H$	${}_1^6 H$	${}_1^7 H$
ویژگی ایزوتوب							
نیم عمر	پایدار	پایدار	پایدار	$12,32 \text{ سال}$	$1,4 \times 10^{-22} \text{ ثانیه}$	$10 \times 10^{-22} \text{ ثانیه}$	$10 \times 10^{-22} \text{ ثانیه}$

۳۱۲۵ - ثابت می‌ماند. [۱]

۹۶۸۷۵ - ثابت می‌ماند. [۲]

۳۱۲۵ - افزایش می‌یابد. [۴]

۲۴۹. عنصر B دارای دو ایزوتوب به جرم‌های ۳۸ و ۴۰ می‌باشد. اگر جرم $5,0 \text{ g}$ مول از ماده B برابر AB_2 گرم باشد، جرم مولی میانگین A است؟
کلم چی- ۱۳۹۷

۱۴ [۴]

۴۷,۲ [۳]

۲۳,۶ [۲]

۳۸,۴ [۱]

۲۵۰. عنصر A دارای دو ایزوتوب است. اگر فراوانی ایزوتوب سبک‌تر، ۵ برابر فراوانی ایزوتوب سنگین‌تر و جرم اتمی میانگین این عنصر برابر با ۵۶,۵ amu باشد، با توجه به اطلاعات داده شده در زیر، عدد اتمی عنصر A کدام است؟ (جرم مولی و عدد جرمی را برابر در نظر بگیرید).
کلم چی- ۱۳۹۸

$$(S = 32, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$

I) اختلاف تعداد پروتون و نوترون در ۵ مول از ایزوتوب سبک‌تر، برابر با $10^{24} \times 1,204$ است.

II) جرم ۱۸,۱ مول SO_3 ، ۲ برابر جرم ۸,۰ مول از ایزوتوب سنگین‌تر است.

۲۶ [۴]

۲۴ [۳]

۳۳ [۲]

۲۲ [۱]

۲۵۱. عنصر X با جرم اتمی میانگین ۷۹ amu دارای دو ایزوتوب است. اگر در ایزوتوب سبک‌تر، اختلاف شمار پروتون‌ها و نوترون‌ها، ۸ واحد و درصد فراوانی ایزوتوب سنگین‌تر، ۲۵٪ باشد، اختلاف شمار نوترون‌ها و پروتون‌های ایزوتوب سنگین‌تر، چند است؟
کلم چی- ۱۳۹۸

۲۰ [۴]

۱۲ [۳]

۱۸ [۲]

۸ [۱]

۲۵۲. عنصر فرضی A دارای سه ایزوتوب با جرم اتمی میانگین ۳۹,۵ amu و عنصر فرضی B دارای دو ایزوتوب با جرم اتمی میانگین ۳۷,۳ amu باشد. اگر فراوانی ایزوتوب‌های A^{27} و A^{28} به ترتیب برابر ۸۰ و ۱۰ درصد و فراوانی ایزوتوب B^{38} برابر ۲۵ درصد باشد، اختلاف جرم سبک ترین و سنگین‌ترین مولکول AB_2 کدام است؟ (جرم اتمی و عدد جرمی را یکسان در نظر بگیرید).
کلم چی- ۱۳۹۸

۶ [۴]

۵ [۳]

۴ [۲]

۳ [۱]

۲۵۳. نیکل (Ni_{28}) با جرم اتمی میانگین ۵۸,۶۵ amu دارای سه ایزوتوب سبک‌تر اختلاف تعداد ذرات داخل هسته با یکدیگر ۲ است. اختلاف جرم دو ایزوتوب دیگر به اندازه یک نوترون است. درصد فراوانی ایزوتوب سنگین‌تر $\frac{1}{5}$ درصد فراوانی ایزوتوب با جرم متوسط است و در یون Ni^{2+} در ایزوتوب سنگین‌تر تفاوت نوترون‌ها و الکترون‌ها برابر ۷ است. درصد فراوانی ایزوتوب سبک‌تر کدام است؟
کلم چی- ۱۳۹۸

۷۵ [۴]

۶۵ [۳]

۷۰ [۲]

۶۰ [۱]

۲۵۴. عنصر X دارای ۳ ایزوتوب X^{A+2} و X^{A+4} و X^{A+6} می‌باشد. اگر نسبت فراوانی ایزوتوب X^{A+2} به ایزوتوب X^{A+4} $\frac{1}{2}$ برابر و نسبت فراوانی ایزوتوب X^{A+4} به ایزوتوب X^{A+2} $\frac{1}{3}$ باشد، درصد فراوانی ایزوتوب X^{A+4} و X^{A+6} به ترتیب از راست به چه چند درصد است؟
کلم چی- ۱۳۹۸

۵۰, ۲۰ [۴]

۵۰, ۱۰ [۳]

۶۰, ۲۰ [۲]

۶۰, ۱۰ [۱]

۲۵۵. اگر برای اتم هیدروژن ایزوتوپ‌های H_1^1 و H_2^2 و C^{13}_1 مفروض باشند، مطلوب است: (به ترتیب از راست به چپ)

الف) اختلاف جرم سبک‌ترین و سنگین‌ترین مولکول متان برابر با چند amu است؟

ب) چند نوع مولکول این پایدار ($C_2H_2 : C_2H_4$) می‌توان ساخت؟

۹ - ۵ [۴]

۹ - ۹ [۳]

۱۰ - ۹ [۲]

۱۰ - ۵ [۱]

۲۵۶. اختلاف تعداد نوترون و الکترون در X_1^{3+} برابر ۷ است. اگر تعداد ذرات بدون بار موجود در هسته X_{24}^{3+} باشد و بدانیم درصد فراوانی X_1 در نمونه طبیعی آن ۸۰٪ بیشتر از درصد فراوانی X_2 است، جرم مولی ترکیب XO چند گرم بر مول خواهد بود؟ ($O = 16g \cdot mol^{-1}$) (در یک نمونه طبیعی از عنصر فرضی X ، فقط دو ایزوتوپ X_1 و X_2 وجود دارد.)

۶۹,۶ [۴]

۶۹,۸ [۳]

۶۸,۴ [۲]

۶۸,۲ [۱]

۲۵۷. در مخلوط طبیعی عنصر X_7 دو ایزوتوپ پایدار X_1 و X_2 قرار دارد. اگر اختلاف عدد جرمی این دو ایزوتوپ برابر یک باشد و اختلاف تعداد نوترون‌ها با الکترون‌ها در ایزوتوپ X_2 نیز برابر یک باشد، عدد جرمی ایزوتوپ سنگین‌تر کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌تواند باشد؟

۱۷ [۴]

۱۳ [۳]

۴ [۲]

۱۵ [۱]

۲۵۸. دو ایزوتوپ پایدار (A_2^{10} , A_1^{11}) برای عنصر A در طبیعت وجود دارد. نسبت تعداد نوترون‌ها در ایزوتوپ سبک‌تر به تعداد ذرات بنیادی آن در حالت خنثی $\frac{1}{3}$ است، کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟

۱ عنصر A در خانه شماره ۴ جدول دوره‌ای قرار می‌گیرد.

۲ مجموع ذرات باردار ایزوتوپ سنگین‌تر این عنصر یکی بیشتر از مجموع ذرات باردار ایزوتوپ سبک‌تر آن است.

۳ تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها در ایزوتوپ سنگین‌تر برابر است.

۴ عنصر A در دوره دوم و گروه ۱۳ جدول دوره‌ای قرار دارد.

۲۵۹. فرض کنید اتم X_2 دارای سه ایزوتوپ $X^{2m+1}, X^{2m}, X^{2m-1}$ است، که در ایزوتوپ خنثی X^{2m} شمار نوترون آن ۲۰ درصد بیشتر از شمار الکترون‌ها می‌باشد. اگر درصد فراوانی سبک‌ترین ایزوتوپ $\frac{1}{3}$ درصد فراوانی سنگین‌ترین ایزوتوپ باشد، آن‌گاه درصد فراوانی ایزوتوپ X^{2m} کدام است؟ (جرم اتمی میانگین معادل $943 amu$ است).


۱۰ [۴]

۶۰ [۳]

۳۰ [۲]

۲۰ [۱]

۲۶۰. با توجه به شکل زیر که نمونه‌ای طبیعی از اتم‌های لیتیم را نشان می‌دهد، چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟



۴ [۴]

۳ [۳]

۲ [۲]

۱ [۱]

۲۶۱. عنصری در حالت خنثی دارای ۱۲ الکترون و دو ایزوتوپ است. تعداد نوترون ایزوتوپ اول ۳ عدد بیشتر از ایزوتوپ دوم و فراوانی آن، ۲ برابر ایزوتوپ دوم می‌باشد. اگر فرض کنیم، جرم اتمی متوسط عنصر برابر $34 amu$ است، مجموع تعداد نوترون ایزوتوپ‌ها کدام است؟

۵۲ [۴]

۴۸ [۳]

۴۴ [۲]

۴۳ [۱]

قلم چی- ۱۳۹۹

۲۶۲. کدام گزینه درست است؟

۱ با حل کردن 1 mol گاز باریم اکسید در 2 لیتر آب ، 3 mol یون تولید می‌شود.

۲ از انحلال هر مول دی‌نیتروژن پنتاکسید در آب، 2 mol یون هیدروکسید تولید می‌شود.

۳ با حل کردن 2 mol لیتیم اکسید در 50 میلی لیتر آب ، 4 mol یون هیدرونیوم تولید می‌شود.

۴ در اثر انحلال 5 mol دی‌نیتروژن پنتاکسید در 5 لیتر آب ، غلظت یون هیدرونیوم به 1 mol بر لیتر می‌رسد.

قلم چی- ۱۳۹۷

۲۶۳. اگر اختلاف تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها در یون X^{2+} 112 باشد، چند مورد از موارد زیر درباره آن نادرست است؟

• عنصری از دوره پنجم و دارای 64 نوترون و 48 پروتون است.

• با اتم جیوه (Hg^{200}) که تعداد نوترون‌ها در آن 51 برابر پروتون‌ها است، هم گروه می‌باشد.

• هم دوره عنصری پرتوزا است که جرم اتمی آن در جدول دوره‌ای نیامده است.

• اختلاف تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها در اتم X برابر عدد اتمی عنصری از تناب سوم و گروه 16 است.

۳ [۴]

۲ [۳]

۱ [۲]

۱ صفر

۲۶۴. دو ماده X و Y به ترتیب دارای جرم‌های 10 و 20 گرم هستند. اگر به هر دو ماده به یک اندازه گرمایی دهیم، دمای هر دو به یک اندازه افزایش می‌یابد. کدام نتیجه‌گیری درست است؟

۱ ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه دو ماده X و Y یکسان است.

۲ ظرفیت گرمایی X و Y مساوی است اما ظرفیت گرمایی ویژه X نصف ظرفیت گرمایی ویژه Y است.

۳ ظرفیت گرمایی ویژه X دو برابر ظرفیت گرمایی ویژه Y است اما ظرفیت گرمایی دو ماده X و Y یکسان است.

۴ ظرفیت گرمایی ویژه X و Y مساوی است اما ظرفیت گرمایی X دو برابر ظرفیت گرمایی Y است.

۲۶۵. ظرفیت گرمایی ویژه ماده A نصف ظرفیت گرمایی ویژه ماده B است. اگر مقدار مول ماده A ، 1 برابر مقدار مول ماده B باشد، برای اینکه دمای دو ماده به یک اندازه افزایش یابد، مقدار گرمایی لازم برای ماده A چند برابر ماده B است؟ (جرم مولی A و B به ترتیب برابر 18 و 45 گرم بر مول است).

قلم چی- ۱۳۹۷

۰,۴ [۴]

۰,۳ [۳]

۰,۲ [۲]

۱ [۱]

۲۶۶. در یک یخچال صحرایی، یک لیوان حاوی مقدار مشخصی از اتانول با دمای ^{40}C قرار دارد. چند گرم آب باید از بدنۀ ظرف تبخیر شود تا دمای اتانول به ^{30}C کاهش یابد؟ (ظرفیت گرمایی اتانول موجود در ظرف برابر $\frac{J}{5,5 \cdot 10^{-3}}$ و برای تبخیر یک مول آب 44 کیلوژول انرژی نیاز است).
($H = 1$ ، $O = 16$: $g \cdot mol^{-1}$)

قلم چی- ۱۳۹۷

$2,5 \times 10^{-3}$ [۴]

$2,25 \times 10^{-3}$ [۳]

$2,25 \times 10^{-3}$ [۲]

$2,5 \times 10^{-2}$ [۱]

قلم چی- ۱۳۹۸

۲۶۷. کدام عبارت نادرست است؟

۱ تعداد عناصر در دوره‌های دوم و چهارم جدول تناوبی به ترتیب 8 و 18 عنصر است.

۲ طولانی‌ترین دوره مربوط به دوره‌های ششم و هفتم جدول تناوبی با 32 عنصر است.

۳ عناصر Se و Te در گروه 16 جدول دوره‌ای قرار دارد.

۴ عنصر رادیم Ra سنگین‌ترین عنصر گروه اول جدول دوره‌ای است.

۲۶۸. به آلیاژی از طلا و نقره به جرم 12 گرم، $19,2$ ژول گرمایی دهیم تا دمای آن از $273K$ به $283K$ برسد. تقریباً چند درصد از جرم این آلیاژ را طلا به خود اختصاص می‌دهد؟ ($c_{Ag} = 0,12$ ، $c_{Au} = 0,24$: $j \cdot g^{-1} \cdot {}^{\circ}C^{-1}$)

قلم چی- ۱۳۹۸

۴۶ [۴]

۵۴ [۳]

۳۳,۳۳ [۲]

۶۶,۶۶ [۱]

پاسخنامه تشریحی

۱. گزینه ۲ فرمول استر موردنظر $C_{57}H_{110}O_4$ می‌باشد.
ابتدا واکنش را نوشت و موازنی می‌کنیم:




جرم مولی اسید چرب و استر داده شده را محاسبه می‌کنیم. جرم مولی اسید چرب، ۲۸۴ گرم بر مول و جرم مولی استر، ۸۹۰ گرم بر مول می‌باشد.

$$\text{اسید چرب} = \frac{۲۸۴g}{۱mol} \times \frac{۱mol}{۱۰۰g} \times \frac{۱۰۰g}{۱jg} \times \frac{۱jg}{\text{استر}} = ۵,۳۴kg$$

$$\text{استر} = \frac{۸۹۰g}{۱mol} \times \frac{۱mol}{۱۰۰g} \times \frac{۱۰۰g}{۱jg} = ۱۰۰$$

$$\text{بازده} = \underbrace{\frac{۷۵}{۱۰۰}}_{\text{بازده}} \times ۳۸۳۴g = ۲۸۳۴g$$

۲. گزینه ۳



طبق معادله بالا به ازای ۱ امول $Zn_{(s)}$ که از تیغه روی جدا شده و در محلول می‌ریزد ۲ مول نقره به سطح تیغه جذب می‌شود.

$$\text{تغییر جرم تیغه} = -65gZn + 2(108g)Ag = +151g$$

روش اول:

$$200mL AgNO_3 \times \frac{1L}{1000mL} \times \frac{0.2mol}{1L} \times \frac{151g}{2mol AgNO_3} = 3.02g$$

$$\frac{\text{جرم اضافه شده}}{\text{جرم محسوبه شده}} = \frac{2/416}{3/02} \times 100 = 80$$

روش دوم:

$$\frac{200mL \times 0.2 \frac{mol}{L} AgNO_3 \times Ra}{2 \times 1000 \times 100} = \frac{2,416g}{151g} \quad Ra = 80$$

۳. گزینه ۳ عبارت الف، ب، ت درست‌اند و عبارت (ب) نادرست است. در عبارت (ب) توجه کنید از ۱۱۸ عنصر جدول تناوبی ۹۲ عنصر در طبیعت یافت می‌شوند و ۲۶ عنصر به طور مصنوعی ساخته می‌شوند و درصد آنها به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{۹۲}{۱۱۸} \times 100 = \%77.96 \quad \text{درصد عناصر موجود در طبیعت}$$

$$\frac{۲۶}{۱۱۸} \times 100 = \%22.03 \quad \text{درصد عناصری که به طور مصنوعی ساخته می‌شوند}$$

و برای عبارت (ب):

$$E = mc^2$$

$$E = 5 \times 10^9 (3 \times 10^8)^2$$


$$E = 4,5 \times 10^{29} J = 4,5 \times 10^{23} kJ$$

۴. گزینه ۱

$$?mol Cu(NO_3)_2 = 0.1 mol \cdot L^{-1} \times \frac{1}{5} L = 0.02mol$$

$$\bar{R} = \bar{R} Cu(NO_3)_2 \Rightarrow 15 \times 10^{-3} = \frac{0.02 - 0}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{2 \times 10^{-3}}{15 \times 10^{-3}} = \frac{4}{3} min$$

$$\frac{4}{3} min \times 60s = \frac{240}{3} = 80s$$



$$0.02mol \quad xg$$

$$Cu(NO_3)_2 \sim Cu \Rightarrow \frac{0.02}{1} = \frac{x}{64} \Rightarrow x = 1.28g$$

$$1 \quad 64$$

از جرم تیغه Cu کاسته می‌شود.

$$0.02mol \quad xg$$

$$Cu(NO_3)_2 \sim 2Ag \Rightarrow \frac{0.02}{1} = \frac{x}{2 \times 108} \Rightarrow x = 4.32$$

$$1 \quad 2 \times 108$$

مقدار جرم نقره، که بر روی تیغه Cu رسوب می‌کند و اضافه می‌شود.

$$\Delta m = 14.32 - 1.28 = 13.04 \text{ g}$$


مقدار تغییر جرم تیغه مس را به روش زیر نیز می‌توان محاسبه کرد:

ایدی ازای یک مول مس (g) که خورده شود دو مول نقره (2Ag) روی تیغه مس می‌نشینید. بنابراین تغییر جرم طبق معادله استوکیومتری برابر ($g = 64 - 64 = 152$) می‌شود.

$$Cu(NO_3)_x \sim 2Ag \Rightarrow \frac{190 \times 1}{1 \times 100} = \frac{x}{152} \Rightarrow x = 3.04g$$

۵. گزینه‌ای عناصر (عنصر) دارای تراز $3d$ کاملاً پر هستند و ۱۵ عنصر Kr , Br , Se , As , Ge , Ga , Zn , Cu , Mn , V , Ti , Sc , Ca در آخرین لایه الکترونی خود بیش از ۱ الکترون دارند.

۶. گزینه ۲ در سری الکتروشیمیایی F_6 باینی تر از بیدروژن است پس آهن نقش آند و هیدروژن در نقش کاتد و واکنش انجام شده به صورت زیر خواهد بود:



مرحله ۱: ابتدا باید محاسبه کنیم به ازای مصرف ۶۸ گرم آهن چند مول H^+ مصرف می‌شود:

$$1,81gFe \times \frac{1molFe}{55.8gFe} \times \frac{1molH^+}{1molFe} = 0,05molH^+$$

مرحله ۱۲: در نيم سلول استاندارد هيدروژن (SHE) که غلظت H^+ در آن برابر $1\text{ mol} \cdot L^{-1}$ است را به دست آوريم:

تعداد مول اولیه⁺

$$= \text{moles } mLH^+ \times \frac{\text{1 } LH^+}{\text{1 mole } mLH^+} \times \frac{\text{1 mol } H^+}{\text{1 } LH^+} = \text{moles } molH^+$$

مرحلة ٣:

$$\text{تعداد مول } H^+ = ٣٠ \text{ اولیه}$$

$$\text{تعداد مول } H^+ \text{ باقیمانده} = \frac{\frac{0.24\text{ mol}}{0.3\text{ L}}}{0.06} = 0.4\text{ mol} \cdot L^{-1}$$

مرحله ۴: در این مرحله با توجه به غلظت H^+ می‌توان pH نیم‌سلول هیدروژن را پس از گذشت ۵ ثانیه به دست آورد:

$$pH = -\log[H^+] = -\log 1 \times 10^{-1} = -\log 10^{-1} = -1 \log 10 + 1 = -1 + 1 = 0$$

میزان افزایش pH در ۵ ثانیه دوم اصولاً کمتر از ۱، خواهد بود. بنابراین pH محلول در ثانیه ۱ باید از ۱، پیشتر و از 2° کمتر باشد که فقط گزینه ۲ با این عدد خواهی دارد.

$$V. \text{ گزینه } X^{\dagger+} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^n$$

$$\frac{n}{12} = 0, 25 \Rightarrow n = 3 \Rightarrow X^{r+} : [_{1A}Ar]^{rd^r}$$

۲ . گزینه ها

$\tau SO_7(g)$	$+ O_7(g)$	\rightleftharpoons	$\tau SO_7(g)$
τ	τ	\circ	لحظه آغاز :
$\tau - 2x$	$\tau - x$	$+ 2x$	تعادل اولیه :
$\tau - 2x$	$\tau - x$	$- 2x$	لحظه اعمال تغییر :
$\tau - 2x - 2y$	$\tau - x - y$	$- 2x + 2y$	رسیدن به تعادل مجدد :

(با کم شدن غلظت SO_3 تعادل به سمت راست جابه جا می شود)

با توجه به اینکه غلظت SO_3 در تعادل جدید $2/5$ مول بر لیتر است با در نظر گرفتن حجم ده لیتری ظرف 2 مول SO_3 در نهایت در ظرف وجود دارد:

$$\Re x - \Re + \Re y = \Re \rightarrow \Re x + \Re y = \Re \rightarrow x + y = \Re$$

$$molSO_4 = 5 - 2(x + y) = 5 - 2 \times 2 = 1 mol$$

$$molO_r = \sigma - (x + y) = \sigma - r = rmol$$

$$K = \frac{[SO_4]^\nu}{[SO_4]^\nu [O_\nu]} = \frac{\left(\frac{\nu}{1}\right)^\nu}{\left(\frac{\nu}{1}\right)^\nu \times \left(\frac{\nu}{1}\right)} = \nu \Delta L \cdot mol^{-1}$$

۹۰. گزینه ۲ با توجه به تبدیل واحدها برای جرم بر حسب گرم خواهیم داشت:

$$100 \text{ Ton} \times \frac{1000 \text{ kg}}{1 \text{ Ton}} \times \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \times \frac{10 \text{ J}}{1 \text{ g}} = 10^9 \text{ J}$$

$$E = mc^2 \Rightarrow 9 \times 10^{10} = m(10^8)^2 \Rightarrow m = 10^{-8} kg$$

مسائل چالشی شیمی کنکور

$$= 10^{-4} kg \times \frac{1000g}{1kg} \times \frac{1000mg}{1g} = 1mg$$

۱۰. گزینه ۱

$$\begin{array}{rcl} COCl_r(g) & \rightleftharpoons & CO(g) + Cl_r(g) \\ \frac{3}{3+x} & & \frac{3}{3-x} \\ & & K = \frac{[CO] \times [Cl_r]}{[COCl_r]} = \frac{\left(\frac{3}{3+x}\right) \times \left(\frac{3}{3-x}\right)}{\left(\frac{3}{3}\right)} = 1 \end{array}$$


با افزایش فشار (کاهش حجم ظرف) تعادل به سمت چپ جابه‌جا می‌شود.

$$K = \frac{[CO] \times [Cl_r]}{COCl_r} = \frac{\left(\frac{3-x}{1}\right) \times \left(\frac{3-x}{1}\right)}{\left(\frac{3+x}{1}\right)} = 1$$

$\rightarrow x^2 - 8x + 6 = 0 \rightarrow x = 1, x = 6$ (غیر قابل قبول)

$$[COCl_r] = 3 + x = 3 + 1 = 4$$


۱۱. گزینه ۲



$$\text{جرم مولی سلولز} = n \times [(6 \times 12) + (10 \times 1) + (5 \times 16)] = 162ng \cdot mol^{-1}$$

$$\begin{aligned} ?kgC &= 18kg \times \frac{50kg \text{ سلولز}}{درخت} \times \frac{1000g}{1kg} \times \frac{1mol \text{ سلولز}}{162ng} \times \frac{6nmol C}{1mol \text{ سلولز}} \times \frac{12g C}{1mol C} \times \frac{1kg}{1000g} = 18kg C \\ &\text{جرم خالص} = \frac{\text{جرم خالص}}{\text{درصد خلوص}} \times 100 \Rightarrow 90 = \frac{18(kg)}{\text{جرم کل}} \times 100 \Rightarrow 20kg \end{aligned}$$

۱۲. گزینه ۱




$$\left. \begin{aligned} &\text{مجموع فرآوردها} = 6,06 + 6,054 = 12,114g \\ &(\Delta m) = 12,2 - 12,114 = 0,086g \end{aligned} \right\} \Rightarrow 8,6 \times 10^{-5} kg$$

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

$$\Delta E = 8,6 \times 10^{-5} (3 \times 10^8)^2$$

$$\Delta E = 7,74 \times 10^{12} J$$

۱۳. گزینه ۳ منظور از ماده جامد باقی‌مانده، Na_rCO_3 تولید شده و ناخالصی جامدی است که در ظرف باقی‌مانده است. ابتدا باید حساب کشم چند گرم $H_rO(g)$ و $CO_r(g)$ تولید شده است:



$$\text{جرم جامد باقی‌مانده} = 40 - 33,8 = 6,2g$$

اکنون با توجه به مجموع مقدار CO_r و H_rO می‌توان جرم خالص $NaHCO_3$ را به دست آورد. مطابق واکنش فوق، بر اثر تجزیه ۲ مول $NaHCO_3$ (معادل 2×84 یک مول CO_r و یک مول H_rO (معادل $2 \times 18 + 62 = 62$ g) تولید می‌شود، پس:

$$?gNaHCO_r = 6,2g(CO_r + H_rO) \times \frac{2molNaHCO_r}{62g(CO_r + H_rO)} \times \frac{18gNaHCO_r}{1molNaHCO_r} = 16,8gNaHCO_r$$

و در ادامه می‌توان نوشت:

$$\frac{\text{جرم ماده خالص (g)}}{\text{جرم ماده ناخالص (g)}} = \frac{16,8}{40} \times 100 = 42\%$$

۱۴. گزینه ۲ ابتدا به ازای ۴۰ گرم هلیم تولید شده باید جرم کاهش یافته بر حسب کیلوگرم را بدست آوریم تا در فرمول اینیشتین قرار بدھیم و مقدار انرژی آزاد شده بر حسب ژول را بدست آوریم:

$$0,4 \cancel{gHe} \times \frac{1 \cancel{molHe}}{4 \cancel{gHe}} \times \frac{0,0024 \cancel{J}}{1 \cancel{molHe}} \times \frac{1kg}{1000 \cancel{J}} = 2,4 \times 10^{-7} kg$$

جرم کاهش یافته بر حسب کیلوگرم را در $E = mc^2$ قرار می‌دهیم،


* دقت کنید سرعت نور $c = 10^17$ داده شده و خواهیم داشت:


$$E = 2,4 \times 10^{-7} \times 10^{17} = 2,4 \times 10^{10} J$$

$$2,4 \times 10^{10} \cancel{J} \times \frac{1 \cancel{J}}{240 \cancel{J}} \times \frac{1 \cancel{kg}}{1000 \cancel{J}} \times \frac{1Tone}{1000 \cancel{kg}} = 100 Tone_{Fe}$$

و چون در روز یک تن آهن ذوب می‌شود پس ۱۰۰ تن آهن معادل ۱۰۰ روز کار در کارگاه است.

۱۵. گزینه ۳ این مسئله را هم به دو روش حل می‌کنیم:





روش اول: استفاده از تناسب

ابتدا باید حساب کنیم در واکنش (۲) چند گرم N_2O_4 مصرف می‌شود:

$$\left[\frac{\frac{(N_2O_4)}{(g)}}{\text{گرم}} \right] = \left[\frac{\frac{(NO)}{(g)}}{\text{گرم}} \right] \Rightarrow \frac{x}{2 \times 92} = \frac{6}{6 \times 30} \Rightarrow x = \frac{6 \times 6 \times 92}{6 \times 2 \times 30} = 12gN_2O_4$$

بنابراین از ۱۴۷,۲ گرم N_2O_4 اولیه، ۹,۲ گرم از آن در واکنش (۲) مصرف می‌شود، پس:

$$\left[\frac{\frac{(N_2O_4)}{(g)}}{\text{گرم}} \right] = \left[\frac{\frac{(N_2)}{(g)}}{\text{گرم}} \right] \Rightarrow \frac{138}{1 \times 92} = \frac{x}{3 \times 28} \Rightarrow x = \frac{138 \times 3 \times 28}{92} = 126gN_2$$

پس بالاترین مقدار مورد انتظار (g) برابر ۱۲۶ گرم است.

روش دوم: استفاده از ضرایب تبدیل

ابتدا باید حساب کنیم چند گرم N_2O_4 در واکنش (۲) مصرف می‌شود:

$$?gN_2O_4 = 9gNO \times \frac{1molNO}{30gNO} \times \frac{2molN_2O_4}{6molNO} \times \frac{92gN_2O_4}{1molN_2O_4} = 12gN_2O_4$$

بنابراین از ۱۴۷,۲ گرم N_2O_4 اولیه، ۹,۲ گرم از آن در واکنش (۲) مصرف می‌شود، پس:

$$?gN_2 = 138gN_2O_4 \times \frac{1molN_2O_4}{92gN_2O_4} \times \frac{3molN_2}{1molN_2O_4} \times \frac{28gN_2}{1molN_2} = \frac{138 \times 3 \times 28}{92} = 126gN_2$$

۱۶. گزینه ۱ برای تعیین تعداد اتم‌ها ابتدا گرم و بعد مول ماده را تعیین می‌کنیم.





$$g \xrightarrow{\text{جرم مولی}} mol \xrightarrow{NA} \text{اتم}$$

$$1ATone = 1 \times 10^6 g \Rightarrow 1 \times 10^6 g_{\text{پ}} \times \frac{320J}{1g_{\text{پ}}} = 320 \times 1 \times 10^6 J$$

$$E = mc^2 \Rightarrow 320 \times 1 \times 10^6 = m(3 \times 10^8)^2 \Rightarrow m = 5,4 \times 10^{-14} kg_H$$

$$5,4 \times 10^{-14} kg_H \times \frac{1000g_H}{1kg_H} \times \frac{1mol_H}{1g_H} \times \frac{6,02 \times 10^{23} atom_H}{1mol_H} = 3,85 \times 10^{19} atom_H$$

۱۷. گزینه ۱



$$\begin{cases} x + y = 1 \\ \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}y = \frac{24}{32} \rightarrow 3x + y = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$2x = \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{1}{4} \text{ mol}, y = \frac{3}{4} \text{ mol}$$

$$= \frac{1}{4} \text{ mol} \times 122,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 30,625 \text{ g}$$

$$= \frac{3}{4} \text{ mol} \times 101 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 75,75 \text{ g}$$

$$\frac{\text{جرم پتاسیم نیترات}}{\text{جرم کل}} \times 100 = \frac{75,75}{106,375} \times 100 \simeq 71$$

درصد خلوص پتاسیم نیترات

۱۸. گزینه ۲ ابتدا انرژی آزاد شده از ستاره در یک روز را مشخص می‌کنیم:

و برای مدت ۳۰ روز خواهیم داشت: $30 \times 10^{14} kJ$

$$?Tone_{\text{پخت}} = 30 \times 10^{14} kJ \times \frac{1000 J}{1 kJ} \times \frac{18 g}{6000 J} \times \frac{1 Tone_{\text{پخت}}}{18 g} = 9 \times 10^{19} Tone_{\text{پخت}}$$

. گزینه ۴ معادله موازن شده به صورت $2NaN_3 \rightarrow 2Na + 3N_2$ است.

$$\lambda^4 mLN_r \times \frac{\lambda^4 gN_r}{mLN_r} = \lambda^4 gN_r$$

$$\lambda^4 gN_r \times \frac{1 molN_r}{28gN_r} \times \frac{2 molNaN_3}{3 molN_r} \times \frac{65 gNaN_3}{1 molNaN_3} \times \frac{100 gNaN_3}{52 gNaN_3} = 25 gNaN_3 \quad (\text{نالخلص ناخالص})$$

$$\Rightarrow \frac{\text{مقدار علی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 = \frac{25}{x} \times 100 \Rightarrow x = 100 gNaN_3 \quad (\text{بازدہ نظری})$$

. گزینه ۲ ابتدا مقدار هیدروژن تبدیل شده به هلیم را برای ۲ گرم هلیم محاسبه می‌کیم:

$$?g_{\text{ماده}} = 2gHe \times \frac{1 molHe}{4gHe} \times \frac{0,002 g}{1 molHe} = 0,001 g \quad (\text{ماده}) \Rightarrow 0,001 g \times \frac{1 kg}{10^3 g} = 10^{-6} kg \quad (\text{ماده})$$

$$E = mC^r \Rightarrow E = 10^{-6} (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{10} J$$

$$?Tone_{Cu} = 9 \times 10^{10} J \times \frac{1 g Cu}{200 J} \times \frac{1 Tone_{Cu}}{10^6 g Cu} = 450 Tone_{Cu}$$

. گزینه ۱ نسبت درصد جرمی اکسیژن در $KHCO_3$ (۳۰٪)، به درصد جرمی هیدروژن در ۳۰٪-۳۰٪ تری متیل بوتان

$$(\frac{16 \times 1}{100} \times 100 = \%48), (C_3H_16) \times 100 = \%16, (C_3H_16)$$

گزینه (۳) :

$$\frac{14}{14 + 7 \times 12} \times 100 = 14\% C_3H_14$$


گزینه (۳) :

$$\frac{18}{18 + 8 \times 12} \times 100 = 15,7\% C_3H_18$$


گزینه (۴) :

$$\frac{C_3H_18}{16 + 8 \times 12} \times 100 = 14\%$$

گزینه ۲ . ۲۲



$$FeO = 56 + 16 = 72 g \cdot mol$$



$$Fe_rO_r = (56 \times 2) + (16 \times 3) = 160 g \cdot mol^{-1}$$

اگر جرم اکسید آهن را در هر واکنش X گرم در نظر بگیریم خواهیم داشت:

$$(I) ?gFe = xgFeO \times \frac{1 mol FeO}{72 g FeO} \times \frac{1 mol Fe}{1 mol FeO} \times \frac{56 g Fe}{1 mol Fe}$$


$$= \frac{56x}{72} g Fe$$

$$(II) ?gFe = xgFe_rO_r \times \frac{1 mol Fe_rO_r}{160 g Fe_rO_r} \times \frac{4 mol Fe}{3 mol Fe_rO_r} \times \frac{56 g Fe}{1 mol Fe}$$

$$= \frac{56x}{180} g Fe$$

$$(I) (II) \Rightarrow \frac{\frac{56x}{72}}{\frac{56x}{180}} = \frac{72}{180} = 0,4$$

. گزینه ۲ معادله کلی واکنش سوختن کامل آلکان‌ها به صورت زیر است:



$$\frac{\text{جرم آب}}{\text{جرم الکان}} = \frac{(n+1)H_2O}{C_nH_{2n+2}} = \frac{18(n+1)}{12n+2n+2} = 1,5 \Rightarrow 21n+3 = 18n+18 \Rightarrow 3n = 15 \Rightarrow n = 5$$

بنابراین فرمول آلکان مورد نظر C_5H_{12} است.

$$E = mc^2 \Rightarrow E = \underbrace{2,4 \times 10^{-9}}_{kg} \times (9 \times 10^{16}) = 2,16 \times 10^8 kJ$$

$$\text{?}g_H = 10,8 \times 10^9 kJ \times \frac{1g_H}{2,16 \times 10^8 kJ} = 50g_H$$

۲۵. گزینه ۲ تک تک گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

هر مول اتن با یک مول H_2 سیر می‌شود:

$$1) CH_r = CH_r + H_r \rightarrow C_rH_e \Rightarrow \frac{H_r \text{ جرم}}{C_rH_e \text{ جرم}} \times 100 = \frac{2}{28} \times 100 = \frac{100}{14} = \%7,14$$

درصد افزایش جرم
اتن

هر مول پروپین با ۲ مول H_2 سیر می‌شود:

$$2) CH_r - C \equiv CH + 2H_r \rightarrow C_rH_e \Rightarrow \frac{2 \times H_r}{C_rH_e} \times 100 = \frac{2 \times 2}{40} \times 100 = \%10$$


درصد افزایش جرم
پروپین

هر مول کلرو اتن با یک مول H_2 سیر می‌شود:

$$3) CH_r = CH + H_r \rightarrow CH_r - CH_r \Rightarrow \frac{H_r}{C_rH_rCl} \times 100 = \frac{2}{62,5} \times 100 = \frac{100}{31,25} = \%3,2$$

درصد افزایش جرم
کلرو اتن

هر مول بنزن با ۳ مول H_2 سیر می‌شود:



همان‌طور که ملاحظه می‌شود بیشترین افزایش مربوط به پروپین است.

یه‌جور دیگه: در این سؤال اولاً باید به دنبال ترکیبی باشیم که با تعداد H_2 بیشتری واکنش می‌دهد (رد گزینه‌های ۱ و ۳) و ثانیاً جرم مولی آن کمتر باشد (رد گزینه ۴).

۲۶. گزینه ۲ ابتدا انرژی یکسال را محاسبه کرده و سپس انرژی را به جرم تبدیل می‌کنیم و بعد از بدست آوردن جرم در رابطه چگالی حجم را بدست می‌آوریم.

نکته: چون چگالی را بر حسب $\frac{g}{cm^3}$ داده حتماً باید جرم را بر حسب kg بدست آورد و سپس تبدیل کرد.

انرژی گسیل شده از خورشید در یک سال به سمت زمین $= 365 \times 10^{22} J$

$$E = mc^2 \Rightarrow 365 \times 10^{22} = m(3 \times 10^8)^2$$


$$\Rightarrow m = \frac{365 \times 10^{22}}{9 \times 10^{16}} kg = \frac{365 \times 10^{25}}{9 \times 10^{16}} g = \frac{365}{9} \times 10^9 g$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{\frac{365}{9} \times 10^9}{1,4} = \frac{365}{126} \times 10^{10} \simeq 2,9 \times 10^{10} cm^3$$

۲۷. گزینه ۳ به بررسی عبارت‌ها می‌پردازیم:


عبارت اول: درست است.

عبارت دوم: نادرست است. ترکیب (I) دارای ۷ پیوند دوگانه کربن-کربن است، پس هر مول از آن با ۷ مول H_2 به‌طور کامل سیر می‌شود:



$$\text{Drifted increase in mass} / \text{Molar mass} = \frac{7H_2}{C_{14}H_{10}} \times 100 = \frac{7 \times 2}{14(12) + 10(1)} \times 100 = \frac{14}{178} \times 100 \simeq \%7,86$$

عبارت سوم: نادرست است. فرمول مولکولی ترکیب II، به صورت $C_{13}H_{18}O_2$ می‌باشد:



پس تفاوت جرم مولی ترکیب (I) و (II) برابر است با:

$$\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_2 = -C + \Delta H + 2O = -12 + 8 + 32 = 28g \quad \text{جرم مولی}_1$$

عبارت چهارم: نادرست است. در ترکیب (I) به ازای هر هیدروژن یک پیوند $C-H$ وجود دارد، پس تعداد پیوندهای $C-H$ در آن برابر ۱۰ است. در ترکیب (II) نیز همین طور است با این تفاوت که یکی از اتم‌های H به O متصل شده است. بنابراین تعداد پیوندهای $C-H$ در آن برابر ۱۷ است. پس تفاوت تعداد پیوندهای $C-H$ در ترکیب (I)، ۷ واحد کمتر از ترکیب (II) می‌باشد.

۲۸. گزینه ۲



$$\begin{aligned}
 ?g \text{ MgCl}_2 &= 292,5 \text{ g NaCl} \times \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58,5 \text{ g NaCl}} \times \frac{1 \text{ mol MgCl}_2}{2 \text{ mol NaCl}} \\
 &\times \frac{95 \text{ g MgCl}_2}{1 \text{ mol MgCl}_2} = 237,5 \text{ g MgCl}_2
 \end{aligned}$$

مرحله بالا را می‌توان به روش تناسب نیز انجام داد:

$$\text{MgCl}_2 \sim 2\text{NaCl}$$

$$\frac{x \text{ g}}{1 \times 95} = \frac{292,5 \text{ g}}{2 \times 58,5} \Rightarrow x = 237,5 \text{ g MgCl}_2$$

$$ppm = \frac{\frac{(g)}{(g)}}{\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}}} \times 10^6 = \frac{237,5 \text{ g MgCl}_2}{\frac{1000 \text{ L}}{1 \text{ m}^3} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ g}}{1 \text{ mL}}} \times 10^6 = 118,75 \text{ ppm}$$

۲۹. گزینه ۳

جرم مولی‌های متفاوت عبارتند از:

$$\text{MgO} = ^{24}\text{Mg} + ^{16}\text{O} = 40$$

$$\text{MgO} = ^{25}\text{Mg} + ^{18}\text{O} = 43$$

$$(43 - 40) + 1 \rightarrow 4$$

$$\frac{\text{جرم سنگینترین}}{\text{جرم سبکترین}} = \frac{43}{40} = 1,075$$

فرمول اکسید این عنصرها با جرم‌های مولی متفاوت عبارت است از:

$$^{24}\text{Mg} + ^{16}\text{O} \rightarrow ^{24}\text{Mg} + ^{18}\text{O}$$

۳۰. گزینه ۲ از آبکافت استر، الکل و کربوکسیلیک اسید حاصل می‌شود. با توجه به ساختار استر داده شده بخش الکلی آن دارای ۳ اتم کربن می‌باشد و مابقی کربن‌ها مربوط به بخش کربوکسیلیک اسید آن هستند. فرمول استر مورد نظر $C_{57}H_{110}O_4$ می‌باشد. واکنش آبکافت این استر را نوشه و موازنه می‌کیم:



$$\text{جرم مولی استر داده شده} = 890 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

$$\text{جرم مولی اسید چرب} = 284 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

$$\begin{aligned}
 &\frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \times \frac{1 \text{ mol}}{890 \text{ g}} \times \frac{3 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} \times \frac{\text{اسید چرب}}{\text{استر}} \\
 &\times \frac{284 \text{ g}}{1 \text{ mol}} \times \frac{75}{100} = 3834 \text{ g}
 \end{aligned}$$

این مرحله را می‌توان به روش تناسب نیز انجام داد:

$$C_{57}H_{110}O_4 \sim 3CH_3(CH_2)_1COOH$$

$$\frac{57,34 \times 1000 \times 75 \text{ g}}{1 \times 890 \times 100 \text{ g}} = \frac{x \text{ g}}{3 \times 284} \Rightarrow x = 3834 \text{ g}$$

۳۱. گزینه ۲ اگر مقدار اولیه ماده پرتوزا m در نظر بگیریم با گذشت هر ۱۰ دقیقه (یک نیم عمر) مقدار آن نصف می‌شود. حال یک ساعت (۶۰ دقیقه) زمان داریم:

$$n = \frac{t}{T} \Rightarrow n = \frac{60}{10} = 6 \Rightarrow \text{پس باید ۶ نیم عمر سپری شود}$$

مسائل چالشی شیمی کنکور

$$m_0 \rightarrow \frac{m_0}{2} \rightarrow \frac{m_0}{4} \rightarrow \frac{m_0}{8} \rightarrow \frac{m_0}{16} \rightarrow \frac{m_0}{32} \rightarrow \frac{m_0}{64}$$

مقدار باقیمانده اولیه

از طرفی می‌دانیم مقدار متلاشی شده برابر با اختلاف مقدار اولیه و باقیمانده است. پس داریم:

$$m_0 - \frac{m_0}{64} = 630 \Rightarrow \frac{64m_0 - m_0}{64} = 630$$

$$\Rightarrow \frac{63}{64}m_0 = 630 \Rightarrow m_0 = 640$$

۳۲. گزینه ۲ جرمی که به انرژی تبدیل شده است.

$$2 \times 0,1 = 0,2 g$$

$$0,2 - 19999 = 0,0001 g$$

$$1 \times 10^{-5} g \times \frac{1 kg}{10^3 g} = 1 \times 10^{-8} kg$$

جرم کاهش یافته

$$E = mc^2 \rightarrow E = 10^{-8} \times 9 \times 10^{16} = 9 \times 10^8 J$$



$$9 \times 10^8 J \times \frac{1 kJ}{10^3 J} = 9 \times 10^5 kJ$$

انرژی تولید شده :

$$? kg = 9 \times 10^5 kJ \times \frac{1 kg}{2200 kJ} \approx 409 kg$$

آب تحت تأثیر قرار می‌گیرد

۳۳. گزینه ۱



$$\left. \begin{array}{l} \text{مقدار مول } Fe(OH)_3 = x \\ \text{مقدار مول } Fe(OH)_2 = y \end{array} \right\} \rightarrow \frac{y}{x} = 1,5 \rightarrow y = 1,5x$$

$$162,5x + 127b = 706 \rightarrow 162,5x + 127 \times 1,5x = 706 \rightarrow 353x = 706 \rightarrow [x = 2]$$

$$?gFeCl_4 = 2 mol \times \frac{162,5gFeCl_4}{1 molFeCl_4} = 325gFeCl_4$$

$$?gFeCl_4 = 706 - 325 = 381 gFeCl_4$$

$$FeCl_4 = \frac{381}{706} \times 100 = \% 54$$

۳۴. گزینه ۴

$$SO_4(g) \sim \text{گرما}$$

$$\frac{10 mol}{1} = \frac{xkJ}{228kJ} \Rightarrow x = 2280kJ \xrightarrow{\text{تبدیل به زوک}} 228 \times 10^4 J$$

$$q = m \cdot c \cdot \Delta\theta \rightarrow \Delta\theta = \frac{q}{m \cdot c} \rightarrow \frac{228 \times 10^4 (j)}{10,18 \times 10^3 (g) \times 4,2 \frac{j}{g \cdot ^\circ C}}$$

$$\text{افزایش دما در پنج دقیقه} = 53,3$$

$$= \frac{53,3}{5} = 10,66$$

میانگین افزایش دما در یک دقیقه


۳۵. گزینه ۴ ابتدا باید حساب کنیم هر دو نمک چند ژول گرما تولید می‌کنند.

$$22gA \times \frac{1 mol A}{11gA} \times \frac{90kJ}{1 mol A} = 18kJ = 18000J$$

$$5gB \times \frac{1 mol B}{10gB} \times \frac{40kJ}{1 mol B} = 2,5kJ = 2500J$$

$$\text{گرمای تولید شده توسط نمک } B + \text{ گرمای تولید شده توسط نمک } A = \text{ گرمای جذب شده توسط آب}$$

$$mc\Delta\theta = 18000 + 2500 = 20500J \Rightarrow \Delta\theta = \frac{20500}{mc} = \frac{20500}{200 \times 4,2} = 24,4^\circ C$$



$$CaCO_3 = 40 + 12 + (16 \times 3) = 100 \text{ g} \cdot mol^{-1}, \quad CaO = 40 + 16 = 56 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

اگر جرم $CaCO_3$ اولیه و ناخالص را ۱۰۰ و درصد خلوص را P در نظر بگیریم:





$$\text{جرم } CaCO_3 = 100 \times \frac{P}{100} = PgCaCO_3 \text{ خالص}$$

$$\text{جرم ناخالص} = CaO_{\text{جرم}} = (100 - P)g$$

$$?gCaO = PgCaCO_3 \times \frac{1 \text{ mol } CaCO_3}{100 \text{ g } CaCO_3} \times \frac{1 \text{ mol } CaO}{1 \text{ mol } CaCO_3} \times \frac{56 \text{ g } CaO}{1 \text{ mol } CaO} = \frac{56P}{100} gCaO$$

$$\frac{56P}{100} = (100 - P) \rightarrow 56P = 10000 - 100P \rightarrow P = 64$$

زیرا، بر پایه داده‌های متن این پرسشن، می‌توان نوشت:



$$\Delta H = (+48 - 48,5 + 64) kJ = +61,5 kJ / Fe_3O_4$$

به ازاء ۳ مول

$$\frac{61,5 kJ}{3 mol} = +20,5 kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\Delta m = (700 - 695) \times 10^6 = 5 \times 10^6 = 5 \times 10^6 ton = 5 \times 10^9 kg$$

$$E = mc^2 = 5 \times 10^9 kg \times (3 \times 10^8 \frac{m}{s})^2 = 45 \times 10^{25} J$$

$$E = 45 \times 10^{25} \times 60 = 27 \times 10^{27} J$$

$$?tonH_2O = 27 \times 10^{27} J \times \frac{1 \text{ mol } H_2O}{42 \times 10^3 J} \times \frac{18 \text{ g } H_2O}{1 \text{ mol } H_2O} \times \frac{1 \text{ ton } H_2O}{10^6 g H_2O} \simeq 11,57 \times 10^{18} ton$$

بنابراین $10^{12} \times 11,57$ مگا تن آب تبخیر می‌شود.

۳۹. گزینه ۴ ابتدا باید به کمک قانون هس، ΔH واکنش را به دست آوریم. برای این کار باید هر دو واکنش کمکی را معکوس کنیم و ΔH آنها را در منفی ضرب کرده و باهم جمع کنیم.
 $\Delta H_{\text{واکنش}} = -213 + 78 = -135 kJ$

سپس باید گرمای حاصل از مصرف ۱۰ مول BaO را به دست آوریم.

$$?kJ = 10 \text{ mol } BaO \times \frac{-135 kJ}{1 \text{ mol } BaO} = -1350 kJ$$

با توجه به این که واکنش گرماده است. ($\Delta H < 0$) گرمای واکنش به آب داده می‌شود و واکنش تغییر دمای آب گرمایخوارد بود. ($q > 0$)

| واکنش $= q$ | تغییر دمای آب |

$$q = m \cdot c \cdot \Delta \theta \Rightarrow 13500(g) = 200(g) \times 4,2 \left(\frac{J}{g \cdot ^\circ C} \right) \Delta \theta \Rightarrow \Delta \theta = 16^\circ C$$

$$\Delta \theta = \theta_2 - \theta_1 \Rightarrow 16 = \theta_2 - 25 \Rightarrow \theta_2 = 41^\circ C$$

$$m = 2,5 mg \times \frac{10^{-3} g}{1 mg} \times \frac{10^{-3} kg}{1 g} = 2,5 \times 10^{-6} kg$$


$$E = mc^2 \Rightarrow E = 2,5 \times 10^{-6} \times (3 \times 10^8)^2 = 22,5 \times 10^{-10} J$$

$$\frac{10}{100} \times 22,5 \times 10^{-10} = 18 \times 10^{-10} J$$


$$18 \times 10^{-10} J \times \frac{1 g}{360 J} \times \frac{1 kg}{10^3 g} \times \frac{1 ton}{10^3 kg} = 500 ton$$

۴۱. گزینه ۳ ابتدا باید به کمک واکنش داده شده ΔH واکنش مورد نظر را به دست آوریم. برای این منظور:

۱. با توجه به اینکه در واکنش اصلی (O_2) در سمت چپ معادله قرار دارد و ضریب آن برابر ۵ است، ضرایب واکنش (۵) را در عدد ۱۰ ضرب می‌کنیم:




۲. در واکنش اصلی $NH_4(g)$ در سمت چپ معادله قرار دارد و ضریب آن برابر ۴ است، پس ضرایب واکنش (۴) را در عدد ۴ ضرب می‌کنیم:



۳. در واکنش اصلی $HNO_3(l)$ نداریم، بنابراین باید ضرایب واکنش (۱) را در عدد ۲ ضرب کنیم تا ضریب $HNO_3(l)$ با ضریب این ماده در واکنش (۴) (که در سمت چپ معادله قرار دارد) یکسان شده و حذف شوند:





۴. در واکنش اصلی (۵) نداریم، بنابراین باید ضرایب واکنش (۲) را در عدد ۴ ضرب کنیم تا ضریب $NH_4NO_3(s)$ با ضریب این ماده در واکنش (۴) (که در سمت راست معادله قرار دارد) یکسان شده و حذف شوند:



۵. در واکنش اصلی $O_2(g)$ نداریم، بنابراین باید واکنش (۳) را معکوس نموده و ضرایب آن را در عدد ۴ ضرب کنیم تا ضریب $N_2O(s)$ با ضریب این ماده در واکنش (۲) (که در سمت راست معادله قرار دارد) یکسان شده و حذف شوند:



با جمع کردن واکنش‌های فوق، داریم:



$$= -142,8 - 500,8 + 623,2 - 582,8 - 566 = -1169,2 \text{ kJ}$$

حال که ΔH واکنش مورد نظر را به دست آورديم، برای حل مسئله از تناسب زیر استفاده می‌کنیم:

$$\left[\frac{(g) \text{ گرم} \times \frac{P}{100} \times \frac{R}{100}}{\text{جرم مولی} \times \text{ضریب}} \right] = \left[\frac{(Q) \text{ گرما}}{|\Delta H|} \right] \Rightarrow \frac{1,7 \times \frac{10}{100} \times \frac{5}{100}}{4 \times 17} = \frac{x}{|-1169,2|} \Rightarrow x = \frac{1,7 \times 0,8 \times 0,6 \times 1169,2}{4 \times 17} = 14,03 \simeq 14 \text{ kJ}$$

۴۲. گزینه ۳

$$? g H_2O = 324 \text{ g} \times \frac{10^3 \text{ mL}}{1 \text{ m}^3} \times \frac{1 \text{ g}}{1 \text{ mL}} = 324 \times 10^3 \text{ g H}_2O$$

$$? J = 324 \times 10^3 \text{ g H}_2O \times \frac{1 \text{ mol H}_2O}{1 \text{ kg H}_2O} \times \frac{42 \text{ kJ}}{1 \text{ mol H}_2O} \times \frac{10^3 \text{ J}}{1 \text{ kJ}} = 756 \times 10^9 \text{ J}$$

$$E = mc^2 \Rightarrow 756 \times 10^9 = m \times (3 \times 10^8)^2$$

$$\Rightarrow m = \frac{756 \times 10^9}{9 \times 10^{16}} = 84 \times 10^{-7} \text{ kg} = 84 \times 10^{-4} \text{ g} \quad (\text{جرم ماده‌ای که به انرژی تبدیل شده})$$




$$= 1 - 84 \times 10^{-4} = 0,9916 \text{ g} \quad \text{جرم باقی‌مانده از واکنش هسته‌ای}$$

۴۳. گزینه ۲ ابتدا باید ΔH واکنش (۲) را به کمک ΔH واکنش‌های داده شده تعیین نماییم. برای این منظور:

۱. واکنش «ب» را معکوس می‌کنیم.

۲. واکنش «ب» را معکوس کرده و ضرایب آن را در عدد (۲) ضرب می‌کنیم.


۳. ضرایب واکنش «آ» را در عدد ۲ ضرب می‌کنیم.



حالا که ΔH واکنش را به دست آوردهیم، بقیه محاسبات را می‌توانیم انجام بدیم:

$$\left[\frac{(N_{\text{O}_2})}{(g) \times \frac{P}{100}} \right] = \left[\frac{(Q) \text{ کرم}}{|\Delta H|} \right] \Rightarrow \frac{2,16 \times \frac{100}{100}}{2 \times 108} = \frac{x}{110} \Rightarrow x = \frac{2,16 \times 0,8 \times 110}{2 \times 108} = \frac{2,16 \times 8 \times 10^{-3} \times 110}{2 \times 108} = 0,88 \text{ kJ} = 880 \text{ J}$$

۴۴. گزینه ۱ برای تشکیل صابون جامد، باید اسید چرب داده شده با $NaOH$ واکنش دهد:



جرم مولی ۱ ($C_{17}H_{35}COO)_2Ca = 606$ و $C_{17}H_{35}COOH = 284 \text{ g} \cdot mol^{-1}$ می‌باشد.


$$\begin{aligned} ?g(RCOO)_2Ca &= 56,8 \text{ g RCOOH} \times \frac{1 \text{ mol RCOOH}}{284 \text{ g RCOOH}} \times \frac{1 \text{ mol RCOONa}}{1 \text{ mol RCOOH}} \times \frac{1 \text{ mol (RCOO)}_2Ca}{2 \text{ mol RCOONa}} \\ &\times \frac{606 \text{ g (RCOO)}_2Ca}{1 \text{ mol (RCOO)}_2Ca} = 50,6 \text{ g (RCOO)}_2Ca \end{aligned}$$

روش دوم: تناسب

واکنش اول را برای یکسان شدن ضرایب ماده مشترک ($C_{17}H_{35}COONa$) در دو ضرب می‌کنیم:

$$\begin{aligned} & \frac{56,8 \text{ g}}{2 \times 284} = \frac{x \text{ g}}{606} \\ & \Rightarrow \frac{56,8}{568} = \frac{x}{606} \Rightarrow x = 50,6 \text{ g} \end{aligned}$$

۴۵. گزینه ۳ زیرا، با توجه به داده‌های متن این پرسش، می‌توان نوشت:



$$4,8 \text{ g} \div 32 \text{ g} \cdot mol^{-1} = 0,15 \text{ mol } CH_3OH$$

$$0,15 \text{ mol} \times \frac{4 \text{ g}}{100} = 0,06 \text{ mol} \Rightarrow CH_3OH = \frac{0,06 \text{ mol}}{\frac{2}{60} \text{ min}} = 0,18 \text{ mol} \cdot min^{-1}$$


$$\frac{1 \text{ mol } CH_3OH}{0,06 \text{ mol } CH_3OH} = \frac{3 \times 22,4 L(g)}{x} \quad \text{تناسب:}$$

$$x = \frac{0,06 \text{ mol } CH_3OH \times 3 \times 22,4 L(g)}{1 \text{ mol } CH_3OH} \approx 4 L$$

۴۶. گزینه ۱

$$\begin{aligned} E &= mc^2 = \left(\frac{2,4}{12} \times 1,2 \times 10^{-3} \text{ g} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times (3 \times 10^8 \text{ m} \cdot s^{-1})^2 = 0,2 \times 1,2 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 9 \times 10^{16} = 2,16 \times 10^{10} \text{ J} \\ &= 2,16 \times 10^7 \text{ kJ} \end{aligned}$$


۴۷. گزینه ۱



$$\bar{R}_{N_2} = 1,6 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1} \times 20L = 3,2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot s^{-1}$$

$$? \text{ min} = 3,8,784 \text{ g } KNO_3 \times \frac{1 \text{ mol } KNO_3}{101 \text{ g } KNO_3} \times \frac{2 \text{ mol } N_2}{4 \text{ mol } KNO_3} \times \frac{1 \text{ s}}{3,2 \times 10^{-3} \text{ mol } N_2} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 1 \text{ min}$$

۴۸. گزینه ۲ فرمول صابون جامد ۲۰ کربن به صورت $C_{19}H_{39}COO^-Na^+$ می‌باشد و واکنش این صابون با منزیم کلرید به صورت زیر است:




از غلظت نمک خوارکی ($NaCl$) حاصل به مقدار صابون شرکت کرده در واکنش می‌رسیم:

$$?g = \frac{2,5 \times 10^{-3} \text{ mol } NaCl}{1L \text{ محلول}} \times \frac{4 \text{ mol}}{2 \text{ mol } NaCl} \times \frac{334 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 3,34 \text{ g} \quad \text{صابون} = \text{صابون}$$

$$= \frac{16,7 - 3,34}{16,7} \times 100 = 80\%$$

۴۹. گزینه ۳ زیرا، برای این داده‌های متن این پرسش، داریم:



$$\bar{R}_{N_2} = 1,6 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1} \times 20L = 3,2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot s^{-1}$$

$$?g = 1,5 \text{ min} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \times \frac{3,2 \times 10^{-3} \text{ mol } N_2}{1 \text{ s}} \times \frac{4 \text{ mol } KNO_3}{2 \text{ mol } N_2} \times \frac{101 \text{ g } KNO_3}{1 \text{ mol } KNO_3} = 58,176 \text{ g } KNO_3$$

۵۰. گزینه ۱

$$E = 10^5 \times 243 J$$

ابتدا انرژی لازم برای ذوب ۱۰۰ کیلوگرم آهن را محاسبه می‌کنیم:


حال جرم لازم برای تولید این انرژی را محاسبه می‌کنیم:

$$E = mc^2 \Rightarrow 243 \times 10^5 = m \times 9 \times 10^{19} \Rightarrow m = 2,7 \times 10^{-10} kg = 2,7 \times 10^{-4} g$$


بنابراین داریم:

$$2,7 \times 10^{-4} g \times \frac{1 mol O}{1,2 \times 10^{-4} \text{ کاهش جرم}} \times \frac{16 g O}{1 mol O} = 3,6 \times 10^{-2} g O$$


۵۱. گزینه ۲ ابتدا واکنش را موازن می‌کنیم، به ترکیب پیچیده‌تر ضرب (۱) بدھیم فقط Cu قابل موازن است.



برای ادامه موازن از ضربهای پارامتری استفاده می‌کنیم. اگر به HNO_3 ضرب a بدھیم برای موازن H_2O باید به NO_2 باید ضرب $(a - 2)$ بدھیم.



$$O \text{ موازن}: 3a = 6 + 2a - 4 + \frac{a}{2} \Rightarrow \frac{a}{2} = 2 \Rightarrow a = 4$$



$$94 g Cu(NO_3)_2 \times \frac{1 mol}{188 g Cu(NO_3)_2} \times \frac{2 mol NO_2}{1 mol} \times \frac{24000 mL}{1 mol NO_2} = 24000 mL$$

$$\bar{R}_{NO_2} \left(\frac{mL}{S} \right) = \frac{24000 mL}{600 s} = 40 mL \cdot s^{-1}$$

۵۲. گزینه ۲

$$0,4 g He \times \frac{1 mol He}{4 g} \times \frac{0,0024}{1 mol He} = 24 \times 10^{-5} g \text{ تبدیل ماده به انرژی}$$

$$E = mc^2 = (24 \times 10^{-5})(3 \times 10^8)^2 = 216 \times 10^8 J$$

$$216 \times 10^8 J \times \frac{1 g Fe}{240 J} \times \frac{1 ton Fe}{10^6 g Fe} \times \frac{1 day}{1 ton} = 90 day$$

۵۳. گزینه ۴ جزو اسیدهای قوی بوده و $\alpha = 1$ است؛ بنابراین $[HCl] = [H^+]$ می‌باشد.

$$[HCl] = \frac{mol_{HCl}}{V} \Rightarrow \frac{\frac{10^{-3} mol}{22,4}}{0,5} = 4 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$$


$$\rightarrow [H^+] = 4 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$$

$$pH = -\log 4 \times 10^{-3} = 3 - \log 4 = 3 - 0,6 = 2,4$$

$$[H^+][OH^-] = 10^{-14} \rightarrow [OH^-] = \frac{10^{-14}}{4 \times 10^{-3}} \rightarrow [OH^-] = \frac{1}{4} \times 10^{-11} mol \cdot L^{-1}$$

$$\frac{[H^+]}{[OH^-]} = \frac{4 \times 10^{-3}}{\frac{1}{4} \times 10^{-11}} = 1,6 \times 10^9$$

ابتدا با استفاده از معادله موازن شده واکنش زیر، فرمول مولکولی اسیدچرب را بدست می‌آوریم گزینه ۱.



$$71 g C_n H_{n+1} COOH = 12,5 g NaOH \text{ ناخالص}$$

$$\times \frac{80 g NaOH \text{ ناخالص}}{100 g NaOH \text{ خالص}} \times \frac{1 mol NaOH}{40 g NaOH} \times \frac{1 mol C_n H_{n+1} COOH}{1 mol NaOH}$$

$$\times \frac{(12n + 2n + 1 + 12 + 32 + 1)g C_n H_{n+1} COOH}{1 mol C_n H_{n+1} COOH}$$

$$71 = \frac{1}{4} \times (14n + 46) \Rightarrow 284 = 14n + 46 \Rightarrow n = 17$$

اکنون فرمول شیمیایی صابون را نوشته و جرم مولی آن را محاسبه می‌کنیم:

$$C_{17} H_{35} COONa = 306 g \cdot mol^{-1}$$

۵۵. گزینه ۳ با توجه به داده‌های مسئله می‌توان نوشت:

مسائل چالشی شیمی کنکور

$$HA \Rightarrow [H^+] = M \cdot n \cdot \alpha \Rightarrow 10^{-1,8} = x \times 1 \times 10^{-0,3} \Rightarrow x = \frac{10^{-1,8}}{10^{-0,3}} = 10^{-1,5}$$

$$HB \Rightarrow [H^+] = M \cdot n \cdot \alpha \Rightarrow 10^{-0,6} = y \times 1 \times 10^{-1,8} \Rightarrow y = \frac{10^{-0,6}}{10^{-1,8}} = 10^{-3,8}$$

و در ادامه داریم:

$$\frac{y}{x} = \frac{10^{-3,8}}{10^{-1,5}} = 10^{-2,3}$$


۵۶. گزینه ۳



$$\frac{0,2 \times \frac{1}{2}}{1} = \frac{0,2}{M} \Rightarrow M = 292 g \cdot mol^{-1}$$

حجم مولی صابون

حجم مولی اسید چرب:



$$3n + 1 = 3 \times 16 + 1 = 49$$

۵۷. گزینه ۳ نمودار داده شده متعلق به KNO_3 است، پس باید Δn آن را از روی حجم داده شده برای اکسیژن محاسبه کنیم:

$$1LO_2 \times \frac{0,4g O_2}{1LO_2} \times \frac{1mol O_2}{32g O_2} \times \frac{2mol KNO_3}{1mol O_2} = 0,025 mol KNO_3 = \Delta n_{KNO_3}$$

$$\begin{array}{rcl} 0,03 & - & 0,025 \\ | & | & | \\ \text{نحوه اولیه} & \text{تغییرات مول} & \text{مقدار پایانی} \end{array} = 0,005 mol KNO_3$$

۵۸. گزینه ۴



کافی است جرم گاز تولید شده را محاسبه کرده از جرم کم کنیم تا جرم جامد به جا مانده در ظرف بدست آید.

روش اول: $NaHCO_3$ را با A نشان می دهم.

$$20g Ax \frac{84}{100} \times \frac{50}{100} \times \frac{1mol A}{84g} \times \frac{(1mol CO_2 + 1mol H_2O)}{2mol A} \times \frac{(44 + 18)g}{(1mol CO_2 + 1mol H_2O)} = 3,1g$$

گاز جامد های باقی مانده = ۲۰ - ۳,۱ = ۱۶,۹g

روش دوم:

$$\frac{20 \times 84 \times 50}{2 \times 84 \times 100 \times 100} = \frac{xg}{44 + 18} \Rightarrow x = 3,1g$$

گاز جامد باقی مانده = ۲۰ - ۳,۱ = ۱۶,۹g

۵۹. گزینه ۳ در شروع واکنش غلظت H^+ یک مولار و $pH = 0$ است و با گذشت ۱۰۰ ثانیه غلظت A به میزان $0,06 mol^{-1}$ کاهش می یابد. بنابراین مقدار غلظت H^+ نیز به دلیل برابر بودن ضریب A و H^+ به همین میزان کاهش می یابد. پس:

$$[H^+] = 1 - 0,6 = 0,4$$

$$\begin{aligned} PH &= -\log[H^+] \rightarrow -\log 0,4 = -\log 4 \times 10^{-1} \\ &= 1 - \log 4 = 1 - 2 \log 2 = 1 - 2 \times 0,3 = 0,4 \end{aligned}$$

با توجه به گزینه ها، در گزینه ۳ در ثانیه ۱۰۰ مقدار pH برابر ۰ است.

۶. گزینه ۱

۶. واکنش موازن شده:

$$6NH_3(g) + 4NO_2(g) \rightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$$

$$68kg NH_3 \times \frac{70}{100} \times \frac{1000g}{1kg} \times \frac{1mol NH_3}{17g NH_3} \times \frac{4mol NO_2}{4mol NH_3} \times \frac{46g NO_2}{1mol NO_2} \times \frac{100g}{92g} = 1,4 \times 10^5 g NO_2$$

روش دوم:

$$\frac{68 \times 10^3 g \times 70}{4 \times 17 \times 100} = \frac{xg}{4 \times 46 \times 100}$$

$$x = 1,4 \times 10^5 g NO_2$$

$$[H^+] = M \cdot \alpha$$


$$M = \frac{n}{V} \Rightarrow \frac{2,5 \times 10^{-4} mol}{1 \times 10^{-4} L} = 2,5 \times 10^{-4} mol \cdot L^{-1}$$

$$pH = 5 \Rightarrow [H^+] = 10^{-pH} \Rightarrow [H^+] = 10^{-5}$$

$$10^{-5} = 2,5 \times 10^{-4} \times \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2,5} = 0,04$$

$\alpha\% = 0,04 \times 100 = 4$ (درجه تفکیک یونی) $= \alpha$ (درصد تفکیک یونی)

۶۲. گزینه ۴ ابتدا مقدار اولیه $Al_3(O_4)_3$ را به دست می آوریم (در مدت ۸ دقیقه، ۱ لیتر مول Al_3O_3 تشکیل شده است).



$$\frac{mol \times \frac{R}{100}}{\text{ضریب}} = \frac{Al_3O_3}{mol} \Rightarrow \frac{x \times \frac{100}{100}}{1} = \frac{0,1}{1} \Rightarrow x = \frac{0,1}{0,1} = \frac{1}{1} = 0,125 mol Al_3(O_4)_3(g)$$

و برای حل قسمت دوم مسأله می توان نوشت (مقدار اولیه Al_3O_3 ، صفر مول است).

$$\frac{\bar{R}(Al_3O_3)_{(s \rightarrow g)}}{\bar{R}(Al_3O_3)_{(g \rightarrow f)}} = 3 \Rightarrow \frac{\frac{\Delta n(Al_3O_3)}{\Delta t}}{\frac{\Delta n(Al_3O_3)}{\Delta t}} = \frac{\cancel{x}}{\cancel{0,1-x}} = 3 \rightarrow x = 3(0,1-x) \Rightarrow 4x = 0,24 \Rightarrow x = \frac{0,24}{4} = 0,06$$

۶۳. گزینه ۴

ابتدا pH قبل از واکنش را تعیین می کنیم:

$$[OH^-] = 1 \frac{mol}{L} \Rightarrow pOH = 0 \rightarrow pH = 14$$

مقدار OH^- مصرف شده طی ۲ ساعت را محاسبه می کنیم:

$$x \text{ مول} : \frac{2,8}{22400} = 0,00125 mol \cdot min^{-1}$$

$$\bar{R}_{OH^-} = 2\bar{R}_x \Rightarrow mol_{OH^-} = 0,0025 mol \cdot min^{-1} \Rightarrow \frac{0,0025 mol}{x} \simeq \frac{1 min}{120 min}$$

$$x = 0,025 mol$$

$$[OH^-] = \frac{0,025}{0,5} = 0,05 \frac{mol}{L}$$

$$[OH^-] = 1 - 0,05 = 0,95 \frac{mol}{L}$$

$$pOH = -\log 0,95 = 0,05 \rightarrow pH = 13,95$$


$$\Delta pH = 14 - 13,95 = 0,05$$

۶۴. گزینه ۲

$$16 = \frac{S \text{ گرم}}{100 \text{ g}} \times 10^4 \Rightarrow S = 16 g \xrightarrow{\div 10^4} 0,016 mol S$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 mol S \rightarrow 1 mol H_3SO_4 \\ 0,016 mol S \rightarrow 0,016 mol H_3SO_4 \end{array} \right\}$$

$$\text{اولیه KOH} : \frac{224}{56} = 4 mol KOH$$



$$\frac{0,016 mol}{1 mol} = \frac{x}{2 mol} \Rightarrow x = 0,032 mol KOH$$

مول پتاسیم هیدروکسید پس از واکنش:

$$4 - 1 = 3 mol$$

$$[KOH] = [OH^-] = \frac{3}{100} \frac{mol}{L} \Rightarrow pOH = -\log 3 \times 10^{-4}$$

$$pOH = 2 - 0,5 = 1,5 \rightarrow pH = 12,5$$

۶۵. گزینه ۲

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-3}$$

برای اسید ضعیف تر داریم:

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{C_M} \Rightarrow 2 \times 10^{-5} = \frac{(10^{-3})^2}{C_M} \Rightarrow C_M = 5 \times 10^{-2}$$

برای اسید قوی تر داریم:

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{C'_M - [H^+]} \Rightarrow 2 \times 10^{-3} = \frac{(10^{-3})^2}{C'_M - 10^{-3}}$$


$$C'_M - 10^{-3} = 5 \times 10^{-4} \Rightarrow C'_M = 5 \times 10^{-4} + 10^{-3} = 15 \times 10^{-4}$$

$$\frac{C'_M}{C_M} = \frac{15 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-3}} = 0,03$$

۶۶. گزینه ۲ ابتدا جرم گاز اتن را به دست می آوریم:


$$\frac{\text{جرم}}{\text{حجم}} = \frac{xg}{200L} \Rightarrow 1,6 = \frac{xg}{200L} \Rightarrow x = 320gC_2H_4$$

سپس با توجه به معادله واکنش پلیمر شدن، مقدار n را به دست می آوریم:





$$\left[\frac{\frac{\text{اتن}}{\text{گرم}}(g)}{\frac{\text{بلیط}}{\text{مول}}mol} \right] = \left[\frac{\text{بلیط}}{\text{ضریب}} \right] \Rightarrow \frac{320}{n \times 28} = \frac{1,2 \times 10^{-5}}{1} \Rightarrow n = \frac{320}{28 \times 1,2 \times 10^{-5}} = 952380,9 \simeq 9,5 \times 10^5$$

۶۷. گزینه ۲ فراورده واکنش، یک آلکان هالوژن دار است و پیوند C ندارد، بنابراین نمی تواند در واکنش پلیمری شدن شرکت کند:



بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: برای محاسبه ΔH واکنش می توان نوشت:




$$\Delta H_{\text{واکنش}} = [\Delta H(C = C) + \Delta H(Cl - Cl)] - [-\Delta H(C - C) + 2\Delta H(C - Cl)] = [614 + 242] - [348 + 2(330)] = -152kJ$$

پس به ازای یک مول ۱۵۲kJ گرم افزایش دارد، به این ترتیب خواهیم داشت:


$$14gC_2H_4 \times \frac{1\text{mol}C_2H_4}{2\lambda gC_2H_4} \times \frac{152kJ}{1\text{mol}C_2H_4} = 76kJ$$

گزینه ۳: با توجه به صفحه ۱۲۱ کتاب درسی، کاتالیزگر واکنش گاز اتن با گاز کلر، $FeCl_3$ است که سبب افزایش سرعت واکنش می شود.

گزینه ۴: اگر از فراورده واکنش مورد نظر یک مولکول HCl جدا شود به وینیل کلرید می رسیم که این ماده بر اثر بسیارش به پلی وینیل کلرید است، تبدیل می شود:




۶۸. گزینه ۴ معادله سوختن کامل یک الکل سیرشدۀ یک عاملی ($C_nH_{2n+2}O$) به صورت زیر است:



مطابق واکنش فوق، به ازای سوختن یک مول الکل، n مول CO_2 و $(n+1)$ مول H_2O تشکیل می شود، پس:

$$0,01(nCO_2) - (n+1)H_2O = 1,12 \Rightarrow 0,01(44n - 18(n+1)) = 1,12 \Rightarrow 26n - 18 = \frac{1,12}{0,01} \Rightarrow n = \frac{18 + 112}{26} = 5 \Rightarrow C_5H_{12}O$$

پس الکل مورد نظر دارای ۵ اتم کربن است و در میان گزینه های مطرح شده فقط گزینه ۴ یک الکل ۵ کربنه است.




$$\frac{1 mol}{102 g} \times \frac{1 mol}{102 g} \times \frac{74 g}{1 mol} = 7.4 g$$

$$\frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 = \frac{7}{7.4} = 94\%$$

$$pH = 9 \rightarrow [OH^-] = 10^{-5} mol \cdot L^{-1}$$

$$[Mg^{2+}] \times (10^{-5})^2 = 1.5 \times 10^{-11} \rightarrow [Mg^{2+}] = 0.15 mol \cdot L^{-1}$$



برای آنکه غلظت یون Mg^{2+} برابر با ۱۵٪ باشد باید غلظت $MgSO_4$ برابر با ۱۵٪ باشد.

$$10^{-POH} = M \cdot n \cdot \alpha = 1 \times 1 \times \alpha$$

$$POH = -\log \alpha$$

یک بار α و یک بار ۵٪ در نظر می‌گیریم.

$$\alpha = 1 \rightarrow \% \alpha = 100$$

$$POH = -\log 1 = 0 \Rightarrow PH = 14$$

$$POH = -\log 0.5 = -\log \frac{1}{2} = -\log 2^{-1} = \log 2 = 0.3 \Rightarrow PH = 13.7$$

پس گزینه ۴ صحیح است چون ۱۳.۷ به ۱۴ نزدیک‌تر است.

۷۲. گزینه ۱ ابتدا تعداد مول OH^- موجود در محلول را محاسبه می‌کنیم.

$$PH = 13.5 \Rightarrow pOH = 0.5$$

$$[OH^-] = 10^{-0.5} = 10^{0.5-1} = 0.3 mol \cdot L^{-1}$$


$$?mol OH^- = 0.3(L) \times 0.3(mol \cdot L^{-1}) = 0.12 mol$$

$$?g Mg(OH)_2 = 0.12 mol OH^- \times \frac{1 mol Mg(OH)_2}{4 mol OH^-} \times \frac{58 g Mg(OH)_2}{1 mol Mg(OH)_2} = 3.48 g Mg(OH)_2$$

البته با مجھول فرض کردن ظرفیت باز و جرم مولی آن و جای گذاری گزینه‌ها نیز می‌توان به گزینه صحیح رسید!

$$C_M HCl = \frac{11.2 mL \times \frac{1 mol}{12.0 mol}}{25 \times 10^{-3} L} = 0.02 mol \cdot L^{-1} \Rightarrow [H^+] = 0.02 \times 1 \times 1 = 2 \times 10^{-2}$$

$$pH = -\log 2 \times 10^{-2} = 2 - \log 2 = 1.7$$




روش اول:

$$1 mol HCl \times \frac{0.02 mol}{1 L HCl} \times \frac{1 mol CaCO_3}{1 mol HCl} \times \frac{100 g}{1 mol CaCO_3} = 1 mg$$

روش دوم:

$$\frac{1 mol \times 0.02 mol HCl}{2 mol} = \frac{x mg CaCO_3}{100 g} \Rightarrow x = 1 mg$$


$$n = M \times V \rightarrow 0.02 \times \frac{1}{1000} = \frac{1}{2000} mol HCl$$



با توجه به ضرایب استوکیومتری اسیدها تعداد مول HNO_3 مصرفی با HCl تولید شده برابر است. پس تعداد مول اسید در واکنش تغییر نمی‌کند اما حجم محلول دو برابر شده است. پس غلظت جدید اسید را محاسبه می‌کنیم.


$$(50\text{mL} HNO_3 \text{ غلظت مولی}) M = \frac{n}{V} \Rightarrow \frac{\frac{1}{1000} \text{mol}}{\frac{50}{1000} \text{L}} = \frac{1}{10} = 10^{-1} \text{mol} \cdot L^{-1}$$

$$[HCl] = 10^{-1} \text{M} \Rightarrow PH = 2$$



$$\begin{array}{l} xg \quad \frac{1}{1000} \text{mol} \\ 40 \sim 1 \Rightarrow \frac{x}{40} = \frac{\frac{1}{1000}}{1} \Rightarrow x = \frac{2}{100} g \Rightarrow 20 \text{mg} \end{array}$$


۷۵. گزینه ۱ زیرا، بر پایه داده‌های متن این پرسش، داریم:



$$\frac{\Delta 4g N_2O_5}{108} = \frac{1L \times x_M}{2} \quad x = 0,1$$

$$\downarrow \alpha = 1$$

$$[H^+] = 10^{-1} \Rightarrow pH = 1$$



$$100\text{mL} \times 0,1 \text{mol} \cdot L^{-1} \times 1 = V \times 0,05 \text{mol} \cdot L^{-1} \times 1$$

$$V = 200\text{mL}$$

۷۶. گزینه ۲ از آنجا که محلول باقیمانده برابر ۱۱ است می‌توان دریافت که محلول حاصل خاصیت بازی دارد و تعداد مول یون OH^- بیشتر از تعداد مول H^+ است: $[OH^-] = \frac{(mol)_{OH^-} - (mol)_{H^+}}{V_{ک}} = \frac{(mol)_{OH^-} - (mol)_{H^+}}{100}$

$$KOH \Rightarrow n = \frac{(g)}{\text{جرم مولی}} = \frac{168 \times 10^{-3}}{56} = 3 \times 10^{-3} \text{mol} OH^-$$

ابتدا تعداد مول OH^- را به دست می‌آوریم:

$$pH = 11 \Rightarrow pOH = 3 \Rightarrow [OH^-] = 10^{-pOH} = 10^{-3} \text{mol} \cdot L^{-1}$$

و سپس می‌توان نوشت:

$$[OH^-] = \frac{(mol)_{OH^-} - (mol)_{H^+}}{V_{ک}} \Rightarrow 10^{-3} = \frac{3 \times 10^{-3} - (mol)_{H^+}}{100} \Rightarrow (mol)_{H^+} = 10^{-3} \text{mol}$$

و در پایان با توجه به معادله انحلال N_2O_5 در آب می‌توان نوشت:

$$\frac{(N_2O_5)}{(g)} = \frac{(H^+)}{\text{ضریب جرم مولی} \times \text{ضریب}} \Rightarrow \frac{x}{1 \times 108} = \frac{10^{-3}}{2} \Rightarrow x = \frac{108 \times 10^{-3}}{2} = 54 \times 10^{-3} = 0,054 \text{g} N_2O_5$$

۷۷. گزینه ۳

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-1} \text{M}$$

$$[H^+][OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [OH^-] = 10^{-14} \text{M}$$

$$100 \cancel{m^3} \times \frac{10^{-3} \cancel{L/l}}{1 \cancel{m^3}} \times \frac{10^{-4} \cancel{mol OH^-}}{1 \cancel{L/l}} \times \frac{1 \cancel{mol HCl}}{1 \cancel{mol OH^-}} \times \frac{36,5 \cancel{g HCl}}{1 \cancel{mol HCl}} \times \frac{100 \cancel{g \cancel{HCl}}}{36,5 \cancel{g HCl}} \times \frac{1 ml \text{ محلول}}{1,2 \cancel{g \cancel{HCl}}} = 833 ml$$

۷۸. گزینه ۲

$$pH = 1 \rightarrow [H^+] = 10^{-1} \rightarrow M_{\text{ محلول نهایی}} = 10^{-1}$$


چون محلول نهایی هنوز غلظت اسیدی دارد ($pH = 1$)، پس مقدار اسید از مقدار باز بیشتر بوده است:

$$M = \frac{\text{مول باز} - \text{مول اولیه اسید}}{\text{حجم کل}} \Rightarrow 10^{-1} = \frac{\text{مول اسید}}{10^{-1}} = \frac{1/4}{10^{-1}}$$

$$\Rightarrow \text{مول اسید} = \frac{n}{V} = \frac{0.05}{0.01} = 0.05 \text{ mol}$$

$$M = \frac{10ad}{\text{جرم مولی}} \Rightarrow a = \frac{10 \times d \times 0.05}{0.01} = 20$$

۷۹. گزینه ۴



$$PH = 13 \Rightarrow POH = 1 \Rightarrow [OH^-] = 10^{-1} = C_m \text{ جدید}$$

پس غلظت $NaOH$ از یک مولار به ۱۰ مولار می‌رسد.

$$2L \times (1 - 0.1) = 1.8 \text{ mol} \text{ مصرف شده } NaOH$$

$$R_{H_2} = \frac{mL}{s} \times \frac{1L}{1000mL} \times \frac{1mol}{25L} = 0.002 \frac{mol}{s}$$

$$RNaOH = \frac{2}{3} R_{H_2} = \frac{2 \times 0.002}{3} = \frac{4}{3000} \frac{mol}{s} = \frac{1.8}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = 1350 \text{ s}$$

۸۰. گزینه ۱ از آنجا که pH محلول باقی‌مانده برابر ۱۰ است می‌توان دریافت که محلول حاصل خاصیت اسیدی دارد و تعداد مول $H^+(aq)$ بیشتر از تعداد مول $OH^-(aq)$ است:

$$[H^+] = \frac{(mol)_{H^+} - (mol)_{OH^-}}{V_{کل}}$$

$$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^- \quad Ba(OH)_2 \Rightarrow n = \frac{\text{گرم}}{\text{جرم مولی}} = \frac{10.24}{171} = 0.06 \text{ mol} \quad Ba(OH)_2 \Rightarrow 0.12 \text{ mol } OH^- \quad \text{ابتدا تعداد مول } OH^-(aq) \text{ را به دست می‌آوریم:}$$


$$pH = 10 \Rightarrow 10^{-10} = \frac{(mol)_{H^+} - 0.12}{0.1}$$

$$10^{-1} \times 10^{-10} = \frac{x - 0.12}{0.1}$$

$$10^{-1} \times (10^{-1})^2 = \frac{x - 0.12}{0.1}$$

$$0.1 \times (10^{-1}) \times (10^{-1})^2 = x - 0.12 \Rightarrow x = 0.2 \text{ mol } H^+$$

و سپس، می‌توان نوشت:




از آنجا که هر مول HCl یک مول H^+ تولید می‌کند،

$$\frac{n(mol)}{V(L)} = M = \frac{10 \overbrace{a}^{\text{چگالی درصد جرمی}} \overbrace{d}^{\text{جرم مولی}}}{\underbrace{0.1}_{\text{حجم اولیه}}} = \frac{10 \times a \times 1.25}{0.04} = \frac{10 \times 0.125}{0.04} = 31.25 \text{ mol/L}$$

$$\Rightarrow (HCl) = \frac{31.25 \times 0.2}{12.5 \times 0.04} = 14.6\%$$

۸۱. گزینه ۱



$$7C + 6(+1) + 2(-2) = 0 \rightarrow 7x = -2$$


لازم به ذکر است جمع جبری اعداد اکسایش کربن همان $7x = -2$ است.

$$K_2S : 2(+1) + S = 0 \rightarrow S = -2$$


۸۲. گزینه ۴ نکته: هنگام سوختن کامل ترکیبات آلی همواره کربن دی‌اکسید و بخار آب حاصل می‌شود.




واکنش سوختن ترکیب‌های داده شده را می‌نویسیم و تغییر عدد اکسایش یک اتم کربن (C) در آنها را محاسبه می‌کنیم



بنابراین کربن طی واکنش ۷ درجه اکسایش یافته است.




بنابراین کربن طی واکنش ۶ درجه اکسایش یافته است.



بنابراین کربن طی واکنش ۵ درجه اکسایش یافته است.

مسائل چالشی شیمی کنکور

بنابراین کربن طی واکنش ۵ درجه اکسایش یافته است.







بنابراین تغییر عدد اکسایش کربن موجود در بنزن و اتین هر دو یکسان است (۵ درجه اکسایش) بنابراین گزینه چهارم پاسخ تست است.

راه ساده‌تر:




با توجه به اینکه تغییر عدد اکسایش کربن در بنزن کامل دار سوختن کاملاً همچو هیدروکربن‌ها، CO_2 است برای آنکه تغییر عدد اکسایش کربن در دو هیدروکربن با هم برابر باشد که این مورد فقط در گزینه ۴ رخ داده است.

۸۳. گزینه ۴ زیرا، داریم:




۸۴. گزینه ۱ واکنش گزینه ۲ از نوع اکسایش-کاهش نیست (حذف گزینه ۳). از میان واکنش‌های دیگر گزینه‌ها که همگی از نوع اکسایش-کاهش هستند و در زیر آمدند. پس از موازنه،

بزرگ‌ترین نسبت مولی در واکنش گزینه ۱ مشاهده می‌شود:



۸۵. گزینه ۴



همان‌طور که مشاهده می‌کنید در صورتی که $2x$ مول CO در این واکنش مصرف شود x مول O_2 مصرف شده و $2x$ مول CO_2 تولید می‌شود، پس به‌طور کلی می‌توان گفت در صورت واکنش $2x$ مول CO گازی از مجموع مخلوط گازی x مول کم می‌شود.

با توجه به توضیحات داده شده مقدار حجم و لیتر گاز در این جا نماینده مول است. گاز کم شده از مخلوط نصف مقدار کربن مونوکسید مصرف شده است.


$$2 \times (2240 - 2049,6) = 380,8 \text{ L } CO \rightarrow 380,8 \text{ L } CO \times \frac{1 \text{ mol } CO}{22/4 \text{ L } CO} \times \frac{2 \text{ mol}}{1 \text{ mol } CO} = 34 \text{ mol}$$

مابقی مخلوط اولیه، گاز اکسیژن بوده است.

$$2240 - 380,8 = 1859,2 \text{ L } O_2 \rightarrow 1859,2 \text{ L } O_2 \times \frac{1 \text{ mol } O_2}{22/4 \text{ L } O_2} \times \frac{4 \text{ mol}}{1 \text{ mol } O_2} = 332 \text{ mol}$$

$\frac{34 \text{ mol}}{332 \text{ mol}} \Rightarrow 366 \text{ mol}$ جفت الکترون‌های ناپیوندی

۸۶. گزینه ۳ معادله موازنۀ شده واکشن:



در شرایط STP آب به صورت گاز نیست:

گاز $?L$: در شرایط STP

$$= 45,4 g C_6H_5N_3O_9 \times \frac{1 \text{ mol } C_6H_5N_3O_9}{227 g C_6H_5N_3O_9} \times \frac{19 \text{ mol}}{4 \text{ mol } C_6H_5N_3O_9} \times \frac{22/4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 21,28 L$$

حجم فرآورده‌ها در دمای $273^\circ C$ و فشار 1 atm :

در این شرایط آب به صورت بخار است. برای حل ابتدا حجم فرآورده را در شرایط STP به دست می‌آوریم، سپس به کمک رابطه گازها حجم فرآورده را محاسبه می‌کنیم:
گاز $?L$: در شرایط STP


$$= 45,4 g C_6H_5N_3O_9 \times \frac{1 \text{ mol } C_6H_5N_3O_9}{227 g C_6H_5N_3O_9} \times \frac{29 \text{ mol}}{4 \text{ mol } C_6H_5N_3O_9} \times \frac{22/4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 32,48 L$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{32,48}{273} = \frac{V_2}{546} \Rightarrow V_2 = 64,96 L$$


$$\frac{21,28}{64,96} \approx \frac{1}{3}$$

۸۷. گزینه ۴

با توجه به واکشن هابر، داریم:




$$336L NH_3 \times \frac{1l N_2}{2l NH_3} \times \frac{1mol N_2}{22.4l N_2} = 1.5 mol N_2 = a$$



$$b = 1 + 2 + 2 + 1 = 6 \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{1.5}{6} = 0.25$$

۸۸. گزینه ۴ مس با HCl واکنش نمی‌دهد پس، از حجم گاز H_2 حاصل می‌توان جرم روی موجود در نمونه اولیه را محاسبه کرد.



$$2.24LH_2 \times \frac{1mol}{22.4L} \times \frac{1molZn}{1molH_2} \times \frac{65g}{1molZn} = 6.5g Zn$$

$$32.5 - 6.5 = 26g Cu \Rightarrow Cu = \frac{26}{32.5} \times 100 = 80 \text{ گرم مس}$$

$$2.24LH_2 \times \frac{1molH_2}{22.4L} \times \frac{2molHCl}{1molH_2} \times \frac{1L}{4molHCl} \times \frac{1000ml}{1L} = 50mL$$

روش دوم:



$$\frac{32.5g \times a}{65 \times 100} = \frac{xmL \times 4M}{2 \times 1000} = \frac{2.24L}{22.4L}$$

$$a = 20\% Zn \quad x = 50mL HCl$$

$$\downarrow$$

$$80\% Cu$$

۸۹. گزینه ۳ ۷۲ گرم Mg^{2+} معادل ۳ مول است؛ بنابراین سه مول $MgSO_4$ تشکیل می‌شود:

$$?mol Mg^{2+} = 72g Mg^{2+} \times \frac{1mol Mg^{2+}}{24g Mg^{2+}} = 3mol Mg^{2+} \rightarrow 3mol MgSO_4$$

۱۸۴ گرم Na^+ معادل ۸ مول است، بنابراین ۴ مول Na_2SO_4 تشکیل می‌شود:

$$?mol Na^+ = 184g Na^+ \times \frac{1mol Na^+}{23g Na^+} = 8mol Na^+ \rightarrow 4mol Na_2SO_4$$

$$MgSO_4 \text{ جرم ۳ مول} = 3 \times 120 = 360g$$

$$Na_2SO_4 \text{ جرم ۴ مول} = 4 \times 142 = 568g$$


$$\Rightarrow \frac{568}{360} = 1.58$$

۹۰. گزینه ۲

$Al \rightarrow Al^{3+} + 3e^- \rightarrow$ نیوواکنش اکسایش در آند :

$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2 \rightarrow$ نیوواکنش کاهش در کاتد :

$$\Rightarrow 2 > Al \rightarrow 2Al^{3+} + 6e^- \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \oplus$$



$$\frac{\frac{Al \text{ گرم}}{27} \times \frac{54}{2} \times \frac{2}{0.5} \times 2}{Al \text{ جرم مولی}} = \frac{\frac{STP \text{ در شرایط}}{Molar \text{ temperature}} \times x}{\frac{22400 \times 3}{H_2 \text{ ضریب}}} \Rightarrow x = 136$$

از این روش تستی بهره می‌بریم:

$$\frac{\text{گرم}}{\text{ضریب}} = \frac{STP}{\text{ضریب} \times \text{جرم مولی}}$$

۹۱. گزینه ۴ با فرض اینکه ۱۰۰ گرم آب داریم محلول سیرشدۀ پتاسیم دی‌کرومات در دمای $90^\circ C$ برابر $70g$ (گرم) آب است یعنی $100 + 70 = 170g$ محلول سیرشدۀ در دمای $90^\circ C$ موجود می‌باشد.

محلول سیرشدۀ پتاسیم دی‌کرومات در دمای $25^\circ C$ برابر $14g$ (گرم) در $100g$ آب است یعنی $114g = 100 + 14$ محلول سیرشدۀ در دمای $25^\circ C$ موجود می‌باشد بنابراین با کاهش دما از $90^\circ C$ به $25^\circ C$ اتحال پذیری از $70g$ به $14g$ در $100g$ آب کاهش می‌باید بنابراین $56g = 14 - 70$ رسوب تشکیل می‌شود.

$$\frac{\text{مقدار رسوب}}{\text{کل حل شونده}} = \frac{56g}{70g} \times 100 = 80\%$$

مسائل چالشی شیمی کنکور

مقدار پتاسیم دی‌کرومات که به شکل محلول باقی‌مانده مقدار $14g$ حل شونده در $100g$ آب است.

$$\text{حل شونده} + \text{حلال} = \text{محلول}$$

$$\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{درصد جرمی}} \times 100 = \frac{14}{114} \times 100 \Rightarrow 12,28 \approx 12,3\%$$

۹۲. گزینه ۳

$$HCl \Rightarrow H^+ + Cl^- , C_m HCl = \frac{10 \times 36,5 \times 1,2}{36,5} = 12 m$$

$$109,5 = \frac{C\bar{l}}{10 \times 10^{-2} g} \times 10^3 \Rightarrow C\bar{l} = 109,5 \times 10^{-2} g$$

$$109,5 \times 10^{-2} g \times \frac{1 mol}{35,5 g Cl^-} \times \frac{1 mol HCl}{1 mol Cl^-} \times \frac{1 L HCl}{12 mol HCl} \times \frac{1000 mL}{1 L} = 2,57$$

۹۳. گزینه ۱ ابتدا مقدار رسوب را محاسبه می‌کنیم:

دما	حل شونده	حلال	محلول
۶۰	۲۰	۱۰۰	۱۲۰
۴۰	۱۵	۱۰۰	۱۱۵

سپس باید محاسبه کنیم که برای حل کردن ۵ گرم نمک در دمای 40° درجه سلسیوس به چه میزان آب احتیاج داریم:


$$\frac{\text{نمک}}{5g} \rightarrow x \Rightarrow x = \frac{100 \times 5}{15} = 3,33g$$

$$\frac{\text{آب}}{15g} \rightarrow 100$$

۹۴. گزینه ۱ در اکسایش هیدروژن عدد اکسایش هر اتم هیدروژن از صفر به ۱ می‌رسد. بنابراین دو اتم هیدروژن 2 الکترون از دست می‌دهند.


اما در اکسایش متان عدد اکسایش کربن 8 درجه افزایش می‌باید بنابراین برای تولید 2 مول الکترون باید $\frac{1}{4}$ مول متان اکسایش پیدا می‌کند که معادل 4 گرم متان است.

۹۵. گزینه ۴ ابتدا باید حساب کنیم چند کیلوگرم (H_2) از واکنش روبه‌رو به دست می‌آید:




$$\left[\frac{(CH_4)}{(g) \times \frac{R}{100}} \right] = \left[\frac{(H_2)}{(g) \times \text{ضریب}} \right] \Rightarrow \frac{30 \times 10^3 \times \frac{64}{100}}{1 \times 16} = \frac{x}{\frac{3 \times 2}{4}} \Rightarrow x = \frac{6 \times 30 \times \frac{64}{100} \times 10}{4} = 7200g H_2 = 7,2kg H_2$$

واکنش کلی در پیل سوختی هیدروژنی اسیدی به صورت روبه‌رو است:



پس برای محاسبه اکسیژن مصرف شده می‌توان نوشت:


$$\left[\frac{(H_2)}{(g) \times \text{ضریب}} \right] = \left[\frac{(O_2)}{(g) \times \text{ضریب}} \right] \Rightarrow \frac{7200g}{2 \times 2} = \frac{x}{1 \times 32} \Rightarrow x = \frac{\frac{7200}{2} \times 7200}{32} = 57600g = 57,6kg O_2$$



و برای قسمت پایانی هم می‌توان نوشت:

$$7,2kg H_2 \times \frac{1000g H_2}{1kg H_2} \times \frac{1mol H_2}{2g H_2} \times \frac{2mol H^+}{1mol H_2} = 7200mol H^+$$

۹۶. گزینه ۲



ابتدا جرم کل آزاد شده را محاسبه می‌کنیم.
روش اول:

$$2,374g Sn \times \frac{1mol Sn}{118,74g Sn} \times \frac{1mol Cl^-}{1mol Sn} \times \frac{71g}{1mol Cl^-} = 1,42g \quad \text{جمله: جرم کل آزاد شده}$$

روش دوم:

$$\frac{2,374g Sn}{118,74g} = \frac{xg Cl^-}{71} \quad x = 1,42g Cl^-$$


حال کل جرم کل موجود در محلول اولیه را محاسبه می‌کنیم.

$$250mL SnCl_4 \times \frac{1L}{1000mL} \times \frac{1mol}{1L} \times \frac{2mol Cl^-}{1mol SnCl_4} \times \frac{71g}{1mol Cl^-} = 1,775g$$



$$C\bar{l} = 1,775 - 1,42 = 0,355g \quad \text{جمله: باقی‌مانده در محلول}$$

مسائل چالشی شیمی کنکور

۹۷. گزینه ۳ آب نمک با غلظت یک درصد نمک؛ یعنی از 100g آب نمک، 10g آن نمک و 99g آب است. طی تجزیه آب، مقدار نمک ثابت بود و مقدار آب (حلال) کاهش می‌یابد. زمانی که غلظت آب نمک دو برابر (۲ درصد) می‌شود، بایستی جرم محلول نصف شده باشد و از 100g محلول به 50g با غلظت ۲ درصد رسیده باشد؛ یعنی 49g آب و 10g نمک. $49 - 49 = 50\text{g}$




۹۸. گزینه ۲



$$\frac{115\text{g}}{2 \times 23} = \frac{x\text{g}}{74,5} \Rightarrow \frac{115}{2 \times 23} = \frac{x}{74,5} \Rightarrow x = 1862,5\text{g}$$

$$\frac{100\text{ml}}{xml} = \frac{5\text{g}}{1862,5\text{g}} \rightarrow x = 37,25\text{lit}$$

۹۹. گزینه ۴ در بر قکافت NO_3^- مذاب، نیم واکنش کاتدی به صورت زیر است:




برای حل مسأله به صورت زیر عمل می‌کنیم:

مرحله ۱: ابتدا تعداد مول الکترون مبادله شده به ازای رسوب 1g گرم مس را بدست می‌آوریم:

$$1,64\text{gCu} \times \frac{1\text{molCu}}{64\text{gCu}} \times \frac{2\text{mole}^-}{1\text{molCu}} = 0,05\text{mole}^-$$


مرحله ۲: در این مرحله به بررسی نیم واکنش کاتدی در بر قکافت $X(NO_3^-)$ مذاب می‌پردازیم. در صورت سؤال گفته شده که فلز X به پایین ترین عدد اکسایش خود رسیده است و پایین ترین عدد اکسایش هر فلز برابر صفر است. پس نیم واکنش کاتدی به صورت زیر است:



از طرفی در صورت سؤال گفته شده که مقدار جریان الکتریسیته عبوری از دو محلول یکسان است، پس جرم مولی X برابر است با:

$$0,05\text{mole}^- \times \frac{1\text{molX}}{3\text{mole}^-} \times \frac{MgX}{1\text{molX}} = 1,64\text{gX} \Rightarrow M \approx 98,4\text{g} \cdot mol^{-1}$$

۱۰۰. گزینه ۴




$$\frac{1\text{mole}^-}{1} = \frac{x(g)(Ag)}{1 \times 108} \Rightarrow 108\text{g} \quad : \text{ محلول اول}$$

$$\frac{1\text{mole}^-}{3} = \frac{x(g)(Cr)}{52} \rightarrow 17,3\text{g} \quad : \text{ محلول دوم}$$

جرم کروم رسوب کرده روی فولاد $= 108 - 17,3 = 90,6\text{g}$

۱۰۱. گزینه ۱ معادله واکنش:




در واکنش بالا برای تولید ۴ مول آلومینیم، ۲ مول آلومینیم اکسید مصرف شده و ۱۲ مول الکترون مبادله می‌شود. پس خواهیم داشت:

$$?gAl = 2,408 \times 10^{22}e \times \frac{1\text{mol e}}{6,02 \times 10^{23}e} \times \frac{4\text{mol Al}}{12\text{mol e}} \times \frac{27\text{g Al}}{1\text{mol Al}} = 0,36\text{g Al}$$

$$?LCO_2 = 0,36\text{g Al} \times \frac{1\text{mol Al}}{27\text{g Al}} \times \frac{3\text{mol CO}_2}{4\text{mol Al}} \times \frac{44\text{g CO}_2}{1\text{mol CO}_2} \times \frac{1\text{LCO}_2}{1,5\text{g CO}_2} = 0,3\text{LCO}_2$$

۱۰۲. گزینه ۴ اگر فرض کنیم تغییر عدد اکسایش V^5+ برابر n باشد، ضرایب استوکیومتری به صورت زیر خواهد بود:

مسائل چالشی شیمی کنکور



$$\frac{0,025 \times 200}{2 \times 1000} = \frac{325 \times 10^{-3}}{n \times 65} \Rightarrow n = 2$$

تغییر عدد اکسایش برابر $+2$ و یون تولید شده و اتادیم III سبز رنگ خواهد بود.

۱۰۳. گزینه ۱ می‌توان نوشت:

$$E_a = x \xrightarrow{\text{در حضور کاتالیزگر}} \begin{cases} E_a(\text{cat}) = \frac{x}{2} = 0,5x \\ E'_a(\text{cat}) = \frac{x}{5} = 0,2x \end{cases}$$

با توجه به اینکه کاتالیزگر انرژی فعال‌سازی واکنش رفت و برگشت را به یک میزان کاهش می‌دهد می‌توان نوشت (فرض می‌کنیم انرژی فعال‌سازی برگشت در غیاب کاتالیزگر برابر y کیلوژول باشد):

$$E'_a(\text{cat}) = E'_a - \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{x}{5} = y - \frac{x}{2} \Rightarrow y = \frac{x}{2} + \frac{x}{5} = 0,7x$$

و در پایان داریم:


$$\frac{\text{مجموع انرژی فعال‌سازی رفت و برگشت در غیاب کاتالیزگر}}{\text{مجموع انرژی فعال‌سازی رفت و برگشت در حضور کاتالیزگر}} = \frac{E_a + E'_a}{E_a(\text{cat}) + E'_a(\text{cat})} = \frac{x + 0,7x}{0,5x + 0,2x} = \frac{1,7x}{0,7x} = 2,43 \simeq 2,4$$

۱۰۴. گزینه ۱ برپایه داده‌های متن این پرسش، داریم:

$$[Cl_r] = \frac{28,4g}{71g \cdot mol^{-1}} \div 2L = 0,2mol \cdot L^{-1}$$

$$[PCl_4] = [Cl_r] = 0,2mol \cdot L^{-1}$$

$$[PCl_5] = \frac{100,08g}{208,5g \cdot mol^{-1}} \div 2L = 0,24mol \cdot L^{-1}$$



$$K = \frac{[PCl_4][Cl_r]}{[PCl_5]} = \frac{0,2 \times 0,2mol \cdot L^{-1}}{0,24mol \cdot L^{-1}} = 1mol \cdot L^{-1}$$

۱۰۵. گزینه ۳ برپایه داده‌های متن این پرسش، داریم:

$$[Br_r] = \frac{74g}{160g \cdot mol^{-1}} \div 2L = 0,225mol \cdot L^{-1}$$

$$[H_r] = \frac{1,6g}{2g \cdot mol^{-1}} \div 2L = 0,4mol \cdot L^{-1}$$

$$[Br_r] = 0,05mol Br_r \div 2L = 0,025mol \cdot L^{-1}, 0,225mol \cdot L^{-1} - 0,025mol \cdot L^{-1} = 0,2mol \cdot L^{-1} Br_r \quad (\text{مصرفی})$$

$$Br_r(g) + H_r(g) \rightleftharpoons HBr(g)$$

$$[H_r] = (0,4 - 0,2)mol \cdot L^{-1} = 0,2mol \cdot L^{-1}, [HBr] = 2 \times 0,2mol \cdot L^{-1} = 0,4mol \cdot L^{-1}$$

$$K = \frac{[HBr]^2}{[Br_r][H_r]} = \frac{(0,4)^2}{0,025 \times 0,2} = 32$$

۱۰۶. گزینه ۲ برپایه داده‌های متن این پرسش، می‌توان نوشت:

$$[N_rO_5] = 2,16g \cdot L^{-1} \div 108g \cdot mol^{-1} = 0,02mol \cdot L^{-1}$$

$$12,96g \cdot L^{-1} \div 108g \cdot mol^{-1} = 0,12mol \cdot L^{-1}$$


$$(0,12 - 0,02)mol \cdot L^{-1} = 0,1mol \cdot L^{-1}$$

$$[NO_r] = 2 \times 0,1mol \cdot L^{-1} = 0,2mol \cdot L^{-1}$$

$$[O_r] = \frac{1}{2} \times 0,1mol \cdot L^{-1} = 0,05mol \cdot L^{-1}$$

$$K = \frac{(0,2)^2 \times 0,05mol^2 \cdot L^{-2}}{(0,02)^2 mol^2 \cdot L^{-2}} = 0,2mol^2 \cdot L^{-2}$$


۱۰۷. گزینه ۲



تعادل در حجم دو لیتر:

$$k_1 = \frac{[x][D]}{[A]} = \frac{(0,2) \times (0,2)}{(0,2)} = 0,2$$

با افزایش حجم از ۲ به ۴ لیتر، فشار کاهش می‌یابد و به تعادل در جهت مول گاز بیشتر یعنی در جهت رفت پیشرفت می‌کند.



$$(0,1 + x)^2 \Rightarrow K_2 = K_1 = \frac{(0,1 + x)^2}{(0,1 - x)} = 0,2$$

$$0,1 + x^2 + 0,2x = 0,2 - 0,2x \Rightarrow x^2 + 0,4x - 0,1 = 0$$

$$x = \frac{-0,4 \pm \sqrt{0,16 + 0,4}}{2} = \frac{-0,4 \pm 0,45}{2} = 0,025$$

$$[x] = 0,1 + 0,025 = 0,125 \Rightarrow molx = 0,125 \times 4 = 0,5$$

۱۰۸. گزینه ۴ ابتدا مول داده شده را به غلظت (مولاریته) تبدیل می‌کنیم ($M = \frac{n}{V}$)

$$N_2O_4 = \frac{1}{5} \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad \text{غلظت اولیه}$$

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$



غلظت تعادلی: $K = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} \rightarrow 4 = \frac{(2x)^2}{(2-x)} \rightarrow x = 1$

$$\Rightarrow [N_2O_4] = 2 - 1 = 1$$

$$\Rightarrow [NO_2] = 2 \times 1 = 2$$

$$\frac{[NO_2]}{[N_2O_4]} = \frac{2}{1} = 2$$

برای بدست آوردن مجموع مول‌های گاز درون ظرف هنگام تعادلی کافی است (هر دو ماده، واکنش‌دهنده و فرآورده گاز هستند) غلظت‌های موجود تعادلی را به مول تبدیل نماییم.

$$NO_2 \text{ تعداد مول تعادلی } M \times V \Rightarrow 2 \times 5 = 10$$

$$N_2O_4 \text{ تعداد مول تعادلی } M \times V \Rightarrow 1 \times 5 = 5$$

$$\text{مجموع مول‌های گازی} \Rightarrow molNO_2 + molN_2O_4 = 10 + 5 = 15$$



۱۰۹. گزینه ۴ زیرا برپایه داده‌های متن این پرسش، می‌توان نوشت:

$$BaSO_4 \rightleftharpoons Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq), [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = 2 \times 10^{-9} mol^2 \cdot L^{-2}$$

چون سدیم سولفات در آب کاملاً محلول و باریم سولفات نامحلول است، غلظت یون سولفات به تقریب برابر 10^{-5} مول بر لیتر خواهد بود:

$$2 \times 10^{-9} mol^2 \cdot L^{-2} = [Ba^{2+}] \times 10^{-5} mol \cdot L^{-1} \Rightarrow [Ba^{2+}] = 2 \times 10^{-4} mol \cdot L^{-1}$$


۱۱۰. گزینه ۴



$$K = \frac{[CO][H_2O]}{[CO_2][H_2]} \Rightarrow 1,8 = \frac{x^2}{(2-x)(1-x)}$$

$$x^2 = 1,8x^2 - 5,4x + 3,6 \Rightarrow 0,8x^2 - 5,4x + 3,6 = 0$$

$$4x^2 - 27x + 18 = 0 \Rightarrow x = \frac{27 \pm \sqrt{729 - 288}}{8} \Rightarrow \begin{cases} x = 6 & \text{غایق} \\ x = 0,75 & \end{cases}$$



مسائل چالشی شیمی کنکور

$$\frac{H_2O}{H_2} \text{ جرم} = \frac{0,75 \times 18}{0,25 \times 2} = 27$$

۱۱۱. گزینه ۴



شرط :

$$\begin{array}{ll} -x & +2x \Rightarrow Q = \frac{(1)^2}{2} = \frac{1}{2} \\ \text{تبییر} : & \\ \text{تعادل} : & 2-x \quad 1+2x \end{array}$$

چون $Q < K$ پس واکنش رفت به میزان بیشتری رخ می‌دهد.

$$K = \frac{[NO]^2}{[N_{\text{F}}O_{\text{F}}]} = \frac{(1+2x)^2}{2-x} = 2 \Rightarrow \frac{1+4x+4x^2}{2-x} = 2 \Rightarrow 4x^2 + 4x + 1 = 4 - 2x \Rightarrow 4x^2 + 6x - 3 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 36 - 4(-3)(4) = 144 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 \pm \sqrt{144}}{2(4)}$$

$$x_1 = \frac{-6 - \sqrt{144 \times 21}}{8} = \frac{-6 - 2 \times 4,5}{8} = \frac{-15}{8} \times 1 \quad \text{غیر قابل}$$

$$x_2 = \frac{-6 + \sqrt{144 \times 21}}{8} = \frac{-6 + 2 \times 4,5}{8} = \frac{3}{8} = 0,375 \quad \text{قابل}$$

کل فرآورده ابتدا ۱ مول بوده و $2x$ معادل $0,375 \times 2$ تغییر کرده است. پس نسبت به مقدار اولیه ۷۵% افزایش داشته است.

۱۱۲. گزینه ۴

$$\frac{A}{1-x} \rightleftharpoons \frac{2X}{2x} \text{ بازده درصدی} = \frac{x}{1} \times 100 = 50 \rightarrow x = 0,5$$


$$K_1 = \frac{[x]^2}{[A]} = \frac{(1)^2}{(0,5)} = 2$$

$$\frac{D}{1-x} \rightleftharpoons \frac{Z}{2x} = \frac{z}{1} \times 100 = 100 \rightarrow Z = 0,1$$

$$K_2 = \frac{[Z]}{[D]} = \frac{0,1}{0,2} = 0,5$$

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{0,5}{2} = 0,25$$

۱۱۳. گزینه ۲



غلظت اولیه:

$$\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ \downarrow & \downarrow \\ -2x & +x \end{array}$$

تبییر غلظت:

$$\begin{array}{cc} 1-2x & x \\ \downarrow & \downarrow \\ \text{غلظت تعادلی:} & \end{array}$$

$$K = \frac{[D_{\text{F}}]}{[A_{\text{F}}]^2} \rightarrow 1 = \frac{x}{(1-2x)^2} \rightarrow x = 0,25$$

مولار D_{F} $[A_{\text{F}}] = 1 - 2 \times (0,25) = 0,5$ غلظت تعادلی

$$\text{مقدار مصرف شده} = \frac{0,5}{0,5} \times 100 = 100 \text{ مولار} \quad \text{بازده درصدی} = \frac{100}{1} = 100\%$$

توجه: می‌توان به این صورت نیز بیان نمود که با توجه به غلظت تعادلی محصول که برابر $0,25$ D_{F} یا $\frac{1}{4}$ مولار است، با استفاده از یک مولار ماده اولیه نهایتاً $0,25$ مولار محصول حاصل شده

است در حالی که طبق روابط استوکیومتری واکنش (نسبت $\frac{molD_{\text{F}}}{molA_{\text{F}}} = \frac{1}{2}$ ضرایب) باید نصف یک مولار، محصول به دست می‌آمد، پس راندمان یا بازده درصدی ۵۰٪ است.


۱۱۴. گزینه ۲ با توجه به مقدار بسیار کوچک K می‌توان دریافت که انحلال پذیری روی کربنات در آب ناچیز است. اما همان مقدار ناچیز که حل می‌شود به یون‌های (aq) و $Zn^{2+}(aq)$ و $CO_3^{2-}(aq)$ تفکیک می‌شود. برای محاسبه غلظت این ماده کافی است ابتدا غلظت $Zn^{2+}(aq)$ یا $CO_3^{2-}(aq)$ را به دست آوریم:

$$\left. \begin{array}{l} K = [Zn^{2+}][CO_3^{2-}] \\ [Zn^{2+}] = [CO_3^{2-}] \end{array} \right\} \Rightarrow 1,6 \times 10^{-11} = [Zn^{2+}]^2 \Rightarrow [Zn^{2+}] = 4 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

پس غلظت روی کربنات محلول برابر $1 \times 10^{-4} mol \cdot L^{-1}$ است. یعنی در یک لیتر محلول (که معادل ۱۰۰۰ گرم محلول است)، $10^{-4} \times 10 = 10^{-3}$ مول $ZnCO_3$ حل شده است. پس در ۵۰ گرم محلول (که همان $50 \times 10^{-3} mol$ محلول است)، داریم:

$$ppm = \frac{\frac{جرم حلشوند}{جرم مطرول}}{\frac{جرم مطرول}{حجم (L)}} \times 10^6 = \frac{2,5 \times 10^{-4}}{500} \times 10^6 = 0,5 ppm$$

۱۱۵ . گزینه ۴



$$K = \frac{[PCl_4][Cl_4]}{[PCl_3]} \Rightarrow 1 = \frac{\left(\frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{4}\right)}{\left(a - \frac{1}{4}\right)} \Rightarrow a - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \Rightarrow a = \frac{1}{2}, \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$PCl_3 \text{ مول اولیه} = 0,75 mol \cdot L^{-1} \times 2L = 1,5 mol$$

یا افزایش، فشار تعادل به سمت مول گازی، کمتر بعنده، حب جایه حامی شود.

توضیح: البته، با توجه به اینکه صورت سوال پیشتون را متحرک عنوان کرده و در طی این واکنش تعداد مول گاز در حال افزایش است قاعده‌تاً حجم ظرف پس از برقراری تعادل دیگر ۲ لیتر نخواهد بود. اگر با این فرض سوال را حل کنیم جواب آن حدوداً 1.28 مول می‌شود که در گزینه‌ها نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این سوال خالی از مشکل نیست.

۱۱۶. گزنه ۱ در شرایط بعنه، ۲۸ در صد مول، مخلوط را آمونیاک تشکیل، سرد کرد.

مول	N_r	H_r	NH_r
اولیہ	10	30	0
تغییرات	$-x$	$-3x$	$+2x$
نهایی	$10 - x$	$30 - 3x$	$2x$

در تشکیل جدول دقت داشته باشید، در ردیف تغییرات برای واکنش‌دهنده‌ها ضریب منفی، برای فرآورده‌ها ضریب مثبت قرار می‌گیرد و ضرایب با توجه به ضرایب استوکیومتری در معادله مواد نهاده شده تعبیر می‌شوند.

$$\text{کل مول موجود در مخلوط} = (10 - x) + (30 - 3x) + 2x = 40 - 2x$$

$$\frac{\text{مول آمونیاک}}{\text{مول کل}} = \frac{2x}{40 - 2x} = \frac{2}{\cancel{20}} \Rightarrow 50x = 280 - 14x \Rightarrow 64x = 280 \Rightarrow x = 4.375$$

$$\Rightarrow \text{مول آمونیاک} = 2 \times 4375 = 875 \text{ mol}$$

$$\text{?g } NH_4 = 1.4 \text{ mol } NH_4 \times \frac{14 \text{ g } NH_4}{1 \text{ mol } NH_4} = 14 \text{ g } NH_4$$

همانطور که ملاحظه می‌کنید، این عدد در گزینه‌ها نیست. منظور طراح این بوده است که بازده واکنش را ۲۸٪ درنظر بگیرید که امکان سوء تعبیر وجود دارد.

حال اگر بازده واکنش را ۲۸٪ در نظر بگیرد.



$$?g\ NH_3 = 1.0\ mol\ N_3 \times \frac{1mol\ NH_3}{1mol\ N_3} \times \frac{14g\ NH_3}{1mol\ NH_3} = 14.0\ g\ NH_3$$

$$\text{جرم عملی} = \frac{\text{جرم عملی}}{\text{جرم نظری}} \times 100 \Rightarrow ۲۸ = \frac{\text{جرم عملی}}{\frac{۳۴۰(g)}{}} \times 100 \Rightarrow \text{جرم عملی} = ۹۵,۲g$$

^{۱۱۷} ۱۱۷-۱. گزنه ۲ از اینکش. کاما، بیک مول اتلن. گلکوکو، و ته قاتلک اسید ۱ مول، آب خارج شود. (حتم کم شده) بس. بهاء، هد واحد تک اشاره نموده ۱ مول آب از دست می‌آورد.

$$\text{مولکول پلیمر} = \frac{\text{ واحد تکرارشونده}^3 \times 10^{21}}{\text{ واحد تکرارشونده} \times 100 \times 10^{21}} \times \frac{1 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} \times \frac{1 \text{ آب}}{1 \text{ آب}} = 9 \text{ kg}$$

۱۱۸ . گزینه ۱



در صد جم. Na_2O در مخلوط حامد نهایت به صورت زیر به دست می‌آید:

مسائل چالشی شیمی کنکور



$$= \frac{\text{مقدار } Na_2O}{\text{مقدار ناخالصی } Na_2O + FeO} \times 100$$

مقدار آهن تولید شده + مقدار کل Na_2O خالص

Na_2O گرم = $30g \times \frac{79,5}{100} = 23,85g$

 $?gFe = 54gFeO \times \frac{1molFeO}{72gFeO} \times \frac{2molFe}{2molFeO} \times \frac{56gFe}{1molFe} \times \frac{100}{100} = 33,6gFe$
 FeO مقدار ناخالص در $\frac{20}{100} = 54g \times \frac{20}{100} = 10,8g$
 $\Rightarrow \frac{23,85}{30 + 33,6 + 10,8} \times 100 \approx 32,06\%$
 $\Rightarrow \frac{32,06}{79,5} \approx 0,40$



۱۱۹. گزینه ۲ فلز آهن با HCl واکنش داده و گاز هیدروژن تولید می‌کند که از حجم گاز تولید شده می‌توان مقدار آهن را بدست آورد:



$$?gFe = 23,6LH_2 \times \frac{1molH_2}{22,4LH_2} \times \frac{1molFe}{1molH_2} \times \frac{56gFe}{1molFe} = 14gFe$$

$$\text{درصد } Fe = \frac{14}{200} \times 100 = 42\%$$

و $FeCl_3$ به ترتیب با $NaOH$ رسوب $Fe(OH)_3$ و $Fe(OH)_2$ تولید می‌کنند.




$$?gNaOH = 14gFe \times \frac{1molFe}{56gFe} \times \frac{1molFeCl_3}{1molFe} \times \frac{3molNaOH}{1molFeCl_3} \times \frac{40gNaOH}{1molNaOH} = 120gNaOH$$

از ۲۰۰ گرم مخلوط آهن و زنگ آهن ۱۱۶ گرم آن Fe_3O_4 می‌باشد.

$$?gNaOH = 116gFe_3O_4 \times \frac{1mol}{160g} \times \frac{4molFeCl_3}{1molFe_3O_4} \times \frac{3molNaOH}{1molFeCl_3} \times \frac{40gNaOH}{1molNaOH} = 174gNaOH$$

در مجموع ۱۷۴ + ۱۲۰ = ۲۹۴ گرم $NaOH$ لازم می‌باشد.

۱۲۰. گزینه ۱ چون ظرفیت آهن در این اکسید را نمی‌دانیم آن را به صورت Fe_xO_y در نظر گرفته و واکنش را می‌نویسیم:




از این مقدار ۱۶,۸ آهن و بقیه اکسیژن موجود در Fe_xO_y بوده است.

$$23,2 - 16,8 = 6,4g = \text{جرم اکسیژن مصرف شده در اکسید آهن}$$

$$\frac{16,8}{56} = 0,3 = \text{مول آهن}$$

$$\frac{6,4}{16} = 0,4 = \text{مول اکسیژن}$$

با توجه به نسبت مول‌های آهن و اکسیژن می‌توان فهمید اکسید آهن مورد نظر Fe_3O_4 است.



$$?LCO_2 = 46,4gFe_3O_4 \times \frac{50}{100} \times \frac{1molFe_3O_4}{232gFe_3O_4} \times \frac{2molCO_2}{1molFe_3O_4} \times \frac{44gCO_2}{1molCO_2} \times \frac{1LCO_2}{1,1gCO_2} = 1L$$

۱۲۱. گزینه ۱ برای حل اینگونه مسائل از M نماد جرم و n تعداد نیم عمر عنصر استفاده می‌کنیم:

جرم اولیه‌ی هسته‌های عنصر x را M و تعداد نیم عمر آن را n در نظر می‌گیریم، بعد از هر ۲ ساعت جرم اولیه x نصف می‌شود تا به $\frac{M}{2^n}$ می‌رسد:

مسائل چالشی شیمی کنکور

$$X : M \xrightarrow{\frac{1}{2}} \frac{M}{2} \xrightarrow{\frac{1}{4}} \frac{M}{4} \xrightarrow{\frac{1}{8}} \frac{M}{8} \xrightarrow{\frac{1}{16}} \frac{M}{16} \Rightarrow \frac{M}{2^n}, n = \frac{16}{2} = 4$$

حال جرم اولیه هسته‌های Y را M' در نظر می‌گیریم و n' تعداد نیم عمر آن.

در سوال ذکر شده که جرم اولیه هر هسته x , ۱۶ برابر جرم اولیه هسته Y است یعنی:

$$\frac{M}{2^n} = M' - \frac{M'}{2^{n'}} \Rightarrow \frac{16M'}{2^4} = M'\left(1 - \frac{1}{2^{n'}}\right) \text{ طبق صورت سوال} \Leftrightarrow M = 16M'$$

$$\Rightarrow 0,75 = 1 - \frac{1}{2^{n'}} \Rightarrow 2^{n'} = 4 \Rightarrow n' = 2$$


همانگونه که توجه کردید در ۱۶ ساعت که عنصر X , نیم عمر را گذراند، عنصر Y تنها ۲ نیمه عمر را گذراند است.

$$\frac{16}{2} = 8 \text{ و نیم عمر عنصر } Y \text{ برابر با ۸ ساعت است.}$$

۱۲۲. گزینه ۱

$$Q = mc\Delta\theta \Rightarrow (1000m^\circ O_f \times \frac{1000LO_2}{1m^\circ O_2} \times \frac{1,5gO_2}{1LO_2}) \times 1 \times 15 = 2,25 \times 10^7 J$$

این مقدار گرمای آب داده شده است، بنابراین:



$$Q_1 + Q_2 = 2,25 \times 10^7 J$$

$$(m \times 4,2 \times 50) + \left(\frac{m}{18} \times 45 \times 10^3\right) = 2,25 \times 10^7$$

$$210m + 2500m = 2,25 \times 10^7 \Rightarrow m \simeq 830,2,8g \simeq 0,83kg$$

چون چگالی آب $\frac{g}{mL}$ است، حجم آب برابر $L = 830,2,8$ می‌باشد.

حال به محاسبه قسمت دوم سؤال می‌پردازیم:

$$\frac{\text{ظرفیت گرمایی ۲ گرم آب}}{\text{ظرفیت گرمایی ۳ گرم اکسیژن}} = \frac{2 \times 4,2}{3 \times 1} = 2,8$$

۱۲۳. گزینه ۲ در شرایط یکسان فشار گاز با تعداد مول گاز متناسب است. بنابراین اگر تعداد مول N_2 را فرض کنیم، تعداد مول $N_f H_f$ برابر $2x$ خواهد بود و از سوی دیگر با توجه به مصرف کامل مواد شرکت کننده در واکنش، تعداد مول H_f برابر با $5x$ است؛ پس:

$$28x + 32(2x) + 2(5x) = 10,2$$

$$28x + 64x + 10x = 10,2 \Rightarrow 102x = 10,2 \Rightarrow x = 0,1 mol$$

درنتیجه تعداد مول‌های N_f , H_f و N_2 به ترتیب برابر $1,0,5,0,0,2$ مول خواهد بود:

$$Q_1 \Rightarrow 0,1 mol N_f \times \frac{92kJ}{1molN_f} = 9,2kJ \Rightarrow Q_t = 36,6 + 9,2 = 45,8kJ$$

$$Q_f \Rightarrow 0,2 mol N_f H_f \times \frac{183kJ}{1molN_f H_f} = 36,6kJ$$

$$Q = mc\Delta\theta$$

$$45800 = m \times 10^3 \times 4,2 \times 10 \Rightarrow m = 1,1 kg$$

۱۲۴. گزینه ۳ ابتدا آنتالپی پیوند $H - H$ را محاسبه می‌کنیم:

$$1mol_{H_2} \times \frac{2g_{H_2}}{1mol_{H_2}} \times \frac{218kJ}{1g_{H_2}} = 436kJ$$

سپس آنتالپی پیوند $N - H$ را براساس واکنش داده شده a به دست می‌آوریم:

$$a) N_f H_f + H_f \rightarrow 2NH_f \quad \Delta H = -183$$

$$[(N - N) + 4(\cancel{H} - H) + (H - H)] - [4(\cancel{H} - H)] = -183 \Rightarrow (163 + 436) - [2(N - H)] = -183 \Rightarrow (N - H) = 391 \frac{kJ}{mol}$$

و نهایتاً با استفاده از آنتالپی واکنش داده شده b آنتالپی پیوند $N \equiv N$ را به دست می‌آوریم:

$$b) N_f + 2H_f \rightarrow 2NH_f \quad \Delta H = -92$$

$$[(N \equiv N) + 2(H - H)] - [2(N - H)] = -92 \Rightarrow [(N \equiv N) + 2(436)] - [2(391)] = -92 \Rightarrow (N \equiv N) = 946 kJ \cdot mol^{-1}$$

۱۲۵. گزینه ۲ پس از نوشتن معادله موازن شده واکنش و با استفاده از رابطه سرعت و استوکیومتری، جرم PCl_5 مصرفی را به دست می‌آوریم:



$$\bar{R}_{Cl_2} = \bar{R}_{PCl_5} = 0,1 \frac{L}{s} \times \frac{1mol}{25L} = \frac{1}{250} mol \cdot s^{-1}$$

مسائل چالشی شیمی کنکور

$$PCl_5 \text{ گرم مصرفی} = \frac{1}{250} \frac{mol}{s} \times 240s \times \frac{168g PCl_5}{1mol PCl_5} = 16g PCl_5$$

$$\% \text{ تجزیه شده } PCl_5 = \frac{16}{(16 + 199.8)g} \times 100 = 8.0\%$$

۱۲۶. گزینه ۱

$$\bar{R}_{NaHCO_3} = 2\bar{R}_{CO_2} \Rightarrow \bar{R}_{NaHCO_3} = 2 \times 0.01 = 0.02 mol \cdot min^{-1}$$

$$? g NaHCO_3 = 2.5 \text{ min} \times \frac{0.02 mol NaHCO_3}{1 \text{ min}} \times \frac{84g NaHCO_3}{1mol NaHCO_3} = 1.2g NaHCO_3$$

جرم کل مخلوط = $NaHCO_3$ جرم - $CaCO_3$ جرم : مقدار $CaCO_3$ در مخلوط اولیه

$$\bar{R}_{CaCO_3} = \bar{R}_{CO_2} \Rightarrow \bar{R}_{CaCO_3} = 1 \times 0.01 = 0.01 mol \cdot min^{-1}$$

$$? \text{ min} = 0.01 mol CaCO_3 \times \frac{1mol CaCO_3}{100g CaCO_3} \times \frac{1 \text{ min}}{0.01 mol CaCO_3} = 1 \text{ min}$$

مدت زمان باقیمانده = کل زمان - زمان سپری شده $\Rightarrow 5 - 2.5 = 2.5 \text{ min}$

۱۲۷. گزینه ۲ غلظت X در حال کاهش و غلظت Y در حال افزایش است. از طرفی در ۱۵ ثانیه پس از گذشت واکنش، تغییرات غلظت X ($1.6 - 0.6$) است. $\frac{2}{3}$ برابر تغییرات غلظت Y (0.9) است.

بنابراین X و Y به ترتیب ماده های B و C هستند.

در ثانیه‌ی پنجم: $n_B + n_C + n_D = 1.9$



$$\Rightarrow (1.6 - 2x) + (3x) + (x) = 1.6 + 2x = 1.9 \Rightarrow x = 0.15 mol$$

$$c = 3x = 3 \times 0.15 = 0.45$$

$$a = 1.6 - 2x = 1.6 - 0.3 = 1.3$$

$$\begin{cases} \bar{R}_C = 3R \text{ واکنش} = 3 \times 2.6 \times 10^{-2} = 7.8 \times 10^{-2} \\ 7.8 \times 10^{-2} = \frac{d - 0.45}{5} \Rightarrow d = 0.84 mol \cdot L^{-1} \\ \bar{R}_B = 2R \text{ واکنش} = 2 \times 2.6 \times 10^{-2} = 5.2 \times 10^{-2} \\ 5.2 \times 10^{-2} = \frac{-(b - 1.3)}{5} \Rightarrow b = 1.04 mol \cdot L^{-1} \end{cases} \Rightarrow b + d = 1.04 + 0.84 = 1.88$$

۱۲۸. گزینه ۲



از آنجا که پس از انجام واکنش‌ها، آب برابر ۷ شده است، نتیجه می‌گیریم مقدار H^+ تولیدی با مقدار OH^- تولیدی برابر است.

$$? mol H^+ = x g N_2O_5 \times \frac{1 mol N_2O_5}{108 g N_2O_5} \times \frac{2 mol HNO_3}{1 mol N_2O_5} \times \frac{2 mol H^+}{2 mol HNO_3} = \frac{2x}{108} mol H^+$$

$$? mol OH^- = x g Li_2O \times \frac{mg \text{ خالص}}{\text{ناخالص} \times 100g} \times \frac{1 mol Li_2O}{30g Li_2O}$$

$$\times \frac{2 mol LiOH}{1 mol Li_2O} \times \frac{2 mol OH^-}{2 mol LiOH} = \frac{2xm}{3000} mol OH^-$$

$$\frac{2xm}{3000} = \frac{2x}{108} \Rightarrow m \approx 27.77$$

۱۲۹. گزینه ۳ باتوجه به این که آخرین دو الکترون اتم فلز دارای اعداد کوانتو می $n = l = 6$ است، می‌توان نتیجه گرفت که آرایش الکترونی آن به $^{6s^2}$ ختم می‌شود و از فلزهای قلایی خاکی است. بنابراین هیدروکسید آن به صورت $M(OH)_2$ و دو ظرفیتی است، حال با استفاده از pH باز، غلظت مولی آن را محاسبه می‌کنیم.

$$pH + pOH = 14 \rightarrow 11.3 + pOH = 14 \rightarrow pOH = 2.7$$

$$[OH^-] = 10^{-pOH} \rightarrow M \cdot n \cdot \alpha = 10^{-2.7} \rightarrow M \times 2 \times 1 = 10^{-2.7}$$

$$2M = 10^{-2.7} \times 10^{+0.3} \rightarrow 2M = 2 \times 10^{-2.4} \rightarrow M = 10^{-2.4} mol \cdot L^{-1}$$


حال می‌توان نوشت:

$$M_a n_a V_a = M_b n_b V_b$$


$$2 \times n_a \times 0.5 = 10^{-2.4} \times 2 \times V_b$$

اگر V_b برابر ۱ لیتر باشد، n_a برابر ۲ و اسید دوظرفیتی است (یعنی دو مرحله‌ی یونش دارد) که فقط با گزینه ۴ مطابقت دارد.

۱۳۰. گزینه ۲ ابتدا تغییر اعداد اکسایش اتم‌های کربن را در واکنش اکسایش به دست می‌آوریم:



هر اتم کربن ۶ واحد تغییر عدد اکسایش نشان می‌دهد که مجموع این تغییرات برابر $12 \times 6 = 72$ واحد می‌باشد. حال عدد اکسایش اتم‌های کربن گروه‌های عاملی در آسپرین را بدست می‌آوریم:



بنابراین تفاوت آنها $6 - 6 = 0$ واحد می‌باشد.

۱۳۱. گزینه ۳ هر یک از داده‌های حجم و فشار برای دو گاز را در مقایسه با شرایط STP می‌سنجدیم:

$$\frac{Cl_2}{\text{محاسبه حجم}} \rightarrow \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{6,72 \times 2}{(0 + 273)} = \frac{1 \times V_2}{273} \Rightarrow V_2 = 13,44 L Cl_2$$

شرط

$$\frac{Cl_2}{\text{محاسبه حجم}} \rightarrow \frac{P'_1 V'_1}{T_1} = \frac{P'_2 V'_2}{T_2} \Rightarrow \frac{5,6 \times 1}{273} = \frac{1 \times V'_2}{273} \Rightarrow V'_2 = 5,6 L Cl_2$$

: واکنش موازن شده $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_4 + Cl_2 + 2H_2O$

حالات اول:

$$?g MnO_2 = 13,44 L Cl_2 \times \frac{1 mol Cl_2}{22,4 L Cl_2} \times \frac{1 mol MnO_2}{1 mol Cl_2} \times \frac{87 g MnO_2}{1 mol MnO_2} = 52,2 g MnO_2$$

حالات دوم:

$$?g HCl = 5,6 L Cl_2 \times \frac{1 mol Cl_2}{22,4 L Cl_2} \times \frac{1 mol HCl}{1 mol Cl_2} \approx 4,62 mol HCl$$

$$\Rightarrow \frac{g MnO_2}{mol HCl} = \frac{52,2 g}{4,62 mol} = 11,3$$

۱۳۲. گزینه ۲ چون هر یک مول CO_2 مطابق واکنش اول، یک مول H_2CO_3 تولید می‌کند، ابتدا مول H_2CO_3 را بدست می‌آوریم:

$$?mol H_2CO_3 = 1 kg H_2O \times \frac{0,11 g CO_2}{0,1 kg H_2O} \times \frac{1 mol CO_2}{44 g CO_2} \times \frac{1 mol H_2CO_3}{1 mol CO_2} = 0,025 mol H_2CO_3$$

واکنش‌های (II) و (III) را موازن می‌کنیم:



$$Ca(OH)_2 \text{ به وسیله } H_2CO_3 \text{ مول مصرفی} = 1 g CaCO_3 \times \frac{1 mol CaCO_3}{100 g CaCO_3} \times \frac{1 mol H_2CO_3}{1 mol CaCO_3} = 0,01 mol H_2CO_3$$

$$NaOH \text{ مقدار مصرفی به وسیله } H_2CO_3 = 0,025 - 0,01 = 0,015 mol H_2CO_3$$

$$?g Na = 0,015 mol H_2CO_3 \times \frac{2 mol NaOH}{1 mol H_2CO_3} \times \frac{1 mol Na}{1 mol NaOH} \times \frac{23 g Na}{1 mol Na} = 0,69 g Na$$

$$\text{درصد جرمی } Na \text{ در نمونه اولیه} = \frac{0,69 g Na}{1,94 g \text{ نمونه}} \times 100 = 35,6$$

۱۳۳. گزینه ۲ چون تنها اختلاف جرم دو ماده جامد در فرآورده داده شده باید مقدار ماده واکنش دهنده (اولیه) را a فرض کنیم تا بتوانیم جرم هر فرآورده جامد را بدست آوریم:

$$?g MnO_2 = a mol KMnO_4 \times \frac{1 mol MnO_2}{2 mol KMnO_4} \times \frac{87 g MnO_2}{1 mol MnO_2} = \frac{87}{2} a g MnO_2$$

$$?g K_2MnO_4 = a mol KMnO_4 \times \frac{1 mol K_2MnO_4}{2 mol KMnO_4} \times \frac{197 g K_2MnO_4}{1 mol K_2MnO_4} = \frac{197}{2} a g K_2MnO_4$$



مسائل چالشی شیمی کنکور

$$\frac{197}{2}a - \frac{87}{2}a = 2,75g \Rightarrow a = \frac{5/5}{110} mol KMnO_4 = 0,05 mol KMnO_4$$

پس به کمک مول اولیه ماده واکنش دهنده، حجم گاز اکسیژن تولید شده را بدست می آوریم:

$$?LO_2 = 0,05 mol KMnO_4 \times \frac{1 mol O_2}{2 mol KMnO_4} \times \frac{22,4 LO_2}{1 mol O_2} = 0,56 LO_2$$

۱۳۴. گزینه ۲ ابتداء معادله سوختن هر دو گاز را می نویسیم:



اگر در این مخلوط حجم گاز متان را x لیتر و حجم گاز هیدروژن را $(11,2 - x)$ لیتر در نظر بگیریم، جرم آب حاصل از سوختن این دو گاز را بدست می آوریم:

$$?g H_2O = xL CH_4 \times \frac{1 mol CH_4}{22,4 L CH_4} \times \frac{2 mol H_2O}{1 mol CH_4} \times \frac{18 g H_2O}{1 mol H_2O}$$

$$= 1,6x g H_2O$$


$$?g H_2O = (11,2 - x)L H_2 \times \frac{1 mol H_2}{22,4 L H_2} \times \frac{2 mol H_2O}{1 mol H_2} \times \frac{18 g H_2O}{1 mol H_2O}$$

$$= 0,8(11,2 - x) g H_2O$$

$$1,6x + 0,8(11,2 - x) = 11,2 \Rightarrow 0,8x = 11,2 - 11,2 \Rightarrow x = 1,25 \Rightarrow x \approx 1,25 L CH_4$$

$$\frac{\text{جز}}{\text{کل}} = \frac{1,2}{11,2} \times 100 \Rightarrow x = \frac{1,2}{11,2} \times 100 \Rightarrow x = \% 25$$

۱۳۵. گزینه ۲ اگر مول پتاسیم پرمنگنات اولیه را x بگیریم، مجموع جرم جامد باقیمانده در ظرف پس از تجزیه 75% پتاسیم پرمنگنات به صورت زیر نوشته می شود:



$$x - \frac{x}{2} = \frac{x}{2} \quad \frac{x}{2} \quad \frac{x}{2}$$

$$\frac{x}{4}(158) + \frac{3x}{8}(197) + \frac{3x}{8}(87) = 292 \Rightarrow x = 2 mol$$

$$?LO_2 = 2 mol KMnO_4 \times \frac{1 mol O_2}{2 mol KMnO_4} \times \frac{22,4 LO_2}{1 mol O_2} = 22,4 LO_2$$

چون غلظت یون کلرید در محلول حاصل خواسته شده پس ابتداء تعداد مول یون Cl^- را در هر دو محلول بدست می آوریم گزینه ۲.

$$?mol Cl^- = 100 ml \times \frac{1 L \text{ محلول}}{1000 ml} \times \frac{0,01 mol KCl}{1 L \text{ محلول}} \times \frac{1 mol Cl^-}{1 mol KCl} = 0,001 mol Cl^- : KCl \text{ محلول}$$

$$CaCl_2 \text{ محلول} = 1000 ml \times \frac{1 L \text{ محلول}}{1000 ml} \times \frac{0,01 mol CaCl_2}{1 L \text{ محلول}} \times \frac{2 mol Cl^-}{1 mol CaCl_2} = 0,02 mol Cl^-$$

جرم کل یون کلرید موجود در محلول حاصل برابر است با

$$?g Cl^- = 0,01 mol Cl^- \times \frac{35,5 g Cl^-}{1 mol Cl^-} = 0,355 g Cl^-$$

$\frac{g}{ml} \leftarrow (1 g = 1 ml)$ برای محلول های بسیار رقیق مانند آب که دارای چگالی ۱ هستند

$$100 ml KCl \text{ محلول} = 100 ml CaCl_2 \text{ محلول} + 1000 ml CaCl_2 \text{ محلول}$$

$$ppm(Cl^-) = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow ppm = \frac{0,355}{1100} \times 10^6 \simeq 322,73$$

۱۳۷. گزینه ۴ فقط عبارت (ب) درست است.


بررسی عبارت ها:

(الف) در اثر این واکنش رسوب سفید رنگ نقره کلرید ($AgCl$) تشکیل می شود.

(ب)

$$\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 = \frac{\begin{cases} NaCl \rightarrow \frac{23 g Na}{58,5 g NaCl} \times 100 = \% 39,32 \\ AgNO_3 \rightarrow \frac{14 g N}{170 g AgNO_3} \times 100 = \% 8,23 \end{cases}}{100} \Rightarrow \frac{8,23}{39,32} = \% 2$$

(ب)



$$?g AgCl = 58,5 g NaCl \times \frac{1 mol NaCl}{58,5 g NaCl} \times \frac{1 mol AgCl}{1 mol NaCl} \times \frac{143,5 g AgCl}{1 mol AgCl} = 143,5 g AgCl$$

ت) غلظت این یون در طول واکنش ثابت می ماند

$$\text{غذت مولار} = \frac{\text{mol}}{L} \Rightarrow \frac{1}{1} = 1$$

$$500 + 500 = 1000 \text{ ml} = 1L$$

محلول نهایی

۱۳۸. گزینه ۴ فقط عبارت دوم درست می‌باشد.

بررسی عبارت‌های نادرست:

* عبارت اول:

$$M_1 = \frac{\text{mol}}{L} = \frac{0,16}{0,05} = 3,2 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$M_f = \frac{\text{mol}}{L} = \frac{0,08}{0,05} = 1,6 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

مولاریتۀ این دو محلول برابر نیستند. زیرا تعداد مول‌ها در محلول (۱) دو برابر تعداد مول‌ها در محلول (۲) است پس غذت مولار محلول (۱) دو برابر غذت مولار محلول (۲) است.

* عبارت سوم: نادرست است زیرا:

$$(2) \quad M = \frac{\text{مول}}{\text{حجم}} = \frac{0,24 \text{ mol}}{0,1 \text{ L}} = 2,4 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$M = \frac{\text{مول}}{\text{حجم}} = \frac{0,24 \text{ mol}}{0,05 \text{ L}} = 4,8 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

عبارت چهارم: جرم ذره‌های سازندهٔ دو محلول متفاوت است پس غذت ppm یکسان نمی‌باشد.

عبارت پنجم: مولاریتۀ شکل‌های (۳) و (۴) و (۵) یکسان است و کمترین مولاریتۀ به هر سه شکل مربوط است.

۱۳۹. گزینه ۴ بررسی گزینه‌ها:

گزینه (۱)

$$?gCl^- = 0,05gFeCl_3 \times \frac{1\text{ mol}}{162,5g} \times \frac{3\text{ mol } Cl^-}{1\text{ mol } FeCl_3} \times \frac{35,5g}{1\text{ mol}} = 0,0327gCl^-$$

$$ppmCl^- = \frac{Cl^- \text{ جرم یون}}{\text{حجم محلول}} \times 10^6 = \frac{0,0327}{1000} \times 10^6 = 32,7ppm$$

گزینه (۲)

$$?gCl^- = 0,1gKCl \times \frac{1\text{ mol}}{74,5g} \times \frac{1\text{ mol } Cl^-}{1\text{ mol } KCl} \times \frac{35,5g}{1\text{ mol}} = 0,475gCl^-$$

$$ppmCl^- = \frac{0,0475}{1000} \times 10^6 = 47,5ppm$$

گزینه (۳)

$$?gCl^- = 0,05gCaCl_2 \times \frac{1\text{ mol}}{111g} \times \frac{2\text{ mol } Cl^-}{1\text{ mol } CaCl_2} \times \frac{35,5g}{1\text{ mol}} = 0,032gCl^-$$

$$ppmCl^- = \frac{0,032}{1000} \times 10^6 = 32ppm$$

گزینه (۴)

$$?gCl^- = 0,05gNaCl \times \frac{1\text{ mol}}{58,5g} \times \frac{1\text{ mol } Cl^-}{1\text{ mol } NaCl} \times \frac{35,5g}{1\text{ mol}} = 0,030gCl^-$$

$$ppmCl^- = \frac{0,030}{1000} \times 10^6 = 30ppm$$

۱۴۰. گزینه ۲ (۱) با توجه به جدول معادلهٔ انحلال‌پذیری A و B به صورت زیر خواهد بود:

$$S_A = 0,3\theta + 72, \quad S_B = 0,7\theta + 48$$

تأثیر دما بر انحلال‌پذیری نمکی که ضریب θ بزرگتری دارد (شیب منحنی بیشتر) مؤثرتر است پس تأثیر دما بر انحلال‌پذیری ماده B بیشتر است.

(۲) در دمایی که انحلال‌پذیری این دو ماده باهم برابر است، درصد جرمی آن‌ها باشد ولی غذت مولی آن‌ها بستگی به جرم مولی ماده و چگالی محلول دارد.

(۳) مقادیر دمای $60^\circ C$ و $40^\circ C$ را در معادلهٔ انحلال‌پذیری A قرار می‌دهیم تا مقدار ماده حل‌شونده مشخص شود:

$$S_A = 0,3(60) + 72 = 90 \Rightarrow 90 - 84 = 6g$$

$$S_A = 0,3(40) + 72 = 84g$$

وقتی $190g$ محلول C را تا دمای $40^\circ C$ سرد می‌کنیم $6g$ رسوب تشکیل می‌شود پس برای $6g$ محلول خواهیم نوشت:

$$?g_{\text{رسوب}} = \frac{6g}{\text{محلول } C} \times \frac{190g}{60^\circ C} = 2,4g$$

(۴) برای دمای C و در 100 گرم آب مقدار حل‌شونده (B) را محاسبه می‌کنیم:

$$S_B = 0,7(80) + 48 = 104g_{(B)}$$

مسائل چالشی شیمی کنکور

$$\frac{104g_{\text{حل شونده}}}{100g_{\text{آب}}} = 116g_{\text{حل شونده}} = 400g_{\text{آب}} \quad \text{حل شونده} = \frac{400g_{\text{آب}}}{100g_{\text{آب}}}$$

پس برای ۴۰۰ گرم آب باید ۴۱۶ گرم ماده B حل شود تا محلول سیر شده به دست بیاید و برای ۴۰۰ گرم ماده B محلول سیر نشده است.

۱۴۱. گزینه ۴ ابتدا بازه درصدی واکنش (I) را به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} CO_r(g) + H_r(g) &\rightleftharpoons CO(g) + H_rO(g), \quad K = 1 \\ K &= \frac{[CO][H_rO]}{[CO_r][H_r]} \Rightarrow 1 = \frac{x^r}{(1-x)(4-x)} \Rightarrow x^r = 4 - 5x + x^r \\ &\Rightarrow 4 - 5x = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$x = 0,8 \text{ mol}$$

مقدار مصرف یکی از واکنش دهندها
بازده درصدی

$$\times \frac{0,8}{1} \times 100 = 80\%$$

مقدار اولیه آن

توجه: در رابطه‌ی فوق بازدهی درصدی را براساس مقدار مصرف H_r محاسبه نمودیم نه براساس CO_r . اگر فرض کنیم واکنش (I) کامل باشد در آن صورت CO_r محدود کننده خواهد بود و لذا محاسبات برایه‌ی آن باید انجام شود. اگر بازدهی درصدی را بخواهیم برمنای (g) انجام دهیم عددی غیرواقعی به ما خواهد داد. سپس بازدهی درصدی واکنش (II) را به دست می‌آوریم:


$$\begin{aligned} H_r(g) + I_r(g) &\rightleftharpoons 2HI(g) \\ K &= \frac{[HI]^2}{[H_r][I_r]} = \frac{(2x)^2}{(1-x)^2} = 49 \Rightarrow \frac{2x}{1-x} = 7 \Rightarrow 2x = 7 - 7x \Rightarrow x = \frac{7}{9} \text{ mol} \\ &\times \frac{\frac{7}{9}}{1} \times 100 = 77\% \quad \text{بازده درصدی واکنش (I)} \\ &\quad \text{بازده درصدی واکنش (II)} = \frac{80}{77} = \frac{72}{70} \end{aligned}$$

و در پایان داریم:

۱۴۲. گزینه ۳ بررسی موارد:

مورد «الف»: فرمول مولکولی اسید چرب راست زنجیر به صورت $C_nH_{2n}O_2$ است.


مورد «پ»:



$$\Rightarrow \frac{\text{مجموع ضرایب فرآورده}}{\text{مجموع ضرایب واکنش دهنده}} = \frac{109}{81}$$

مورد «ب»: چون تعداد کربن‌ها در یک مولکول گریس بیشتر از بنزین است.

مورد «ت»: حجم هوای موردنیاز برای سوختن ۱ مول واژلین حدود ۵ برابر اکسیژن موردنیاز آن است. پس جمله نادرست است.



$$1mol \times \frac{38molO_2}{1mol \text{ واژلین}} \times \frac{22,4LO_2}{1molO_2} = 851,2LO_2$$

۱۴۳. گزینه ۳

$$MnO_r = 55 + (16 \times 2) = 87g \cdot mol^{-1}, Cl_r = (35,5 \times 2) = 71g \cdot mol^{-1}$$

$$\begin{aligned} MnO_r &\rightarrow molCl_r \rightarrow molMnO_r \rightarrow gMnO_r \rightarrow gMnO_r^- \\ ?g MnO_r &= 21g Cl_r \times \frac{1mol Cl_r}{71g Cl_r} \times \frac{1mol MnO_r}{1mol Cl_r} \times \frac{87g MnO_r}{1mol MnO_r} \times \frac{100g MnO_r}{90g MnO_r} \\ &= 28,6g MnO_r \end{aligned}$$



۱۴۴. گزینه ۲

$$H_rSO_r = (1 \times 2) + 32 + (16 \times 4) = 98g \cdot mol^{-1}$$

$$NaOH = 23 + 16 + 1 = 40g \cdot mol^{-1}$$



$$\begin{aligned} ?g NaOH &= 20g H_rSO_r \times \frac{49g H_rSO_r}{100g H_rSO_r} \times \frac{1mol H_rSO_r}{98g H_rSO_r} \times \frac{40g NaOH}{1mol H_rSO_r} \times \frac{100g NaOH}{1mol NaOH} \\ &\times \frac{100g NaOH}{100g NaOH} = 10g NaOH \end{aligned}$$



براساس واکنش موازن شده از ۵ مول Li_3N مقدار ۱,۵ مول H_2O حاصل خواهد شد که هر یک از آنها با ۱ مول HCl واکنش کامل انجام می‌دهند یعنی ۲ مول از فرآورده‌ها براساس مقدار نظری حاصل می‌شود که با بازده درصدی ۸۰٪ مقدار واقعی ۱,۶ مول فرآورده خواهد شد.


$$HCl = \frac{۴\text{mol } HCl}{۴\text{mol فرآورده‌ها}} = ۱,۶\text{mol } HCl$$

$$\begin{aligned} ?kgSi &= ۹\text{ton } Mg \times \frac{۱۰۰\text{kg } Mg}{۱\text{ton } Mg} \times \frac{۱۰۰\text{g } Mg}{۱\text{kg } Mg} \times \frac{x}{۱۰۰} \times \frac{۴۰}{۱۰۰} \times \frac{۱\text{mol } Mg}{۲۴\text{g } Mg} \times \frac{۱\text{mol } Si}{۲\text{mol } Mg} \times \frac{۲\text{kg } Si}{۱\text{mol } Si} \\ &\times \frac{۱\text{kg } Si}{۱۰۰\text{g } Si} = ۹۸۰\text{kg } Si \rightarrow x = ۶۰ \end{aligned}$$

۱۴۷ . گزینه ۲ در واکنش $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$ ، کاهش جرم بدلیل تولید گاز کربن دی‌اکسید است یعنی:


$$CaCO_3 = ۴۰ + ۱۲ + (۱۶ \times ۳) = ۱۰۰\text{g} \cdot mol^{-1}$$

$$۵۰ - ۳۹ = ۱۱gCO_2 \quad CO_2 = ۱۲ + (۱۶ \times ۲) = ۴۴g \cdot mol^{-1}$$



$$?gCaCO_3 = ۱۱gCO_2 \times \frac{۱\text{mol } CO_2}{۴۴gCO_2} \times \frac{۱\text{mol } CaCO_3}{۱\text{mol } CO_2} \times \frac{۱۰۰\text{g } CaCO_3}{۱\text{mol } CaCO_3} = ۲۵g CaCO_3$$

$$\frac{۲۵}{۵۰} \times ۱۰۰ = ۵۰ \quad \text{درصد خلوص}$$



$$CaCO_3 = ۴۰ + ۱۲ + (۱۶ \times ۳) = ۱۰۰\text{g} \cdot mol^{-1} \quad CaO = ۴۰ + ۱۶ = ۵۶g \cdot mol^{-1}$$

باتوجه به اینکه در صورت مسئله مقدار جرم ماده باقیمانده خواسته شده است بنابراین ابتدا جرم گاز خارج شده از طرف واکنش را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} ?gCO_2 &= ۱۰۰\text{g } CaCO_3 \times \frac{۷۵g CaCO_3}{۱۰۰g CaCO_3} \times \frac{۱\text{mol } CaCO_3}{۱۰۰\text{g } CaCO_3} \times \frac{۱\text{mol } CO_2}{۱\text{mol } CaCO_3} \\ &\times \frac{۴۴g CO_2}{۱\text{mol } CO_2} \times \frac{۱۰۰}{۱۰۰} = ۲۶,۴g CO_2 \end{aligned}$$

اکنون می‌توان مقدار جرم جامد باقیمانده در طرف واکنش را به دست آورد.

$$\text{جرم ماده جامد باقیمانده} = ۱۰۰ - ۲۶,۴ = ۷۳,۶g$$

$$C_2H_5OH = (۱۲ \times ۲) + (۱ \times ۵) + ۱۶ + ۱ = ۴۶g \cdot mol^{-1}$$

$$MnCO_3 = ۵۵ + ۱۲ + (۱۶ \times ۳) = ۱۱۵g \cdot mol^{-1}$$

فرض را بر آن می‌گیریم که ۱۰۰ گرم C_2H_5OH ۱۰۰g ناخالص و $MnCO_3$ خالص را داشته باشیم:

$$\frac{mol C_2H_5OH}{mol MnCO_3} = \frac{۱۰۰\text{g } C_2H_5OH \times \frac{۵۰}{۱۰۰} \times \frac{۱\text{mol } C_2H_5OH}{۴۶g C_2H_5OH}}{۱۰۰\text{g } MnCO_3 \times \frac{۱\text{mol } MnCO_3}{۱۱۵g MnCO_3}} = ۱,۲۵$$

۱۵۰ . گزینه ۳ اگر جرم مواد واکنش دهنده را m و درصد خلوص x در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$KClO_3 : \frac{m \times \frac{P_1}{100}}{122,5 \times 2} \left| \begin{array}{c} x \text{ lit} \\ 22,4 \times 3 \end{array} \right. \rightarrow P_1 = \frac{245x}{22,4 \times 3 \times m \times 0,01}$$


$$KClO_3 = 39 + 35,5 + (16 \times 3) = 122,5 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

$$KNO_3 = 39 + 14 + (16 \times 3) = 101 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

$$KNO_3 : \frac{m \times \frac{P_2}{100}}{101 \times 4} \left| \begin{array}{c} x \text{ lit} \\ 22,4 \times 5 \end{array} \right. \rightarrow P_2 = \frac{404x}{22,4 \times 5 \times m \times 10^{-2}}$$

$$\Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{\frac{22,4 \times 5 \times m \times 0,01}{245 \times x}}{\frac{22,4 \times 3 \times m \times 0,01}{245 \times 5}} = \frac{404 \times 3}{245 \times 5} = 0,99 \approx 1$$

۱۵۱. گزینه ۴



چون محیط واکنش سرباز است گاز O_2 تولید خارج می‌شود. پس:

$$19,6 - 15,76 = 3,84 \text{ g } O_2$$


$$O_2 = 16 \times 2 = 32 \text{ g} \cdot mol^{-1} \quad \frac{O_2 \rightarrow 3,84}{32 \times 3} \left| \begin{array}{c} 19,6 \times \frac{x}{100} \\ 122,5 \times 2 \end{array} \right. \rightarrow x = \frac{245 \times 3,84}{32 \times 3 \times 19,6 \times 10^{-2}} = 50$$

$$KClO_3 = 39 + 35,5 + (16 \times 3) = 122,5 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

۱۵۲. گزینه ۴

$$\begin{aligned} ?g NaOH_{\text{نالامن}} &= 250 \text{ mol} \times \frac{1 \text{ lit}}{100 \text{ ml}} \times \frac{1 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ lit}} \times \frac{40 \text{ g NaOH}}{1 \text{ mol NaOH}} \times \frac{100 \text{ g NaOH}}{10 \text{ g NaOH}} \\ &= 25 \text{ g NaOH نالامن} \end{aligned}$$

سپس جرم $Fe(OH)_3$ را محاسبه می‌کنیم: $Fe(OH)_3 = 56 + (16 + 1) \times 3 = 107 \text{ g} \cdot mol^{-1}$



$$\begin{aligned} ?g Fe(OH)_3 &= 100 \text{ ml} \times \frac{1 \text{ lit}}{1000 \text{ ml}} \times \frac{1 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ lit}} \times \frac{1 \text{ mol } Fe(OH)_3}{3 \text{ mol NaOH}} \times \frac{107 \text{ g } Fe(OH)_3}{1 \text{ mol } Fe(OH)_3} \\ &= \frac{107}{100} = 1,07 \text{ g } Fe(OH)_3 \end{aligned}$$

۱۵۳. گزینه ۱

$$?g NaNO_3_{\text{نالامن}} = x \text{ mol } O_2 \times \frac{4 \text{ mol NaNO}_3}{1 \text{ mol } O_2} \times \frac{85 \text{ g NaNO}_3}{1 \text{ mol NaNO}_3} = 170 \text{ g NaNO}_3_{\text{نالامن}}$$

$$NaNO_3 = 23 + 14 + (16 \times 3) = 85 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

$$KClO_3 = 39 + 35,5 + (16 \times 3) = 122,5 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

$$\begin{aligned} ?g KClO_3_{\text{نالامن}} &= x \text{ mol } O_2 \times \frac{2 \text{ mol } KClO_3}{1 \text{ mol } O_2} \times \frac{122,5 \text{ g } KClO_3}{1 \text{ mol } KClO_3} = 117 \text{ g } KClO_3_{\text{نالامن}} \end{aligned}$$

$$NaNO_3 = \frac{170x}{A} \times 100 \quad KClO_3 = \frac{117x}{A} \times 100 \quad \text{درصد خلوص}$$

$$\frac{KClO_3}{NaNO_3} = \frac{\frac{117x}{A} \times 100}{\frac{170x}{A} \times 100} = 0,68$$

۱۵۴. گزینه ۳ معادله موازن شده به صورت زیر است:



مسائل چالشی شیمی کنکور

ابتدا باید جرم Al_2O_3 موجود در نمونه بوکسیت را بدست می آوریم و سپس درصد خلوص نمونه بوکسیت را محاسبه می کنیم. یعنی:


$$?g Al_2O_3 = 200 g Al \times \frac{1 mol Al}{100 g Al} \times \frac{1 mol Al_2O_3}{27 g Al} \times \frac{102 g Al_2O_3}{1 mol Al_2O_3}$$

$$\times \frac{100}{100} = 349.4 g Al_2O_3$$

$$\text{درصد خلوص} = \frac{349.4}{411.1} \times 100 = 85\%$$

۱۵۵. گزینه ۲ ضمن نوشتن معادله واکنش‌ها مقدار عددی بازده درصدی را برای هر کدام محاسبه می کنیم و خواهیم داشت:

رد گزینه ۱:




$$Fe_3O_4 = (56 \times 2) + (16 \times 3) = 160 g Fe_3O_4$$

$$?g Fe = \lambda_0 g Fe_3O_4 \times \frac{1 mol Fe_3O_4}{160 g Fe_3O_4} \times \frac{2 mol Fe}{1 mol Fe_3O_4} \times \frac{56 g Fe}{1 mol Fe} = 56 g Fe$$

$$\text{بازده درصدی} = \frac{28}{56} \times 100 = 50\%$$


گزینه ۲ صحیح است زیرا:



$$?g Fe = \lambda_0 g CO \times \frac{2 mol Fe}{3 mol CO} \times \frac{56 g Fe}{1 mol Fe} = 112 g Fe$$

$$\text{بازده درصدی} = \frac{89.6}{112} \times 100 = 80\%$$


رد گزینه ۳:



$$?g Fe = \lambda_0 g C \times \frac{1 mol C}{12 g C} \times \frac{2 mol Fe}{3 mol C} \times \frac{56 g Fe}{1 mol Fe} = 224 g Fe$$

$$\text{بازده درصدی} = \frac{224}{224} \times 100 = 100\%$$



رد گزینه ۴:



$$?g C_2H_5OH = \lambda_0 g C_{12}H_{12}O_2 \times \frac{1 mol C_2H_5O_2}{180 g C_{12}H_{12}O_2} \times \frac{2 mol C_2H_5OH}{1 mol C_{12}H_{12}O_2} \times \frac{46 g C_2H_5OH}{1 mol C_2H_5OH} = 46 g C_2H_5OH$$

$$\text{بازده درصدی} = \frac{34.5}{46} \times 100 = 75\%$$

۱۵۶. گزینه ۳ ابتدا معادله موازنه شده واکنش‌ها را می نویسیم:



و سپس مقدار مول MX_2 را بدست می آوریم:

$$O_r = 16 \times 2 = 32 g \cdot mol^{-1}$$

$$?mol MX_r = 16 g O_r \times \frac{1 mol O_r}{32 g O_r} \times \frac{1 mol MX_r}{3 mol O_r} = 0.05 mol MX_r$$

جرم مولی AgX را محاسبه می کنیم:

$$?mol AgX = 0.05 mol MX_r \times \frac{1 mol AgX}{1 mol MX_r} \times \frac{100}{100} = 0.05 mol AgX$$

$$\text{جرم مولی } AgX = 1 mol AgX \times \frac{114 g AgX}{0.05 mol AgX} = 143.5 g AgX \leftarrow \text{جرم مولی } AgX$$

حال جرم مولی عنصر X را محاسبه می کنیم:

$$X = 143.5 g \cdot mol^{-1} - 108 g \cdot mol^{-1} = 35.5 g \cdot mol^{-1}$$

در مرحله بعد جرم مولی MX_2 را محاسبه می کنیم:

$$MX_2 = 1 mol MX_r \times \frac{55.5 g MX_r}{0.05 mol MX_r} = 111 g MX_r \leftarrow MX_2 \leftarrow MX_r$$

حال جرم مولی M را بدست می‌آوریم:

$$M = 111 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} - (2 \times 35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) = 40 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\begin{cases} M = 40 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ X = 35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \end{cases} \rightarrow X, M = 40 - 35,5 = 4,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

۱۵۷. گزینه ۴

جرم N_2 و O_2 ناچالص را x گرم در نظر می‌گیریم:

$$(N_r = 14 \times 2 = 28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, NH_r = 14 + (1 \times 3) = 17 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$(xg N_r \times \frac{P_1 \text{ g } N_r}{100 \text{ g } N_r} \times \frac{1 \text{ mol } N_r}{28 \text{ g } N_r} \times \frac{2 \text{ mol } NH_r}{1 \text{ mol } N_r} \times \frac{17 \text{ g } NH_r}{1 \text{ mol } NH_r}) = \frac{34xP_1}{2800}$$

$$(O_r = 16 \times 2 = 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, H_r O = (1 \times 2) + 16 = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$(xg O_r \times \frac{P_2 \text{ g } O_r}{100 \text{ g } O_r} \times \frac{1 \text{ mol } O_r}{32 \text{ g } O_r} \times \frac{2 \text{ mol } H_r O}{1 \text{ mol } O_r} \times \frac{18 \text{ g } H_r O}{1 \text{ mol } H_r O}) = \frac{36xP_2}{3200}$$

حال طبق صورت سوال جرم فرآورده‌ها یکسان است.

$$\frac{36xP_2}{3200} = \frac{34xP_1}{2800} \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = 1,08$$

۱۵۸. گزینه ۲

$$\text{ابتدا هیدروژن مورد نیاز برای تولید ۱ لیتر آب را محاسبه می‌کنیم. } (H_r O = (1 \times 2) + 16 = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$? \text{ mol } H_r = 16 \text{ lit } H_r O \times \frac{1 \text{ g } H_r O}{1 \text{ lit } H_r O} \times \frac{1 \text{ mol } H_r O}{18 \text{ g } H_r O} \times \frac{1 \text{ mol } H_r}{1 \text{ mol } H_r O} = 0,8 \text{ mol } H_r$$

و برای تولید ۰,۸ مول هیدروژن بازده واکنش ظرف ۲ باید ۴۰٪ باشد.

$$115 \text{ g } Na \times \frac{1 \text{ g } Na}{100 \text{ g } Na} \times \frac{1 \text{ mol } Na}{23 \text{ g } Na} \times \frac{1 \text{ mol } H_r}{1 \text{ mol } Na} \times \frac{R}{100} = 0,8 \text{ mol } H_r \rightarrow R = 40\%$$

۱۵۹. گزینه ۳




مایع تولید شده Si و حامد باقیمانده شامل کل قطعه به جز سیلیسیم اکسید است.

$$(SiO_r = 28 + (16 \times 2) = 60 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$? \text{ g } SiO_r = 0,42 \text{ g } Si \times \frac{1 \text{ mol } Si}{28 \text{ g } Si} \times \frac{1 \text{ mol } SiO_r}{1 \text{ mol } Si} \times \frac{60 \text{ g } SiO_r}{1 \text{ mol } SiO_r} = 0,9 \text{ g } SiO_r$$

$$= \frac{0,42}{0,9 + 2,42} \times 100 \rightarrow 12,5\%$$

۱۶۰. گزینه ۲



جرم متان (CH_r) و جرم پروپان ($C_r H_\lambda$) را برابر با m و درصد خلوص P_1 و درصد خلوص پروپان را P_2 در نظر گرفته و خواهیم داشت:

$$CH_r = 12 + (1 \times 4) = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$CH_r \text{ برای } \rightarrow ? \text{ lit } CO_r = mg CH_r \times \frac{P_1}{100} \times \frac{1 \text{ mol } CH_r}{16 \text{ g } CH_r} \times \frac{1 \text{ mol } CO_r}{1 \text{ mol } CH_r} \times \frac{22,4 \text{ lit } CO_r}{1 \text{ mol } CO_r}$$

$$= \frac{mP_1 \times 22,4}{1,6 \times 10^3} \text{ lit } CO_r$$

$$C_r H_\lambda \text{ برای } \rightarrow C_r H_\lambda = (12 \times 3) + (1 \times 1) = 44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$


$$? \text{ lit } CO_r = mg C_r H_\lambda \times \frac{P_2}{100} \times \frac{1 \text{ mol } C_r H_\lambda}{44 \text{ g } C_r H_\lambda} \times \frac{4 \text{ mol } CO_r}{1 \text{ mol } C_r H_\lambda} \times \frac{22,4 \text{ lit } CO_r}{1 \text{ mol } CO_r}$$

$$= \frac{mP_2 \times 3 \times 22,4}{4,4 \times 10^3} \text{ lit } CO_r$$

CH_r حاصل از سوختن CO_r حجم $C_r H_\lambda$ حاصل از سوختن CO_r

$$\rightarrow \frac{mP_1 \times 22,4}{1,6 \times 10^3} = \frac{mP_2 \times 3 \times 22,4}{4,4 \times 10^3} \rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{3 \times 1,6}{4,4} = 1,09$$

۱۶۱. گزینه ۲ اگر جرم متان (CH_4) را x و جرم پروپان (C_3H_8) را $(15 - x)$ گرم در نظر بگیریم و واکنش‌های سوختن هر یک را نوشته و موازن کنیم:



بنابراین جرم متان در مخلوط اولیه برابر ۴ گرم بوده است.

$$\text{درصد جرمی متان} = \frac{4}{15} \times 100 \approx 26,7\%$$


۱۶۲. گزینه ۲ واکنش‌پذیری این عنصر از کربن کمتر است. زیرا وقتی عنصری در یک واکنش، جای عنصر دیگر را می‌گیرد پس واکنش‌پذیری آن بیشتر است. در این واکنش C جایگزین Si در ترکیب می‌شود.

(جرم ناخالصی) $12g = 100 - 88 \Rightarrow$ مجموع جرم فرآورده‌ها – مجموع جرم واکنش‌دهنده‌ها

جرم ناخالصی $= 44 = 32 + 12$ جرم سیلیسیم = جرم جامد باقیمانده


$$\frac{32}{44} \times 100 \approx 72,7\% \text{ درصد خلوص}$$

۱۶۳. گزینه ۲ با استفاده از واکنش دوم تعداد مول CO را به دست می‌آوریم:



$$? \text{ mol } CO = 672 \text{ kg } Fe \times \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \times \frac{1 \text{ mol } Fe}{56 \text{ g } Fe} \times \frac{4 \text{ mol } CO}{2 \text{ mol } Fe} \times \frac{100}{90} = 20000 \text{ mol } CO$$

با استفاده از واکنش اول جرم CH_4 را محاسبه می‌کنیم:



چون بازده واکنش را صورت سؤال داده بایستی مقدار نظری (CO) را محاسبه کنیم:

$$\frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 \Rightarrow 90 = \frac{20000}{x} \times 100$$

$$\Rightarrow x = 22222,22 \text{ mol } CO$$

$$? \text{ g } CH_4 = 22222,22 \text{ mol } CO \times \frac{1 \text{ mol } CH_4}{1 \text{ mol } CO} \times \frac{16 \text{ g } CH_4}{1 \text{ mol } CH_4} \times \frac{100}{80} = 44444,4 \text{ g } CH_4$$

روش دوم: تناسب



$$\frac{CO \text{ مول}}{\text{ضریب}} \times \frac{\text{بازده درصدی}}{\text{ضریب}} = \frac{Fe \text{ جرم}}{\text{ضریب} \times \text{جرم مولی}}$$

$$\Rightarrow \frac{0,9 \times x}{3} = \frac{672 \times 10^3 \text{ g}}{56 \times 2} \Rightarrow x = 20000 \text{ mol } CO$$



$$\frac{CO \text{ مول}}{\text{ضریب واکنش اول} \times \text{ضریب}} = \frac{CO \text{ جرم}}{\text{ضریب واکنش اول} \times \text{جرم مولی}}$$

$$\Rightarrow \frac{0,8 \times 0,9 \times y}{1 \times 16} = \frac{20000}{1} \Rightarrow y = 4,4 \times 10^5 \text{ g } CH_4$$

$$\begin{aligned} & \text{ناخالص} \times \frac{80 \text{ g}}{100 \text{ g}} = 33,5 \text{ g Al}_2(\text{SO}_4)_3 \quad \text{جرم جامد تولید شده} \\ & \times \frac{1 \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3}{342 \text{ g Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times \frac{1 \text{ mol Al}_2\text{O}_3}{1 \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times \frac{102 \text{ g Al}_2\text{O}_3}{1 \text{ mol Al}_2\text{O}_3} \times \underbrace{\frac{x}{100}}_{(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3)} \\ & \text{درصد تجزیه شده جامد اولیه} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} & = 0,08x \text{ g Al}_2\text{O}_3 \\ & = 33,5 \times \frac{2}{100} = 6,7 \text{ g} \quad \text{جرم ناخالص} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & ?mL SO_4 = 33,5 \text{ g Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times \frac{100 \text{ g}}{\text{ناخالص}} \times \frac{100 \text{ g}}{100 \text{ g}} (\text{حجم گاز تولید شده}) \\ & \times \frac{1 \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3}{342 \text{ g Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times \frac{3 \text{ mol SO}_4}{1 \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times \frac{22400 \text{ mL SO}_4}{1 \text{ mol SO}_4} \times \frac{83,75}{100} \simeq 4410 \text{ mL SO}_4 \end{aligned}$$

۱۶۵ . گزینه ۳ پاک‌کننده غیرصابونی:



پاک‌کننده صابونی:



پاک‌کننده غیرصابونی ۲ اتم کربن بیشتر، ۲ اتم هیدروژن کمتر، یک اتم گوگرد و یک اتم اکسیژن بیشتر دارد.
 نقاوت جرم مولی $= (2 \times 12) - (2 \times 1) + 32 + 16 = 70$

۱۶۶ . گزینه ۱ واکنش استخراج آهن از هماتیت:

$$2Fe_3O_4 + 3C \rightarrow 3CO_2 + 4Fe$$

$$?molCO_2 = 400 \text{ g Fe}_3\text{O}_4 \times \frac{100 \text{ g}}{\text{ناخالص}} \times \frac{1 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4}{160 \text{ g Fe}_3\text{O}_4} \times \frac{3 \text{ mol CO}_2}{4 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4} \times \frac{70}{100} = 2,1 \text{ mol}$$


واکنش تخمیری بی‌هوایی گلوکز:



$$?molCO_2 = 36000 \text{ g} \times \frac{20 \text{ g}}{\text{پسماند}} \times \frac{1 \text{ mol}}{100 \text{ g}} \times \frac{2 \text{ mol CO}_2}{180 \text{ g}} \times \frac{75}{1 \text{ mol}} \times \frac{75}{100} = 60 \text{ mol}$$

$$\frac{2,1}{60} = 35 \times 10^{-3}$$

۱۶۷ . گزینه ۱ برای حل، ابتدا موازنی می‌کنیم:



ابتدا جرم هر مول واکنش‌دهنده و فراورده جامد را محاسبه می‌کنیم:


$$1 \text{ mol } (NH_4)_2Cr_2O_7 = 252 \text{ g} \quad 1 \text{ mol } Cr_2O_7 = 152 \text{ g}$$

یعنی بهازاری هر ۲۵۲ واکنش‌دهنده‌ای که تجزیه می‌شود (کم می‌شود)، ۱۵۲ گرم فراورده تولید می‌شود.

فرض کنیم: مول از ۱ مول آمونیوم دی‌کرومات تجزیه شود در این صورت x مول هم Cr_2O_7 تولید می‌شود.

$$(1 - x) \text{ mol} \times 252 = x \times 152 \Rightarrow x = 0,62 \text{ mol} \Rightarrow \frac{0,62}{1} \times 100 = 62$$

۱۶۸ . گزینه ۲



ابتدا مقدار آهن مذاب برای جوش دادن مسیر را محاسبه می‌کنیم:

$$2,8 \times 950 = 2660 \text{ g} \quad \text{کیلوگرم آهن مذاب}$$

حال مقدار Al مورد نیاز را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} & 2660 \text{ kg Fe} \times \frac{1000 \text{ g Fe}}{1 \text{ kg Fe}} \times \frac{1 \text{ mol Fe}}{56 \text{ g Fe}} \times \frac{2 \text{ mol Al}}{2 \text{ mol Fe}} \times \frac{27 \text{ g Al}}{1 \text{ mol Al}} \times \frac{100}{80} \times \frac{100}{60} \\ & = 2671875 \text{ g Al} \simeq 2672 \text{ kg Al} \end{aligned}$$

روش دوم:

$$\frac{x \text{ kg Al} \times 100 \times 60}{2 \times 27 \times 100 \times 11} = \frac{2660 \text{ kg Fe}}{2 \times 56} \Rightarrow x = 2672 \text{ kg Al}$$

۱۶۹ . گزینه ۱ الف)


مسائل چالشی شیمی کنکور

$$?gAu = 20 \text{ ton} \times \frac{1000 \text{ kg}}{\text{گیاه}} \times \frac{0,1 gAu}{1 \text{ kg}} = 2000 \text{ gAu}$$

(ب)

$$\frac{38}{152} \times 100 = 25\%$$


(پ) این روش برای استخراج فلزهای Zn و Ni مقرر نیست چون از معادن با صرفه تر استخراج می‌شوند و حجم گیاه نسبت به درصد و قیمت این فلزها مقرر به صرفه نمی‌باشد.



$$?gFe = 40 gFe_3O_4 \times \frac{1 \text{ mol } Fe_3O_4}{160 gFe_3O_4} \times \frac{4 \text{ mol } Fe}{2 \text{ mol } Fe_3O_4} \times \frac{56 gFe}{1 \text{ mol } Fe} = 28 gFe$$

$$(Fe = 56 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}), [Fe_3O_4 = (56 \times 2) + (16 \times 3) = 160 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}]$$

جرم اتم آهن تولید شده نشان می‌دهد که از مقدار مورد انتظار می‌بیشتر است پس این میزان خطای می‌تواند ناشی از خطای در اندازه‌گیری با ترازو باشد و سایر مواد می‌توانند مقدار عملی را کم تر نشان دهد.



$$Fe_3O_4 = (56 \times 2) + (16 \times 3) = 160 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$?ton Fe_3O_4 = 1,12 ton Fe \times \frac{10^3 g Fe}{1 ton Fe} \times \frac{1 mol Fe}{56 g Fe} \times \frac{1 mol Fe_3O_4}{4 mol Fe} \times \frac{16 g Fe_3O_4}{1 mol Fe_3O_4} \times \frac{1 ton Fe_3O_4}{10^3 g Fe_3O_4}$$

$$\times \frac{100 ton Fe_3O_4}{\text{نالخص}} = \frac{\text{نالخص}}{\text{نالخص}} = 2 ton Fe_3O_4$$

$$?ton Ti = 1,12 ton Fe \times \frac{10^3 g Fe}{1 ton Fe} \times \frac{1 mol Fe}{56 g Fe} \times \frac{3 mol Ti}{4 mol Fe} \times \frac{48 g Ti}{1 mol Ti} \times \frac{1 ton Ti}{10^3 g Ti} = 0,72 ton Ti$$

۱۷۲. گزینه ۱

$$Fe_3O_4 = (56 \times 2) + (16 \times 3) = 160 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$CaCO_3 = 40 + 12 + (16 \times 3) = 100 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$?gFe_3O_4 = 160 gFe \times \frac{160 gFe_3O_4}{112 gFe} = 20 gFe_3O_4$$

مقدار خالص


$$= \frac{\text{جرم خالص}}{\text{جرم نالخص}} \times 100 \rightarrow \frac{20}{40} \times 100 = 50\%$$

$$?gCaCO_3 = 160 Ca \times \frac{100 gCaCO_3}{40 gCa} = 40 gCaCO_3$$

مقدار خالص


$$= \frac{\text{مقدار خالص}}{\text{مقدار نالخص}} \times 100 \rightarrow \frac{40}{50} \times 100 = 80\%$$

۱۷۳. گزینه ۱



$$?litH_2 = 9 gFe \times \frac{10}{100} \times \frac{1 \text{ mol } Fe}{56 gFe} \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{1 \text{ mol } Fe} \times \frac{2 g H_2}{1 \text{ mol } H_2} \times \frac{1 lit H_2}{0,01 g H_2} = 2,81 lit H_2$$

۱۷۴. گزینه ۴



در این معادله فرآورده‌های دارای جرم $K_2MnO_4(s)$ و $MnO_2(s)$ هستند که از ۲ مول $KMnO_4(s)$ ۱ مول از هر کدام ایجاد شده است. پس:

$$K_2MnO_4 = (39 \times 2) + 55 + (16 \times 4) = 197 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$MnO_2 = 55 + (16 \times 2) = 87 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$KMnO_4 = 39 + 55 + (16 \times 4) = 158 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

→ ۱۹۷ - ۸۷ = ۱۱۰ g $KMnO_4$ مول ۲ به اجزای تجزیه

$$?gKMnO_4 = \frac{158 g}{5,5 g} \times \frac{2 \text{ mol } KMnO_4}{110 g} \times \frac{158 g KMnO_4}{1 \text{ mol } KMnO_4} \times \frac{100}{10} = 19,75 g KMnO_4$$

نقاؤت جرم فرآورده

$$= \frac{19,75}{23,7} \times 100 = 83,3\%$$

۱۷۵. گزینه ۴

روش اول: $2Fe_3O_4 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$

مسائل چالشی شیمی کنکور

$$\begin{aligned} ?gFe &= 40gFe_{\text{r}}O_{\text{r}} \times \frac{1\text{mol}Fe_{\text{r}}O_{\text{r}}}{160gFe_{\text{r}}O_{\text{r}}} \times \frac{4\text{mol}Fe}{2\text{mol}Fe_{\text{r}}O_{\text{r}}} \times \frac{56gFe}{1\text{mol}Fe} \times \frac{R}{100} \\ &= 19.6gFe \rightarrow R = 70\% \end{aligned}$$

بازده درصدی واکنش اول

$$\begin{aligned} ?LCO_{\text{r}} &= 91.6gFe \times \frac{1\text{mol}Fe}{56gFe} \times \frac{3\text{mol}CO_{\text{r}}}{4\text{mol}Fe} \times \frac{22.4LCO_{\text{r}}}{1\text{mol}CO_{\text{r}}} \\ &= 5.88LCO_{\text{r}} \end{aligned}$$

حجم گاز تولیدی در واکنش اول : $Fe_{\text{r}}O_{\text{r}} + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_{\text{r}}$


$$\begin{aligned} ?gFe &= 10gFe_{\text{r}}O_{\text{r}} \times \frac{1\text{mol}Fe_{\text{r}}O_{\text{r}}}{160gFe_{\text{r}}O_{\text{r}}} \times \frac{2\text{mol}Fe}{1\text{mol}Fe_{\text{r}}O_{\text{r}}} \times \frac{56gFe}{1\text{mol}Fe} \times \frac{R'}{100} \\ &= 5.2gFe \rightarrow R' \approx 74.3\% \end{aligned}$$

بازده درصدی واکنش دوم

$$\begin{aligned} ?LCO_{\text{r}} &= 5.2gFe \times \frac{1\text{mol}Fe}{56gFe} \times \frac{3\text{mol}CO_{\text{r}}}{2\text{mol}Fe} \times \frac{22.4LCO_{\text{r}}}{1\text{mol}CO_{\text{r}}} \\ &= 3.12LCO_{\text{r}} \end{aligned}$$

حجم گاز تولیدی در واکنش دوم : $LCO_{\text{r}} = 5.88 + 3.12 = 9LCO_{\text{r}}$

۱۷۶. گزینه ۲



فرض می‌کنیم جرم کل گلوکز Ag و بازده درصدی واکنش $R\%$ می‌باشد.

$$\begin{aligned} ?gCO_{\text{r}} &= AgC_6H_{12}O_6 \times \frac{1\text{mol}}{180g} \times \frac{2\text{mol}CO_{\text{r}}}{1\text{mol}C_6H_{12}O_6} \times \frac{44g}{1\text{mol}} \times \frac{R}{100} = \frac{2 \times 44 \times A \times R}{180 \times 100} \\ ?g &= A - \frac{A \times R}{100} = A(1 - \frac{R}{100}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \times 44 \times R \times A}{100 \times 180} = A(1 - \frac{R}{100}) \Rightarrow R \approx 67\%$$

۱۷۷. گزینه ۳ چون به جزء همه مواد شرکت کننده در واکنش جامد هستند، می‌توان نتیجه گرفت CO_{r} گاز $44kg$ تولید شده است.

$$?LCO_{\text{r}} = 44kgCO_{\text{r}} \times \frac{1000g}{1kg} \times \frac{1\text{mol}CO_{\text{r}}}{44gCO_{\text{r}}} \times \frac{22.4LCO_{\text{r}}}{1\text{mol}CO_{\text{r}}} = 22400LCO_{\text{r}}$$


$$?kgFe = 44kgCO_{\text{r}} \times \frac{1000g}{1kg} \times \frac{1\text{mol}CO_{\text{r}}}{44gCO_{\text{r}}} \times \frac{4\text{mol}Fe}{3\text{mol}CO_{\text{r}}} \times \frac{56gFE}{1\text{mol}FE} \times \frac{1Kg}{1000g} \approx 74.67kgFe$$

۱۷۸. گزینه ۱ ابتدا با استفاده از حجم گاز اکسیژن، جرم اکسیژن تولید شده را محاسبه می‌کنیم تا براساس قانون پایستگی جرم، جرم اولیه به دست بیاوریم:

$$5.6LO_{\text{r}} \times \frac{1\text{mol}O_{\text{r}}}{22.4LO_{\text{r}}} \times \frac{32gO_{\text{r}}}{1\text{mol}O_{\text{r}}} = 8gO_{\text{r}}$$


$$52.5 + 8 = 60.5g$$

جرم اولیه پتانسیم نیترات و همچنین درصد خلوص آن را می‌توان براساس کسرهای تناسب به صورت زیر به دست آورد:




$$\frac{A}{100} \times \frac{60.5}{2 \times 101} = \frac{8}{1 \times 32} \Rightarrow A = 8.83\%$$

۱۷۹. گزینه ۴




$$\frac{n}{1} \times \frac{60}{100} = \frac{80}{100} \times \frac{20}{1 \times 160} \rightarrow n = 0.166 \text{ mol}$$



$$\frac{60}{100} \times \frac{m}{80} = \frac{0.166}{1} \rightarrow m = 24.17 g$$

۱۸۰. گزینه ۳ ابتدا مقدار گلوکزی را که در واکنش جانبی هدر رفته است، می‌باییم:



$$?kgC_6H_{12}O_6 = 216kg H_{\text{r}}O \times \frac{1000gH_{\text{r}}O}{1kgH_{\text{r}}O} \times \frac{1\text{mol}H_{\text{r}}O}{1\text{mol}H_{\text{r}}O} \times \frac{1\text{mol}C_6H_{12}O_6}{6\text{mol}H_{\text{r}}O} \times \frac{1\text{kg}C_6H_{12}O_6}{1000gC_6H_{12}O_6} \times \frac{1kgC_6H_{12}O_6}{1000gC_6H_{12}O_6} = 36kgC_6H_{12}O_6$$

حال با کمک این مقدار گلوکز، مقدار نظری اثانول را می‌باییم:




مسائل چالشی شیمی کنکور

$$?kgC_2H_5OH = ۳۶ \times kgC_2H_{12}O_2 \times \frac{۱۰۰\ molC_2H_{12}O_2}{۱kgC_2H_{12}O_2} \times \frac{۱molC_2H_{12}O_2}{۱۸\ molC_2H_{12}O_2} \times \frac{۲molC_2H_5OH}{۱molC_2H_{12}O_2} \times \frac{۴۶gC_2H_5OH}{۱molC_2H_5OH} \times \frac{۱kgC_2H_5OH}{۱۰۰\ molC_2H_5OH} = ۱۸۴kgC_2H_5OH$$

مقدار نظری اثانول
= ۱۸۴ + ۷۳۶ = ۹۲۰ kg
 $\frac{۷۳۶}{۹۲۰} \times ۱۰۰ = ۸۰\%$

۱۸۱. گزینه ۱ برای محاسبه جرم جامد باقیمانده، باید جرم گاز تولید شده را به دست آورده و از جرم اولیه کم کنیم.




$$\frac{۸۰}{۱۰۰} \times \frac{۲۸۵}{۳۴۲} \times \frac{۷۵}{۱۰۰} = \frac{m}{۳ \times ۸۰}$$

$$m = ۱۲۰ g SO_2$$

$$\text{جرم جامد باقیمانده} = ۲۸۵ - ۱۲۰ = ۱۶۵ g$$

$$120 g SO_2 \times \frac{1 mol}{10 g} \times \frac{۳۲,۴ g}{1 mol} = ۳۲,۴ L$$

۱۸۲. گزینه ۲ برای حل این مسائل که با دو واکنش روبه رو هستیم، باید ماده‌ای مشترک بین دو واکنش پیدا کرده و اطلاعات مسأله را بهم مرتبط کنیم. (P: درصد خلوص)



$$?g Li_2CO_3 = ۹۲ g Li_2O_2 \times \frac{۷۵ g Li_2O_2}{۱۰۰ g Li_2O_2} \times \frac{۱ mol Li_2O_2}{۴۶ g Li_2O_2} \times \frac{۲ mol Li_2CO_3}{۲ mol Li_2O_2} \times \frac{۷۴ g Li_2CO_3}{۱ mol Li_2CO_3} \times \frac{۶۰}{۱۰۰} = ۶۶,۶ g Li_2CO_3$$

$$?g Li_2CO_3 = ۱۲۵ g LiOH \times \frac{P g LiOH}{۱۰۰ g LiOH} \times \frac{۱ mol LiOH}{۲۴ g LiOH} \times \frac{۲ mol Li_2CO_3}{۴ mol LiOH} \times \frac{۷۴ g Li_2CO_3}{۱ mol Li_2CO_3} \simeq ۶۶,۶ g Li_2CO_3$$

مقدار Li_2CO_3 تولیدی در هر دو واکنش را باهم برابر می‌گذاریم.


$$1,۹۳P = ۶۶,۶ \Rightarrow P \simeq ۳۴,۵$$

روش دوم:



$$\frac{125 g \times a}{4 \times 24 \times 100} \times \frac{100}{100} = \frac{92 g \times 75 \times 60}{2 \times 46 \times 100 \times 100} = a = ۳۴,۵\%$$


۱۸۳. گزینه ۲



$$\Rightarrow x = \frac{4 mol}{mol} = ۵L \Rightarrow x = ۵۰۰ ?mol HCl = ۱۰۰ g MnO_2 \times \frac{۸۷ g MnO_2}{۱۰۰ g MnO_2} \times \frac{۱ mol MnO_2}{۸۷ g MnO_2} \times \frac{۴ mol HCl}{1 mol MnO_2} = ۴ mol HCl$$

$$?LCl_4 = 100 g MnO_2 \times \frac{۸۷ g MnO_2}{100 g MnO_2} \times \frac{1 mol MnO_2}{۸۷ g MnO_2} \times \frac{1 mol Cl_2}{1 mol MnO_2} \times \frac{۲۲,۴ L Cl_2}{1 mol Cl_2} \times \frac{۷۵}{100} = ۱۶,۸ L Cl_2$$

۱۸۴. گزینه ۳ ابتدا معادله واکنش را موازنہ می کنیم؛ سپس جرم N_2 و O_2 حاصل از واکنش را به دست می آوریم:



$$?mol KNO_3 = ۸۰,۸ g KNO_3 \times \frac{1 mol KNO_3}{101 g KNO_3} \times \frac{۶۰}{100} = ۰,۴۸ mol KNO_3 ?g N_2 = ۰,۴۸ mol KNO_3 \times \frac{۲ mol N_2}{4 mol KNO_3} \times \frac{۲۸ g N_2}{1 mol N_2} = ۶,۷۲ g N_2$$

$$?g O_2 = ۰,۴۸ mol KNO_3 \times \frac{۵ mol O_2}{4 mol KNO_3} \times \frac{۳۲ g O_2}{1 mol O_2} = ۱۹,۲ g O_2$$

$$\text{جرم کل گازهای تولید شده} = ۱۹,۲ g + ۶,۷۲ g = ۲۵,۹۲ g$$

$$\frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 \Rightarrow ۷۵ = \frac{x}{25,92} \times 100$$

$$\text{گاز} = ۱۹,۴۴ g$$

۱۸۵. گزینه ۴ جرم N_2 و O_2 ناخالص را x گرم در نظر می‌گیریم:

$$(1) g = xgN_2 \times \frac{P_1 g N_2}{100 g N_2} \times \frac{1 mol N_2}{۲۸ g N_2} \times \frac{۲ mol NH_3}{1 mol N_2} \times \frac{۱۷ g NH_3}{1 mol NH_3} = \frac{۳۴ x P_1}{۲۸۰}$$


$$(2) g = xgO_2 \times \frac{P_1 g O_2}{100 g O_2} \times \frac{1 mol O_2}{۳۲ g O_2} \times \frac{۲ mol H_2O}{1 mol O_2} \times \frac{۱۸ g H_2O}{1 mol H_2O} = \frac{۳۶ x P_1}{۳۲۰}$$

طبق صورت سؤال، جرم فرآورده‌ها یکسان است.

مسائل چالشی شیمی کنکور

$$\frac{36xP_2}{3200} = \frac{34xP_1}{2800} \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} \approx 1,08$$

۲. گزینه ۱۸۶



$$220g CO_2 \times \frac{1mol CO_2}{44g CO_2} \times \frac{2mol C_2H_5OH}{2mol CO_2} = 5mol C_2H_5OH$$

حال همین مقدار اتانول را باید در واکنش دوم به دست آوریم:

$$5mol C_2H_5OH \times \frac{1mol C_2H_4}{1mol C_2H_5OH} \times \frac{28g C_2H_4}{1mol C_2H_4} \times \frac{100g \text{ ناخالص}}{80g \text{ خالص}} \times \frac{100 \text{ نظری}}{50 \text{ عملی}} = 350g$$

۱۸۷. گزینه ۲ ابتدا باید تعداد اتم‌های کربن و هیدروژن را در پاک‌کننده صابونی به دست آوریم:

فرمول عمومی پاک‌کننده‌های صابونی به صورت $C_nH_{2n-1}O_2Na$ است.

$$\frac{45}{8} = \frac{\text{درصد جرمی کربن}}{\text{درصد جرمی اکسیژن}} = \frac{n(12)}{2(16)} \Rightarrow n = 15$$

$$= 2(15) - 1 = 29$$

فرمول عمومی پاک‌کننده‌های غیر صابونی با زنجیر هیدروکربنی سیر شده به صورت $C_mH_{2m-2}SO_2Na$ است.

$$2m - 2 = 29 \Rightarrow m = 18$$

$$\text{فرمول مولکولی پاک‌کننده غیرصابونی} = C_{18}H_{29}SO_2Na$$

$$\text{جرم اتم گوگرد} \times 100 = \frac{\text{جرم ترکیب}}{\text{جرم ماده خالص}} \times 100 = \frac{1(32)}{18(12) + 29(1) + 1(32) + 2(16) + 1(23)} \times 100 = \frac{32}{348} \times 100 = 9,2\%$$

۱۸۸. گزینه ۴

$$\frac{\text{جرم ماده خالص}}{\text{جرم کل}} \times 100 = \frac{\text{جرم ماده خالص}}{\text{جرم کل}} \times 100 \Rightarrow 60 = \frac{121,2}{72,72} \times 100 \Rightarrow 72,72g KNO_3$$

$$?g O_2 = 72,72g KNO_3 \times \frac{1mol KNO_3}{101g KNO_3} \times \frac{1mol O_2}{1mol KNO_3} \times \frac{32g O_2}{1mol O_2} = 11,52g O_2$$

$$\text{جرم } O_2 \text{ واکنش اول} = \frac{1}{6} \text{ جرم } O_2 \text{ واکنش دوم}$$

$$= \frac{1}{6} \times 11,52 = 1,92g O_2$$

$$?g KCl = 1,92g O_2 \times \frac{1mol O_2}{32g O_2} \times \frac{74,5g KCl}{2mol O_2} \times \frac{1mol KCl}{1mol O_2} = 2,98g KCl$$

۱۸۹. گزینه ۳

$$\frac{KHC_2O_4 \text{ جرم}}{KHC_2O_4 \text{ جرم مولی} \times \text{ضریب}} = \frac{CO_2 \text{ جرم}}{\text{CO}_2 \text{ جرم مولی} \times \text{ضریب}} \Rightarrow \frac{KHC_2O_4 \text{ جرم}}{2 \times 100} = \frac{3,52}{1 \times 44} \Rightarrow KHC_2O_4 \text{ جرم} = 16g$$

$$\frac{\text{جرم بخار آب در واکنش دوم}}{\text{جرم مولی} \times \text{ضریب}} = \frac{CO_2 \text{ جرم}}{\text{CO}_2 \text{ جرم مولی} \times \text{ضریب}}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{جرم بخار آب در واکنش دوم}}{1 \times 18} = \frac{3,52}{1 \times 44}$$

$$\Rightarrow \text{جرم بخار آب در واکنش دوم} = 1,44g$$

$$= \text{جرم بخار آب در واکنش اول} = 10,44 - 1,44 = 9g$$

مسائل چالشی شیمی کنکور


$$\frac{NaOH \text{ جرم}}{\text{جرم مولی} \times \text{ضریب}} = \frac{\text{جرم بخار آب در واکنش اول}}{\text{درصد جرمی سدیم هیدروکسید}} \Rightarrow \frac{NaOH \text{ جرم}}{2 \times 40} = \frac{9}{1 \times 18}$$

$$\Rightarrow NaOH \text{ جرم} = 40 \text{ g}$$


$$\frac{\text{جرم سدیم هیدروکسید}}{\text{جرم مخلوط}} \times 100 = \frac{\text{درصد جرمی سدیم هیدروکسید}}{100}$$

$$\frac{40}{40 + 16} \times 100 = 71,4\%$$

گزینه ۱ آنکه استر A به صورت زیر می‌باشد:



شمار کربن‌های کربوکسیلیک اسید حاصل ۱۷ اتم بوده که برابر شمار اتم‌های کربن زنجیر هیدروکربنی صابون جامد می‌باشد.



تعداد اتم‌های کربن الكل حاصل، ۱۸ بوده که برابر تعداد اتم‌های کربن زنجیر هیدروکربنی پاک‌کننده غیرصابونی می‌باشد.



$$306 \text{ g} \cdot mol^{-1} : \text{جرم مولی صابون جامد}$$

$$= 432 \text{ g} \cdot mol^{-1} : \text{جرم مولی پاک‌کننده غیرصابونی}$$

$$432 - 306 = 126 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

گزینه ۱۹۱

$$?gNa_2O = 144gFeO \times \frac{1molFeO}{72gFeO} \times \frac{1molNa_2O}{1molFeO} \times \frac{62gNa_2O}{1molNa_2O} = 124gNa_2O \text{ مقدار نظری}$$

$$(1) \quad \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 = \frac{93}{124} \times 100 = 75\%$$

$$?gFe = 320gFe_2O_3 \times \frac{1molFe_2O_3}{160gFe_2O_3} \times \frac{4molFe}{2molFe_2O_3} \times \frac{56gFe}{1molFe} = 224gFe \text{ مقدار نظری}$$

$$(2) \quad \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 = \frac{56}{224} \times 100 = 25\% \text{ بازده درصدی واکنشگاه}$$

$$?molCO_2 = 56gFe \times \frac{1molFe}{56gFe} \times \frac{3molCO_2}{4molFe} = 0,75molCO_2$$

گزینه ۲ از آنجا که هر دو واکنش در شرایط STP انجام می‌شوند، شمار مول‌های گاز CO₂ حاصل از دو واکنش نیز برابر است. ابتدا شمار مول‌های گاز CO₂ حاصل از واکنش سوختن متان را به دست می‌آوریم، سپس جرم CaCO₃ خالص مورد نیاز را محاسبه کرده و در پایان درصد خلوص CaCO₃ را محاسبه می‌کنیم.

$$?molCO_2 = 32gCH_4 \times \frac{1molCH_4}{16gCH_4} \times \frac{1molCO_2}{1molCH_4} = 2molCO_2$$

$$?gCaCO_3 = 2molCO_2 \times \frac{1molCaCO_3}{1molCO_2} \times \frac{100gCaCO_3}{1molCaCO_3} = 200gCaCO_3$$

$$\frac{\text{جرم ماده خالص}}{\text{جرم کل}} \times 100 = \frac{200}{250} \times 100 = 80\% \text{ درصد خلوص}$$

گزینه ۲ باتوجه به جرم CO مصرفی، جرم آهن تولیدشده در واکنش I را محاسبه می‌کنیم:

$$?gFe = 336gCO \times \frac{1molCO}{28gCO} \times \frac{2molFe}{3molCO} \times \frac{56gFe}{1molFe} = 448gFe$$

از آنجا که جرم آهن تولیدشده در واکنش I، ۸ برابر این مقدار در واکنش II می‌باشد، پس می‌توان نوشت:

$$448 = \frac{56gFe}{8} = 56gFe$$

حال می‌توان جرم Al مصرف شده در واکنش II را محاسبه کرد.

$$?gAl = 56gFe \times \frac{1molFe}{56gFe} \times \frac{2molAl}{2molFe} \times \frac{27gAl}{1molAl} = 27gAl$$


$$\begin{aligned} ?molAl &= ۸۶LH_r \times \frac{۱molH_r}{۲۲,۴LH_r} \times \frac{۱molAl}{۳molH_r} = \frac{۱}{۳}molAl \\ ?gFe &= \frac{۱}{۳}molAl \times \frac{۲molFe}{۳molAl} \times \frac{۵۶gFe}{۱molFe} \approx ۱۴۹,۳۳gFe \end{aligned}$$

جرم مولی $N_r = ۲۸g/mol$ جرم مولی $NaN_r = ۶۵g/mol$

$$?gNaN_r = ۱۰۰,۸LN_r \times \frac{۰,۹gN_r}{۱LN_r} \times \frac{۱molN_r}{۲۸gN_r} \times \frac{۱molNaN_r}{۳molN_r} \times \frac{۶۵gNaN_r}{۱molNaN_r} \times \frac{۱۰۰}{۹۰} = ۱۵۶gNaN_r$$

$$?gNaHNO_r = ۱۰۰,۸LN_r \times \frac{۰,۹gN_r}{۱LN_r} \times \frac{۱molN_r}{۲۸gN_r} \times \frac{۲molNa}{۳molN_r} \times \frac{۳molNa_O}{۷molNa} \times \frac{۲molNaHCO_r}{۱molNa_O} \times \frac{۸۴gNaHCO_r}{۱molNaHCO_r} = ۱۸۱,۴۴gNaHCO_r$$

۱۹۶ . گزینه ۳ واکشن انجام شده به صورت روبه رو است:



$$?tonFe = ۲۰.۰ton \times \frac{۱۰^۶ g}{سنگ معدن} \times \frac{xgFe_rO_r}{سنگ معدن} \times \frac{۱molFe_rO_r}{۱۶۰gFe_rO_r} \times \frac{۴molFe}{۲molFe_rO_r} \times \frac{۵۶gFe}{۱molFe} \times \frac{۱tonFe}{۱ \times ۱۰^۶ gFe} \times \frac{۷۵}{۱۰۰}$$

$= ۸۴tonFe \Rightarrow x = ۸۰\%$ درصد خلوص

$$۱۹۷ . L \cdot H_r = ۱۱۲g \cdot Fe \times \frac{۹۵}{۱۰۰} \times \frac{۱mol Fe}{۵۶g Fe} \times \frac{R}{۱۰۰} \times \frac{۱mol H_r}{۱mol Fe} \times \frac{۲g H_r}{۱mol H_r} \times \frac{۱L H_r}{۰,۱۹g H_r} = ۱۶LH_r \Rightarrow R = \%۸۰$$

ابتدا مقدار نظری اکسید قهوه ای رنگ (NO_r) در واکشن دوم را به دست می آوریم:

$$\frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times ۱۰۰ = \frac{\text{بازده درصدی}}{\text{سنگ معدن}}$$

$$۵۰ = \frac{۷۳۶}{x} \times ۱۰۰ \Rightarrow x = ۱۴۷۲gNO_r$$

اکنون مقدار مول گاز NO مصرف شده در واکشن (۲) را به دست می آوریم:



$$\Rightarrow ?molNO = ۱۴۷۲gNO_r \times \frac{۱molNO_r}{۴۶gNO_r} \times \frac{۲molNO}{۲molNO_r} = ۳۳molNO$$

۳۳ مول NO در واکشن اول تولید و در واکشن دوم مصرف شده است. اکنون با داشتن مقدار مول NO می توان جرم N_r خالص در واکشن اول را به دست آورد:

$$\Rightarrow ?gN_r = ۳۳molNO \times \frac{۱molN_r}{۲molNO} \times \frac{۲۸gN_r}{۱molN_r} = ۴۴۸gN_r$$

مقدار خالص گاز N_r مصرفی برابر با ۴۴۸ گرم و مقدار ناخالص گاز N_r مصرفی برابر با ۵۶۰ گرم است. بنابراین درصد خلوص گاز N_r را حساب می کنیم:

$$\frac{\text{مقدار ماده خالص}}{\text{مقدار ماده ناخالص}} = \frac{۴۴۸}{۵۶۰} \times ۱۰۰ = ۸۰\%$$



در واکشن (I):

$$?gN_r = ۸gO_r \times \frac{۱molO_r}{۳۲gO_r} \times \frac{۶molN_r}{۱molO_r} \times \frac{۲۸gN_r}{۱molN_r} = ۴۲gN_r$$

جرم گاز N_r حاصل از واکشن (II) برابر $70g - ۴۲g = ۲۸g$ است.

$$?molNa = ۸gN_r \times \frac{۱molN_r}{۲۸gN_r} \times \frac{۲molNa}{۳molN_r} = \frac{۵}{۳}molNa$$

۲۰۰ . گزینه ۲ چون این عنصر با جذب سه الکترون ($Z + ۳$) تعداد الکترون ها نصف عدد جرمی می شود خواهیم داشت:

$$e = Z + ۳ \Rightarrow e = \frac{A}{۲} \Rightarrow (Z + ۳) = \frac{A}{۲}$$

$$\Rightarrow A = ۲(Z + ۳) \quad (۱)$$

و از تفاوت $A - Z$ تعداد نوترون ها حاصل می شود یعنی:

$$N = A - Z \quad (۲)$$

حال تعداد A را از رابطه ۱ در رابطه ۲ قرار می دهیم:

$$N = ۲(Z + ۳) - Z \Rightarrow ۲Z + ۶ - Z = Z + ۶ \quad \text{تعداد نوترون ها}$$

تفاوت پروتون با نوترون:

$$N - Z = Z + \delta - Z = \delta$$

$$\downarrow$$

$$Z + \delta$$

۲۰۱. گزینه ۱

$${}^A_Z X^{r+} \begin{cases} e_x = Z_x - 3 \\ N_x = A_x - Z_x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_x - 3 = Z_y + 2 \Rightarrow Z_x = Z_y + 5 \\ A_x - Z_x = 34 - Z_y \end{cases} \quad (1)$$

$${}^{36}_{Z} Y^{2-} \begin{cases} e_y = Z_y + 2 \\ N_y = 34 - Z_y \end{cases} \quad (2)$$

معادله (۱) را در معادله (۲) جاگذاری می‌کنیم.

$$A_x - (Z_y + 5) = 34 - Z_y \Rightarrow A_x = 34 + 5 = 39$$

۲۰۲. گزینه ۲

$${}^{m+3}_{m-3} X^{3-} \Rightarrow \begin{cases} e = m \Rightarrow z = m - 3 \\ N = m + \delta \Rightarrow A = Z + N \Rightarrow A = m - 3 + m + \delta = 2m + 3 \end{cases}$$

و در ایزوتوپ‌های یک عنصر، عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوت است پس دو مورد می‌تواند ایزوتوپ‌های اتم X باشند یعنی جرم ${}^{m+3}_{m-3} X$ که خود اتم است باقی اتم‌ها با عدد جرمی متفاوت و عدد اتمی یکسان ایزوتوپ آن هستند.

۲۰۳. گزینه ۱ در یک اتم خنثی تعداد الکترون و پروتون برابر است ($z = e$):

$$\frac{N}{e} \stackrel{\text{از}}{\mid} \frac{N}{Z} = \frac{\lambda}{\gamma} \quad (1)$$

$$N - Z = \delta \Rightarrow N = \delta + Z \quad (2)$$

$$\frac{\delta + Z}{Z} = \frac{\lambda}{\gamma} \xrightarrow{\text{معادله (۱) را در معادله (۲) جاگذاری می‌کنیم}} \frac{\lambda}{\gamma} \Rightarrow 3\delta + \gamma Z = \lambda Z \Rightarrow Z = 3\delta$$

این عنصر با $Z = 3\delta$ اتم Br است و هم گروه آن F و Cl هستند. پس گزینه (۱) صحیح است.

۲۰۴. گزینه ۳

$${}^{n+1}_{n-2} X^{3+} \xrightarrow[\text{از دست داده است}]{\text{این عنصر سه الکترون}} e = n - 2 - 3 = n - 5 \Rightarrow e = n - 5$$

و تعداد نوترون‌های Y برابر با:

$$(n - 5) = 2(n - m) \Rightarrow 2m - n = 5$$

و برای تعداد نوترون‌های ${}^{4m-1}_{2n+2} Z$ خواهیم داشت:

$$4m - 1 - (2n + 2) \Rightarrow 4m - 1 - 2n - 2 = 2(2m - n) - 3 = 2 \times 5 - 3 = 7$$

۲۰۵. گزینه ۴

$$n + e + p = 49 \quad (1)$$

$$\begin{cases} n - p = 1 \Rightarrow p = n - 1 \\ n - e = 2 \Rightarrow e = n - 2 \end{cases} \xrightarrow{\text{جاگذاری در معادله (۱)}} n + n - 1 + n - 2 = 49 \Rightarrow 3n = 52 \Rightarrow n = \frac{52}{3}$$

چون تعداد نوترون عدد طبیعی نمی‌باشد پس نادرست است و باید تعداد الکترون‌ها از نوترون‌ها بیشتر باشد و خواهیم داشت:

$$n + e + p = 49 \quad (1)$$

$$\begin{cases} n - p = 1 \Rightarrow p = n - 1 \\ e - n = 2 \Rightarrow e = n + 2 \end{cases} \xrightarrow{\text{جاگذاری در معادله (۱)}} n + n + 2 + n - 1 = 49 \Rightarrow n = 16, e = n + 2 = 16 + 2 = 18$$

این یون دارای 16 نوترون و 18 الکترون است پس یک آئیون است.

۲۰۶. گزینه ۳ ابتدا تعداد الکترون هر یون را تعیین می‌کنیم:

$${}^{13}_{13} Al^{3+} : \bar{e} = 13 - 3 = 10$$

$${}^{15}_{15} P^{3-} : \bar{e} = 15 + 3 = 18$$

$$?g_{p^{3-}} = 5,4 g_{Al^{3+}} \times \frac{1 mol_{Al^{3+}}}{27 g_{Al^{3+}}} \times \frac{1 mol_{\bar{e}}}{1 mol_{Al^{3+}}} \times \frac{1 mol_{p^{3-}}}{1 mol_{\bar{e}}} \times \frac{31 g_{p^{3-}}}{1 mol_{p^{3-}}} \simeq 3,44 g_{p^{3-}}$$

۲۰۷. گزینه ۲ باتوجه به گزینه‌های داده شده، تعداد اتم‌های موجود در 126 گرم از هر یک از ترکیبات داده شده را محاسبه می‌کنیم:

گزینه (۱):

$$?atom = 126 g C_4H_4 \times \frac{1 mol C_4H_4}{4 g C_4H_4} \times \frac{1 mol atom}{1 mol C_4H_4} \times \frac{6,02 \times 10^{23} atom}{1 mol atom} = 126,274 \times 10^{24} atom$$

گزینه (۲):

$$?atom = 126gC_6H_{12} \times \frac{1molC_6H_{12}}{114gC_6H_{12}} \times \frac{1molatom}{1molC_6H_{12}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} atom}{1molatom} = 12,254 \times 10^{24} atom$$

گزینه ۱۳


$$?atom = 126gC_6H_6 \times \frac{1molC_6H_6}{78gC_6H_6} \times \frac{12molatom}{1molC_6H_6} \times \frac{6.02 \times 10^{23} atom}{1molatom} \approx 11,670 \times 10^{24} atom$$

گزینه ۱۴

$$?atom = 126gC_{11}H_{14} \times \frac{1molC_{11}H_{14}}{156gC_{11}H_{14}} \times \frac{15molatom}{1molC_{11}H_{14}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} atom}{1molatom} = 14,018 \times 10^{24} atom$$


با توجه به شمار اتم‌های محاسبه شده در هریک از گزینه‌ها، تنها در ۱۲۶ گرم از ترکیب موجود در گزینه ۱۴، شمار $10^{24} \times 16,254$ اتم وجود دارد.

۲۰۸. گزینه ۱



$$A = n + p \rightarrow n = A - p \xrightarrow{e=n} p + 1 = A - p \rightarrow A = 2p + 1$$


سبک تر



↓

$$\%f_1 = 62,5$$

سنگین تر



↓

$$\%f_2 = 37,5$$

$$\bar{M} = 35,75 = \frac{(2p+1) \times 62,5 + (2p+3) \times 37,5}{100} \Rightarrow p = 14$$

۲۰۹. گزینه ۲ ذرات باردار پروتون‌ها و الکترون‌ها هستند:


$$A^+ : p = n - 3$$

$$e = n - 3 - 1 = n - 4$$

$$Mg: \text{مجموع پروتون‌ها و الکترون‌ها} \Rightarrow n - 3 + n - 4 = \boxed{2n - 7} \quad \left\{ \begin{array}{l} \boxed{n - 2m} \\ \boxed{(n - 2m)} \end{array} \right\} \Rightarrow 2n - 7 = 3(n - 2m) \Rightarrow \boxed{6m - n = 7} \quad (1)$$




$$B^{3-} : \text{تعداد نوترون‌ها} \Rightarrow \frac{6m+3}{n-2} C^+ \Rightarrow 6m + 3 - (n - 2) = \underbrace{6m - n + 5}_{7} \Rightarrow 7 + 5 = 12 \quad \text{تعداد نوترون‌ها}$$

۲۱۰. گزینه ۲ معادله سوختن آلکان‌ها به صورت زیر می‌باشد:




$$?gH_2O = 6,3gC_nH_{2n+2} \times \frac{1mol C_nH_{2n+2}}{(14n+2)g C_nH_{2n+2}} \times \frac{(n+1)mol H_2O}{1mol C_nH_{2n+2}} \times \frac{18gH_2O}{1mol H_2O} \\ = 9,45gH_2O \rightarrow \frac{6,3(n+1)18}{14n+2} = 9,45 \rightarrow \boxed{n=5}$$

بنابراین فرمول مولکولی آلکان به صورت C_5H_{12} (پنتان) است که می‌تواند سه ایزومر زیر را داشته باشد.



۲۱۱. گزینه ۲ فقط (آ) صحیح است زیرا:



$$\frac{\text{جرم کربن}}{\text{جرم کل}} = \frac{\frac{11 \times 12}{156} \times 100}{\text{درصد کربن}} \simeq 84,62\% \Rightarrow 84,62 - 15,38 = 69,24$$


$$\text{درصد هیدروژن} = \frac{24 \times 1}{156} \times 100 \simeq 15,38\%$$

پس اختلاف درصد حدود ۶۹,۲۴ می‌باشد.

ب) در این ترکیب فقط دو اتم کربن وجود دارد که با هیچ اتم هیدروژنی، پیوند اشتراکی نداده‌اند.

پ) با رعایت الفای لاتین نام این ترکیب ۳ و ۳ - دی‌اکیل - ۲ و ۲ - دی‌متیل پنتان است.

ت) فرمول مولکولی این ترکیب $C_{11}H_{24}$ می‌باشد و واکنش سوختن کامل آن به صورت زیر است:



۲۱۲. گزینه ۴ آلان با فرمول عمومی C_nH_{2n+2} می‌باشد.

$$\frac{2n+2}{n} = 2,4 \Rightarrow n = 5 \Rightarrow C_5H_{12}$$

«پنتان»

- پنتان در دمای اتاق به حالت مایع می‌باشد.

- نقطه جوش پنتان بالاتر از بوتان است زیرا تعداد کربن و جرم مولی آن بیشتر است.

- ساده‌ترین آلان متان (CH_4) با جرم مولی ۱۶ گرم بر مول و پنتان دارای جرم مولی ۷۲ گرم بر مول است:

$56 = 16 - 72$ می‌باشد.

- C_5H_{12} و اتان (CH_4)، این عبارت درست است.

۲۱۳. گزینه ۳ پروپین C_3H_6 دومین عضو خانواده آلکین‌هاست و نسبت شمار اتم‌های کربن به هیدروژن $\frac{3}{4}$ می‌باشد. (نادرست)

- درست

- سیکلوهگزان (C_6H_{12}) و پروپین (C_3H_6): $\frac{12}{6} = 2$ و $\frac{6}{4} = 1,5$ (درست)

- نفتالن دارای ۵ پیوند دوگانه و بنزن سه پیوند دوگانه است. (نادرست)

- نفتالن و بوتان (C_6H_{16})، عبارت درست است.

۲۱۴. گزینه ۳



فرمول عمومی آلانها $\rightarrow C_nH_{2n} + Br \rightarrow C_nH_{2n}Br$

پیوند دوگانه میان دو اتم کربن در آلان به پیوند یگانه تبدیل شده و دو اتم Br به تک الکترون‌های آزاد ناشی از آن متصل می‌شوند:

$$(C = 12, H = 1, Br = 80 g \cdot mol^{-1})$$

$$12n + 2n + (2 \times 80) = 216g \rightarrow 14n = 56 \rightarrow n = 4 \rightarrow C_4H_8$$

شکل‌های ساختاری که می‌توان برای C_4H_8 در نظر گرفت:



بنابراین:

$$\frac{\text{تعداد اتم‌های هیدروژن}}{\text{شمار جفت الکترون‌های پیوندی}} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

۲۱۵. گزینه ۴ آلانها دارای فرمول عمومی: C_nH_{2n+2} می‌باشند که جرم مولی آنها $(14n + 2)$ گرم است.

$$A : C = \frac{142 - 2}{14} = 10 \Rightarrow C_{10}H_{22}$$


$$B : C_{15}H_{32} \Rightarrow \text{جرم مولی} = 212g$$

* چون جرم مولی B بیشتر از A می‌باشد پس دمای جوش B نیز بالاتر است.

$$\frac{(B)H}{(A)H} = \frac{32}{22} = \frac{16}{11}$$

۲۱۶. گزینه ۲ عبارت‌های (ب) و (ج) و (د) درست‌اند.

بررسی عبارت نادرست:




توجه:

- تفاوت جرم مولی بنزن و نفتالن برابر ۵ گرم است.

$$C_{10}H_8 - C_6H_6 \Rightarrow \boxed{C_6H_6} \rightarrow 6 \times 12 + 6 = 78$$

نفتالن
بنزن

- با توجه به ساختار این دو مولکول بنزن دارای ۱۵ جفت الکترون پیوندی و نفتالن دارای ۲۴ جفت الکترون پیوندی است.



۲۱۷. گزینه ۳

$$25 A^{3+} \text{ : تفاوت } n \text{ و } p \text{ در } X$$

$$25 B^- \text{ : تفاوت } n \text{ و } p \text{ در } 2X$$

$$(35 + 1) - (25 - 3) = 14$$

$$n_B - n_A = 15 \text{ و } (n_B > n_A)$$

$$\Rightarrow n_B = 15 + n_A$$

$$\begin{cases} n_A - 25 = X \\ (15 + n_A) - 35 = 2X \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_A - 25 = X \\ n_A - 20 = 2X \end{cases} \Rightarrow X = 5 \Rightarrow \begin{cases} n_A = 30 \\ n_B = 45 \end{cases}$$

:مجموع تعداد نوترون‌های A و B

$$\Rightarrow n_A + n_B = 30 + 45 = 75$$

۲۱۸. گزینه ۱ در ابتدا می‌دانیم که تفاوت تعداد نوترون‌ها و نصف الکترون‌ها، ۲۶ می‌باشد؛ پس با توجه به این که این عنصر کاتیون با بار +۴ تشکیل داده است از ترکیب دو رابطه اول خواهیم داشت.

$$n - \frac{e}{2} = 26$$

$$p = e + 4$$



$$n = \frac{p - 4}{2} + 26 \Rightarrow 2n = p - 4 + 52 \Rightarrow 2n - p = 48 \xrightarrow{p=4,e=26} n = 40$$

حال با توجه به عدد جرمی و این که تعداد پروتون‌ها ۸۰ درصد نوترون‌های داشت خواهیم داشت:

$$n + p = 40 + 80 = 120$$

$$n + 80 = 40 + 80 \xrightarrow{n=40} 1,8 \times 40 = 40 \Rightarrow x = 39$$

۲۱۹. گزینه ۳ اگر جرم پنتان را x گرم و جرم اتان را $(33 - x)$ گرم در نظر بگیریم، با توجه به معادله سوختن کامل هر کدام:



$$I CO_2 = xgC_5H_{12} \times \frac{1molC_5H_{12}}{72gC_5H_{12}} \times \frac{5molCO_2}{1molC_5H_{12}} = \frac{5x}{72} molCO_2$$

$$C_5H_{12} = (5 \times 12) + (1 \times 12) = 72g \cdot mol^{-1}$$

$$II CO_2 = (33 - x)gC_2H_6 \times \frac{1molC_2H_6}{30gC_2H_6} \times \frac{2molCO_2}{1molC_2H_6} = \frac{33 - x}{30} molCO_2$$


$$C_2H_6 = (12 \times 2) + (1 \times 12) = 30g \cdot mol^{-1}$$

$$I \quad H_2O = xgC_6H_{12} \times \frac{1molC_6H_{12}}{72gC_6H_{12}} \times \frac{2molH_2O}{1molC_6H_{12}} = \frac{x}{12} molH_2O$$

$$II \quad H_2O = (33-x)gC_4H_8 \times \frac{1molC_4H_8}{56gC_4H_8} \times \frac{2molH_2O}{1molC_4H_8} = \frac{33-x}{16} molH_2O$$

$$\rightarrow \frac{x}{12} + \frac{33-x}{16} = \frac{4}{72} \left(\frac{5x}{12} + \frac{33-x}{15} \right) \rightarrow x = 14g$$

۲۲۰. گزینه ۲



$$C_4H_8 \left\{ \begin{array}{l} 4 \text{ اتم کربن} \\ 8 \text{ اتم هیدروژن} \end{array} \right\} \rightarrow 4+8=12$$

۲۲۱. گزینه ۲ فرمول عمومی آلانها C_nH_{2n+2} می باشد. از آنجا که اختلاف جرم مولی دو آلان A و B . ۱۴ گرم بر مول می باشد، پس این دو آلان پشت سرهم قرار دارند، پس با توجه به فرضیات سوال می توان نوشت:

آلان: $C_nH_{2n+2} \rightarrow C_6H + 2$


B : $C_{(n+1)}H_{(n+1)+2} \rightarrow C_4H$ نسبت شمار آلان

 $\Rightarrow n+2 = 2 \times \left[\frac{2n+4}{n+1} \right] \Rightarrow n = 3 \left\{ \begin{array}{l} A: C_6H_8 \\ B: C_4H_{10} \end{array} \right.$

حال به بررسی گزینه ها می پردازیم:

گزینه ۱: آلان های با تعداد یک تا چهار کربن در دما و فشار اتفاق حالت فیزیکی گازی دارند.


گزینه ۲: در شرایط STP حالت فیزیکی آب (H_2O) مایع می باشد:



گزینه ۳: در سری آلان ها با افزایش تعداد کربن، نقطه جوش افزایش می یابد.

گزینه ۴: به طور کلی تعداد پیوندهای اشترانی در آلانی با n اتم کربن، $1 + 3n$ پیوند می باشد، پس در آلان B (C_4H_{10}) $(1 + 3)(3 \times 4 + 1) = 43$ پیوند اشترانی داریم.

۲۲۲. گزینه ۳ اتان یک ترکیب سیر شده است که با هیدروژن واکنش نمی دهد اما هر مول استیلن (C_2H_2) برای سیر شدن به دو مول گاز هیدروژن نیاز دارد. اگر جرم اتان را x و جرم استیلن را $(57-x)$ گرم در نظر بگیریم:



جمله اتان تولید شده:

$$(57-x)gC_2H_2 \times \frac{1molC_2H_2}{26gC_2H_2} \times \frac{1molC_2H_4}{1molC_2H_2} \times \frac{56gC_2H_4}{1molC_2H_4} = \frac{15}{13}(57-x)gC_2H_4$$

$$x + \frac{15}{13}(57-x) = 52 \Rightarrow x = 15$$

پس در مخلوط اولیه ۱۵ گرم اتان و ۵۲ گرم استیلن بوده است.


درصد x در مخلوط (y و x):

$$\frac{x}{x+y} \times 100 = \frac{52}{57} \times 100 \simeq 77,6\%$$

۲۲۳. گزینه ۱ بررسی گزینه ها:

(۱) درست، بنزن و نفتالن سیر نشده و آروماتیک هستند و سیکلوهگزان سیر شده است.

(۲) نادرست، فرمول نقطه - خط نفتالن به صورت زیر است:



(۳) نادرست، براثر افزودن ۶ مول اتم هیدروژن (سه مول گاز هیدروژن) به یک مول بنزن، می توان به یک مول سیکلوهگزان دست یافت.

(۴) نادرست، درصد جرمی کربن در نفتالن بیشتر از بقیه است.

C_8H_8
$\frac{6 \times 12}{78} \times 100 = 92,30\%$
بنزن = درصد کربن


$$C_{10}H_8$$

$$\text{نفتالن} = \frac{10 \times 12}{128} \times 100 = 93,75\% \quad \text{درصد کربن}$$


$$C_6H_{12}$$

$$\text{سیکلوهگزان} = \frac{6 \times 12}{84} \times 100 = 85,71\% \quad \text{درصد کربن}$$

۲۲۴. گزینه ۳ مجموع جرم کربن‌ها در این آلکان باید ۴ برابر مجموع هیدروژن‌های آن باشد. بنابراین آلکان مورد نظرتان با فرمول مولکولی C_4H_8 می‌باشد.



برای یکسان شدن ضریب ماده مشترک (CO_2) در دو واکنش، واکنش زیر را در دو ضرب می‌کنیم:



$$\begin{array}{l} 0,1mol \\ C_4H_8 \\ \sim \\ 1mol \end{array} \quad \begin{array}{l} xg \\ 2MgO \\ \sim \\ 2 \times 40 \end{array} \quad \frac{0,1}{1} = \frac{x}{2 \times 40} \Rightarrow x = 64g$$


۲۲۵. گزینه ۱ فرمول عمومی آلکان‌ها به شکل: C_nH_{2n+2} است.

$$\frac{2n+2}{n} = 2,4 \Rightarrow 2n+2 = 2,4n \Rightarrow 2 = 0,4n \Rightarrow n = 5$$

فرمول آلکان: C_5H_{12}


بررسی موارد:

مورد آ) درست، پنتان بین آلکان‌های مایع کمترین نقطه جوش را دارد.
مورد ب) نادرست، برای پنتان تنها می‌توان یک ساختار با یک شاخه متمیل رسم نمود.



مورد ب) نادرست، فرمول مولکولی نفتالن $C_{10}H_8$ است. درنتیجه تفاوت تعداد اتم‌های هیدروژن برابر ۴ است.

مورد ت) درست است.



$$?LCO_2 = 0,1molC_6H_{12} \times \frac{\Delta molCO_2}{1molC_6H_{12}} \times \frac{22,4LCO_2}{1molCO_2} = 11,2LCO_2$$

مورد ث) درست است.


$$C_6H_{12} \text{ جرم مولی} = (6 \times 12) + (12 \times 1) = 72g \cdot mol^{-1}$$

$$CH_4 \text{ جرم مولی} = 12 + (4 \times 1) = 16g \cdot mol^{-1}$$

$$\text{اختلاف جرم مولی} = 72 - 16 = 56g \cdot mol^{-1}$$

۲۲۶. گزینه ۲ فقط مورد «ت» نادرست می‌باشد.

بررسی موارد:




مورد الف) درست:

$$91 - 70 = 21$$

مورد ب) درست:

$$A = Z + N = 161 \Rightarrow \frac{161}{70} = 2,3$$

مورد پ) درست:



هیچ کدام از اتم‌های H ، نوترون ندارند و کلیه نوترون‌ها متعلق به اتم X است، پس در مجموع ۹۱ نوترون خواهیم داشت، $91 - 73 = 18$
مورد ت) نادرست:

$$2x + 5 = 161 \Rightarrow x = 78 \Rightarrow A : N' = 161 - 78 = 83 \Rightarrow N' + Z = 83 + 70 = 153$$

۲۲۷. گزینه ۳

$$A \rightarrow \frac{p_A}{n_A} = 0,8 = \frac{4}{5}$$

$$B \rightarrow n_B = 60 - 27 = 33$$

$$A^{3+} \rightarrow e_{A^{3+}} = 33 + 4 = 37$$


$A = p_A = ۳۷ + ۳ = ۴۰$ تعداد الکترون

$$\frac{p_A}{n_A} = \frac{۴}{۵} \Rightarrow \frac{۴۰}{n_A} = \frac{۴}{۵} \Rightarrow n_A = ۵۰$$

$$\begin{cases} n_A = ۵۰, p_A = ۴۰ \\ n_B + p_B = ۶۰ \end{cases} \quad \begin{cases} A_A = ۵۰ + ۴۰ = ۹۰ \\ A_B = ۶۰ \end{cases} \rightarrow \frac{A_A}{A_B} = \frac{۹۰}{۶۰} = ۱,۵$$

۲۲۸. گزینه ۲

معادله واکنش سوختن کامل آلکان‌ها به صورت زیر است که در شرایط استاندارد، حالت فیزیکی آب را مایع در نظر می‌گیریم.



$$\frac{۴۱۶}{(\frac{۳n+۱}{۲}) \times ۳۲} = \frac{۱۷۹,۲L}{n \times ۲۲,۴}$$


$$\frac{۱۳ \times ۲}{۳n+۱} = \frac{۸}{-n}$$

$$۱۲n + ۴ = ۱۳n \Rightarrow n = ۴ \Rightarrow C_4H_{10}$$


۲۲۹. گزینه ۱ ابتدا باید نسبت تعداد مول‌های هپتان به سیکلوهگزان را به دست آوریم. فرض می‌کنیم که در مخلوط اولیه x مول هپتان و y مول سیکلوهگزان وجود دارد.

$$\frac{\text{جرم اتم کربن}}{\text{مجموع جرم مولکول ها}} \times ۱۰۰ = \frac{(۷x + ۶y) \times ۱۲}{۱۰۰x + ۸۴y} = \frac{۸۵}{۱۰۰} = \frac{۱۷}{۲۰} \Rightarrow \frac{x}{y} = ۰,۶$$

معادله سوختن این دو ترکیب به صورت زیر است:



$$?gCO_2 = xmolC_7H_{16} \times \frac{۷molCO_2}{1molC_7H_{16}} \times \frac{۴۴gCO_2}{1molCO_2} = ۳۰,۸xgCO_2$$



$$?gH_2O = ymolC_6H_{14} \times \frac{۸molH_2O}{1molC_6H_{14}} \times \frac{۱۸gH_2O}{1molH_2O} = ۱۰,۸ygH_2O$$

$$\frac{۳۰,۸x}{10,8y} = \frac{۳۰,۸}{10,8} \times ۰,۶ \simeq ۱,۷۱$$

۲۳۰. گزینه ۲ فرمول مولکولی سیکلوهگزان C_6H_{12} است؛ درنتیجه نسبت ذکر شده برابر با ۲ می‌باشد. حال نسبت ذکر شده در تک تک گزینه‌ها را محاسبه می‌کنیم:

بررسی گزینه‌ها:


گزینه ۱: فرمول مولکولی اتانول C_2H_5OH می‌باشد و نسبت موردنظر برابر با ۶ است.

گزینه ۲: نسبت موردنظر برابر با ۲ می‌باشد.

گزینه ۳: پروپین با فرمول مولکولی C_3H_8 دومین عضو خانواده آلکین‌ها است و نسبت ذکر شده برای آن برابر با $\frac{۳}{۴}$ می‌باشد.

گزینه ۴: فرمول مولکولی نفتالن، C_10H_8 و فرمول مولکولی بنزن C_6H_6 می‌باشد و نسبت ذکر شده برابر با $\frac{۱۰}{۶}$ است.

۲۳۱. گزینه ۱ گاز پروپان سیر شده است و با گاز هیدروژن واکنش نمی‌دهد، اما گاز پروپین مطابق معادله واکنش زیر با گاز هیدروژن به طور کامل واکنش می‌دهد.



$$?gC_3H_6 = ۶,۶LH_2 \times \frac{۱molH_2}{۲۴LH_2} \times \frac{۱molC_3H_6}{۲molH_2} \times \frac{۴۰gC_3H_6}{1molC_3H_6} = ۱,۶gC_3H_6$$

پس در مخلوط اولیه ۸ گرم گاز پروپین و ۲۲ گرم گاز پروپان وجود دارد. مول‌های این دو گاز برابر است با:

$$?molC_3H_6 = ۲۲gC_3H_6 \times \frac{۱molC_3H_6}{۴۰gC_3H_6} = ۰,۵molC_3H_6$$

$$?molC_3H_8 = ۱,۶gC_3H_8 \times \frac{۱molC_3H_8}{۴۰gC_3H_8} = ۰,۴molC_3H_8$$

گاز پروپین واکنش پذیرتر از گاز پروپان است، پس داریم:

$$\frac{\text{مقدار مول پروپین}}{\text{مقدار مول پروپان}} = \frac{۰,۴}{۰,۵} = ۰,۸$$

۲۳۲. گزینه ۱ اگر فرمول ترکیب یونی فرضی به صورت A_nB_m بوده و نافلز تشکیل‌دهنده آن (B) دارای سه الکترون در آخرین زیرلایه خود باشد، بنابراین آرایش آخرین زیرلایه عنصر B به صورت p^3 بوده و آنیون B^{3-} به صورت B^{3-} است. درنتیجه، فرمول به صورت A_nB_m خواهد بود. از طرف دیگر، به ازای تشکیل یک مول از این ترکیب شش مول الکترون میان یون‌ها مبادله می‌شود، بنابراین $n = ۳$ است، پس فرمول نهایی ترکیب حاصل به صورت A_3B_2 بوده و در یک واحد فرمولی آن، ۵ اتم وجود دارد. کاتیون ترکیب به صورت A^{2+} است که مربوط به گروه دوم جدول تناوبی می‌باشد که با عنصری با عدد اتمی ۲۵ هم دوره بوده درنتیجه در دوره چهارم جدول تناوبی قرار دارد، بنابراین A عنصر Ca می‌باشد.

توجه: تعداد الکترون‌های مبادله شده به ازای تشکیل یک مول از ترکیب یونی برابر با حاصل عبارت (تعداد کاتیون \times بار کاتیون) یا (تعداد آنیون \times قدر مطلق بار آنیون) می‌باشد.

۲۳۳. گزینه ۳ آلکن: $A - C_nH_{2n}$ ← جرم مولی A


$$\text{آلکان } 14m + 2 : B \leftarrow C_m H_{12m+2} : B \quad (I)$$

$$\frac{14n}{14m + 2} = 0,7 \Rightarrow 9,8m + 1,4 = 14n \Rightarrow n = 0,7m + 0,1$$

$$(2m + 2) - (2n) = n + 1 \Rightarrow 2m - 3n = -1$$

با استفاده از روابط (I) و (II) :

$$2m - 3(0,7m + 0,1) = -1 \Rightarrow m = 1, n = 0,5$$



۲۳۴. گزینه ۱ موارد آ، ت و ث درست هستند.


با توجه به فرمول عمومی آلکان‌ها ($C_n H_{2n+2}$), فرمول مولکولی این آلکان $C_5 H_{12}$ است.

$$\frac{2n+2}{n} = 2,4 \Rightarrow n = 5$$

بررسی موارد:


مورد آ: آلکان‌هایی با یک تا چهار اتم کربن در دمای اتاق، گاز هستند. در بین آلکان‌های مایع، پنتان ($C_5 H_{12}$) کمترین نقطه جوش را دارد.

مورد ب: برای آن فقط می‌توان یک ساختار دارای یک شاخهٔ فرعی متیل رسم کرد. (۲ - متیل بوتان)



مورد پ: با توجه به فرمول مولکولی نفتان ($C_1 H_8$) تفاوت شمار اتم‌های H پنتان با نفتان برابر ۴ است.

مورد ت:



$$0,1 mol C_5 H_{12} \times \frac{5 mol CO_2}{1 mol C_5 H_{12}} \times \frac{22,4 L CO_2}{1 mol CO_2} = 11,2 L CO_2$$

مورد ث: مтан (CH_4) نخستین عضو خانوادهٔ آلکان‌ها است.

$$C_5 H_{12} = 72 g \cdot mol^{-1}, CH_4 = 16 g \cdot mol^{-1}$$

$$72 - 16 = 56 g \cdot mol^{-1}$$

۲۳۵. گزینه ۴ این رادیوایزوتوپ به ازای هر نیم عمرش (۲ سال) مقدارش به نصف می‌رسد یعنی:

$$100g \xrightarrow[2 \text{ سال}]{\text{ }} 50g \xrightarrow[2 \text{ سال}]{\text{ }} 25g \xrightarrow[2 \text{ سال}]{\text{ }} 12,5g$$

پس با گذشت ۶ سال مقدار این رادیوایزوتوپ به $12,5g$ می‌رسد.

۲۳۶. گزینه ۱ برای تعیین حداقل نوع داده‌های مختلف (با جرم مولی متفاوت) ابتدا جرم سبک‌ترین و سنگین‌ترین مولکول آمونیاک را محاسبه می‌کنیم: $(^{14}N, ^1H)$ و $(^{15}N, ^1H)$:

$$14 + (3 \times 1) = 17 amu$$

$$15 + (3 \times 1) = 18 amu$$

انواع مولکول آمونیاک $= 18 - 17 = 1$ = ۱ عدد مولکول ها با جرم اتمی متفاوت

۲۳۷. گزینه ۳ ناپایدارترین ایزوتوپ در نمونهٔ طبیعی هیدروژن، H_1^3 است. که دارای مجموعاً ۳ پروتون و نوترون است. پس ابتدا جرم را محاسبه می‌کنیم:

$$m = 3 \times 1,66 \times 10^{-24} g \times \frac{1 kg}{10^3 g} = 4,98 \times 10^{-27} kg$$

$$E = mc^2 \Rightarrow E = 4,98 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 = 44,82 \times 10^{-11} J$$

۲۳۸. گزینه ۳ عنصری که در گروه ۱۰ و دوره‌ی ۵ قرار دارد یعنی ۸ خانهٔ قبل از گاز نجیب $[Xe]^{1s^2} 2p^6$ قرار دارد پس:

دست دادن ۴ الکترون دارای ۵۰ الکترون و ۵۰ پروتون در حالت اتم است: X_5 و نسبت ۱ به ۱ پروتون‌ها و نوترون‌ها در آن یعنی عدد جرمی، $50 + 50 = 100$ دارد پس نماد


شیمیایی عنصر به صورت X_5^{100} می‌باشد و ایزوتوپ آن باید دارای عدد اتمی یکسان (۵۰) و عدد جرمی متفاوت باشد پس گزینه (۳) صحیح است.

۲۳۹. گزینه ۱

$$\left. \begin{array}{l} 100g \times \frac{80}{100} \times \frac{30 kJ}{1g} \times \frac{0,104 g CO_2}{1 kJ} = 249,6 g CO_2 \\ 50g \times \frac{90}{100} \times \frac{48 kJ}{1g} \times \frac{0,065 g CO_2}{1 kJ} = 140,4 g CO_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{اختلاف} = 249,6 - 140,4 = 109,2$$

۲۴۰. گزینه ۲ آلکان‌ها، هیدروکربن‌های سیر شده‌ای با فرمول عمومی $C_n H_{2n+2}$ هستند و واکنش کلی سوختن انها به صورت زیر است (دقت شود در شرایط STP، یعنی فشار ۱ atm و دمای $0^\circ C$ ، حالت فیزیکی $H_2 O$ به صورت مایع است).

مسائل چالشی شیمی کنکور



$$179,2 LCO_2 \times \frac{1 mol CO_2}{22,4 LCO_2} \times \frac{1 mol}{n mol CO_2} = \frac{1}{n} mol$$

$$416 g O_2 \times \frac{1 mol O_2}{32 g O_2} \times \frac{1 mol}{\frac{3n+1}{2} mol O_2} = \frac{2}{3n+1} mol$$

$$\Rightarrow \frac{4}{n} = \frac{13}{3n+1} \Rightarrow 13n = 12n + 4 \Rightarrow n = 4$$

بنابراین فرمول الکان مورد نظر، C_4H_{10} می‌باشد.

روش دوم:

$$\frac{O_2 \text{ جرم}}{\text{لیتر گاز}} = \frac{CO_2 \text{ جرم}}{\text{ضریب} \times 22,4 \text{ جرم مولی}}$$

$$\frac{179,2 LCO_2}{n \times 22,4} = \frac{416 g O_2}{\frac{3n+1}{2} \times 32}$$

$$n = 4 \Rightarrow C_4H_{10}$$

۲۴۱. گزینه ۱

$$\frac{\text{فراوانی ایزوتوپ سنگین تر}}{\text{فراوانی ایزوتوپ سبک}} = \frac{2}{5} \Rightarrow 2 + 5 = 7$$

$$\text{جرم اتمی میانگین} = \frac{2(M+1) + 5(M-1)}{7} = \frac{2M+2+5M-5}{7} = \frac{7M-3}{7} = M - \frac{3}{7}$$

۲۴۲. گزینه ۱ چون فراوانی دو ایزوتوپ به صورت درصد داده شده و درصد فراوانی ایزوتوپ A^{13} برابر 70 است پس ایزوتوپ دیگر A^{12} درصد می‌شود:

$$\frac{M_1 F_1 + M_2 F_2}{F_1 + F_2} = \frac{(12 \times 30) + (13 \times 70)}{100} = 12,7$$

$$1g_{^{13}A} \times \frac{1 mol_{^{13}A}}{13 g_{^{13}A}} \times \frac{6,02 \times 10^{23} atom_{^{13}A}}{1 mol_{^{13}A}} = 4,63 \times 10^{22} atom_{^{13}A}$$

۲۴۳. گزینه ۳ چون نسبت درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین تر به سبک‌تر عنصر c برابر $\frac{1}{19}$ است یعنی به ازای هر ایزوتوپ سنگین 19 ایزوتوپ سبک وجود دارد. پس مجموع فراوانی $19 + 1$ می‌باشد و فراوانی هر یک از این دو ایزوتوپ کربن:

$$^{13}C \quad ^{12}C$$

$$1 \quad 19$$

$$\text{جرم اتمی میانگین} = \frac{M_1 F_1 + M_2 F_2}{F_1 + F_2} = \frac{(13 \times 1) + (12 \times 19)}{20} = 12,05 amu$$

و چون نسبت درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین تر به سبک‌تر عنصر Li برابر $\frac{47}{3}$ است یعنی فراوانی ایزوتوپ سنگین تر 47 و سبک‌تر 3 $= 50 = 50 + 3 = 53$ است.

$$^6Li \quad ^7Li \Rightarrow Li = \frac{(6 \times 3) + (7 \times 47)}{50} = 6,94 amu$$

$$3 \quad 47$$

* در آخر مجموع جرم اتمی میانگین C و Li برابر با $18,99 amu + 6,94 = 12,05 + 6,94 = 18,99 amu$ می‌باشد.


۲۴۴. گزینه ۲ ایزوتوپ‌ها دارای عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارند و چون تفاوت تعداد نوترون‌ها برابر 2 است، اختلاف عدد جرمی این دو ایزوتوپ نیز برابر 2 می‌شود و می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} & \text{: عدد اتمی‌ها یکسان} \\ & \text{: تفاوت عدد جرمی برابر } 2 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} -2a + 3b &= 2a + b \\ 3b + 2a + 2 &= 7a + b \end{aligned} \right\} \Rightarrow a = 2, b = 4$$


$$\text{مجموع تعداد الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها} = 8 + 8 + 8 = 24$$

ایزوتوپ سبک‌تر:

$$^{16}X \leftarrow \begin{smallmatrix} +a+3b \\ -2a+3b \end{smallmatrix} X$$




۲۴۵. گزینه ۳ یک شبانه روز معادل 24 ساعت و 6×4 ساعت است.




۲۴۶. گزینه ۱ چون مقدار انرژی آزاد شده از باقی مانده ماده $10^{16} \times 75$ کمتر از اولیه است پس به همین نسبت باید از ماده اولیه مصرف شده باشد.
 $6,75 \times 10^{16} = m \times 9 \times 10^{16} \Rightarrow m = 0,75 \text{ kg}$

یعنی $0,75$ کیلوگرم از ماده متابلشی شده و $0,25$ کیلوگرم ماده باقی مانده است.



۲۴۷. گزینه ۴ (الف) برای تعیین مولکول آمونیاک پایدار فقط از ایزوتوپ‌های ^1H و ^3H نمونه طبیعی هیدروژن استفاده می‌کنیم.



ب) مولکول آمونیاک سنگین‌تر را از $(^3\text{H}, ^1\text{N})$ و مولکول سبک‌تر را از $(^1\text{H}, ^1\text{N})$ در نظر می‌گیریم.

$${}_{14}^7\text{N}, {}_{1}^3\text{H} \Rightarrow \text{تعداد نوترون‌ها} = 9 + 3 \times 2 = 15 \Rightarrow \frac{15}{15} = 1,5$$

$${}_{14}^7\text{N}, {}_{1}^1\text{H} \Rightarrow \text{تعداد پروتون‌ها} = 7 + 3 \times 1 = 10 \Rightarrow \frac{10}{10} = 1,0$$

۲۴۸. گزینه ۴ در یک نمونه طبیعی از ایزوتوپ‌های هیدروژن فقط ^1H و ^3H وجود دارد که ایزوتوپ ناپایدار آنها ^1H است.

$$\text{ابتدا تعداد } {}_{1}^3\text{H} \text{ را محاسبه می‌کنیم:} \quad x = \frac{6}{12,32} = 5$$

$$\text{تعداد اتم‌های پرتوزا} = n \left(\frac{1}{3} \right)^x = 100,000 \left(\frac{1}{3} \right)^5 = 3125$$

با گذشت زمان از تعداد اتم‌های هیدروژن پرتوزا کم می‌شود و با آنکه تعداد دو ایزوتوپ پایدار دیگر ثابت می‌ماند اما درصد فراوانی این اتم‌ها افزایش می‌یابد.

۲۴۹. گزینه ۳

$$AB_2 = 1 \text{ mol } AB_2 \times \frac{62 \text{ g } AB_2}{0,5 \text{ mol } AB_2} = 124 \text{ g } AB_2$$

$$(38 \times 80) + (40 \times 20) = 38,4 \text{ g}$$

$$\text{جرم مولی } AB_2 = A + 2B = 124 = A + 2(38,4) \Rightarrow A = 47,2 \text{ g}$$

۲۵۰. گزینه ۴ ابتدا عدد جرمی دو ایزوتوپ سبک و سنگین را محاسبه می‌کنیم. در مورد ایزوتوپ سبک‌تر، اختلاف تعداد نوترون و پروتون در یک مول از آن برابر است با:

$$1 \text{ mol} \times \frac{(1,204 \times 10^{24}) - (1,204 \times 10^{24})}{6,02 \times 10^{23}} = 4 \text{ mol}$$

در یک مول از ایزوتوپ سبک‌تر، اختلاف مول نوترون و پروتون برابر ۴ مول است، بنابراین در هر اتم ایزوتوپ سبک‌تر نیز این اختلاف برابر ۴ است. در نتیجه عدد جرمی برابر است با:
 $p + n = p + (p + 4) = 2p + 4$

در مورد ایزوتوپ سنگین‌تر می‌توان گفت:

$$2 = \frac{SO_3 \times 1,18 \text{ mol } SO_3}{0,8 \text{ mol } A \times \frac{xgA}{1 \text{ mol } A}} = \frac{1,18 \text{ mol } SO_3 \times \frac{80 \text{ g } SO_3}{1 \text{ mol } SO_3}}{0,8 \text{ mol } A \times \frac{xgA}{1 \text{ mol } A}}$$

$$\Rightarrow x = 59 : \text{جرم مولی ایزوتوپ سنگین‌تر}$$

با توجه به برابر بودن مقدار عدد جرمی و جرم مولی، عدد جرمی ایزوتوپ سنگین‌تر برابر ۵۹ است.

$$\frac{(2P + 4)(5) + (59)(1)}{6} \Rightarrow 2P + 4 = 56 \Rightarrow P = 26$$

$$\text{مجموع فراوانی‌ها} = \frac{\left(\text{فراآنی ایزوتوپ اول} \times \text{عدد جرمی ایزوتوپ اول} \right) + \left(\text{فراآنی ایزوتوپ دوم} \times \text{عدد جرمی ایزوتوپ دوم} \right)}{\text{جمیع فراوانی‌ها}}$$

$$\Rightarrow 56,5 = \frac{(2P + 4)(5) + (59)(1)}{6} \Rightarrow 2P + 4 = 56 \Rightarrow P = 26$$

۲۵۱. گزینه ۴

$${}_{34}^4X \rightarrow \text{بعض این اتم} \quad \xrightarrow{\substack{(n+p)=76 \\ (42+34)=76}} \begin{cases} n - p = 4 \\ 76 = p + n \Rightarrow n = 42 \\ 34 = p \end{cases}$$

مسائل چالشی شمی کنکور

$$\text{فراوانی } X = \frac{f_1 A_1 + f_2 A_2}{f_1 + f_2} = \frac{76}{100} = 76\%$$

$$\text{فراوانی } X = ? \quad 79 = \frac{76 \times 76 + 25 A_2}{100} \quad A_2 = 88$$

$$\text{جرم ایزوتوب دوم } p + n = 88 \Rightarrow n = 54$$

$$p \text{ و } n \Rightarrow n - p = 54 - 34 = 20$$

۲۵۲. گزینه ۴ ابتدا باید جرم اتمی تمام ایزوتوب های A و B را محاسبه کنیم تا سنگین ترین و سبک ترین ایزوتوب هر عنصر مشخص شود:

$$A = \frac{(10 \times 27) + (10 \times 28) + (10 \times x)}{100} = 27,3 \Rightarrow x = 29$$

$$A \Rightarrow {}^{29}A, {}^{28}A, {}^{27}A$$

$$B = \frac{(75 \times y) + (25 \times 38)}{100} = 39,5 \Rightarrow y = 40$$

$$B \Rightarrow {}^{40}B, {}^{38}B$$

$$AB_2 = \text{سنگین ترین}_2 = 29 + 2(40) = 109$$

$$AB_2 = \text{سبک ترین}_2 = 27 + 2(38) = 103$$

$$\Rightarrow 109 - 103 = 6$$

۲۵۳. گزینه ۲ سبک ترین ایزوتوب نیکل دارای 3^0 نوترون است. پس سبک ترین ایزوتوب Ni (${}^{58}_{28}Ni$) است. در Ni^{2+} (سنگین ترین یون ایزوتوب Ni) 26 الکترون داریم. پس 33 نوترون دارد و به صورت Ni^{61}_{28} است. ایزوتوب با جرم متوسط یک نوترون کمتر از این ایزوتوب دارد پس Ni^{58}_{28} است.

$$\begin{cases} {}^{58}_{28}Ni & F_1 = 100 - 6F_2 \\ {}^{59}_{28}Ni & 5F_2 \\ {}^{61}_{28}Ni & F_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{58(100 - 6F_2) + 59(5F_2) + 61(F_2)}{100} = 58,58 \Rightarrow \begin{cases} F_2 = 5\% \\ F_1 = 95\% \end{cases}$$

۲۵۴. گزینه ۱

$$\frac{\text{فراوانی } X^{4+2}}{\text{فراوانی } X} = \frac{1}{2} \Rightarrow (1)^A X = 2(\text{فراوانی } X^{4+2})$$

$$\frac{\text{فراوانی } X^{4+4}}{\text{فراوانی } X^{4+2}} = \frac{1}{3} \Rightarrow (2)^A X = 3(\text{فراوانی } X^{4+4})$$

با جایگذاری رابطه (۲) در رابطه (۱) خواهیم داشت:

$$\text{فراوانی } X = 2(\text{فراوانی } X^{4+4}) = 2(3(\text{فراوانی } X^{4+4})) = 6(\text{فراوانی } X^{4+4})$$

$$\frac{\text{فراوانی ایزوتوب موردنظر}}{\text{فراوانی کل ایزوتوبها}} \times 100 = \frac{\text{درصد فراوانی ایزوتوب}}{\text{درصد فراوانی } X + \text{درصد } X^{4+2} + \text{درصد } X^{4+4}} \times 100 =$$

$$\frac{\text{درصد فراوانی } X}{6(\text{فراوانی } X) + 3(\text{فراوانی } X) + 3(\text{فراوانی } X)} \times 100 \Rightarrow \text{درصد فراوانی } X^{4+4} = 10\%$$

$$\text{درصد فراوانی } X = 60\%$$

۲۵۵. گزینه ۳ (الف) فرمول مولکولی متان CH_4 است ←

$$\left. \begin{array}{l} 12: \text{ جرم سبک ترین مولکول متان} \\ 10: \text{ جرم سنگین ترین مولکول متان} \end{array} \right\} \Rightarrow 25 - 16 = 9 \text{amu}$$

(ب) توجه: مولکول پایدار، مولکولی است که شامل اتم ناپایدار (H^+) نباشد.
اگر 1H را با D و 2H را با C و 3H را با C' نشان دهیم داریم.

$$\begin{matrix} H \\ D \\ H \end{matrix} \left\{ C' \equiv C \begin{matrix} H \\ D \\ D \end{matrix} \right.$$

$$\begin{matrix} H \\ D \\ D \end{matrix} \left\{ C' \equiv C' \begin{matrix} H \\ D \\ H \end{matrix} \right.$$

$$\begin{matrix} H \\ D \\ D \end{matrix} \left\{ C \equiv C \begin{matrix} H \\ D \\ H \end{matrix} \right.$$

۹ نوع مولکول C_2H_2 پایدار می‌توان ساخت.
۲۵۶. گزینه ۱ از آن جا که در X_2^{+} ۳۵ ذره بدون بار (نوترون) وجود دارد، عدد جرمی X_2 برابر ۵۴ می‌باشد.

$$\begin{matrix} X_1^{++} : n - e = ۷ \\ p=۲۴ \\ e = p - ۳ \longrightarrow e = ۲۱ \end{matrix} \left\{ n - ۲۱ = ۷ \Rightarrow n = ۲۸ \right.$$

درنتیجه عدد جرمی X_1 برابر ۵۲ می‌باشد.

درصد فراوانی X_1 را با F_1 و درصد فراوانی X_2 را با F_2 نشان می‌دهیم:

$$\begin{matrix} F_1 + F_2 = ۱۰۰ \\ F_1 - F_2 = ۱۰ \\ X_1 F_1 + X_2 F_2 = \text{حجم اتمی میانگین} \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} F_1 = ۹۰ \\ F_2 = ۱۰ \\ \frac{X_1 F_1 + X_2 F_2}{F_1 + F_2} = \frac{۵۲(۹۰) + ۵۴(۱۰)}{۱۰۰} = ۵۲,۳g \end{cases}$$

پس جرم مولی XO برابر ۶۸,۲ گرم بر مول خواهد بود.

۲۵۷. گزینه ۱ عدد اتمی در ایزوتوپ‌ها یکسان است.

$$Z = ۷$$

اختلاف عدد جرمی:

= اختلاف عدد جرمی دو ایزوتوپ

$$n_{\gamma} - e_{\gamma} = ۱ \Rightarrow n_{\gamma} - p_{\gamma} = ۱ \longrightarrow n_{\gamma} = ۷ + ۱ = ۸$$

باتوجه به اختلاف یک واحدی در عدد جرمی، ایزوتوپ X_1 می‌تواند سنگین‌تر و دارای عدد جرمی ۱۶ و یا سبک‌تر و دارای عدد جرمی ۱۴ باشد. باتوجه به گزینه‌ها، مورد ۱ درست است.

۲۵۸. گزینه ۴

$$\begin{matrix} ^{۱۱}A_۲, ^{۱۰}A_۱ : \begin{cases} n_1 + p_1 = ۱۰ \\ n_۲ + p_۲ = ۱۱ \end{cases} \\ \frac{n_۱}{p_۱ + n_۱ + e_۱} = \frac{۱}{۳} \rightarrow ۳n_۱ = n_۱ + ۲p_۱ \Rightarrow n_۱ = p_۱ \quad (۱) \\ n_۱ + p_۱ = ۱۰ \quad (۲) \end{matrix}$$

$$\stackrel{(1),(2)}{\longrightarrow} n_۱ = ۵, p_۱ = ۵$$

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: عنصر A در خانه شماره ۵ جدول قرار دارد.

گزینه ۲: باتوجه به این که در ایزوتوپ (ذره بدون بار) متغیر است، این عبارت غلط است.

گزینه ۳: تعداد p و n در ایزوتوپ سبک‌تر برابر است.

۲۵۹. گزینه ۳

$$\begin{matrix} N=۱,۲e \\ e=۲۰ \end{matrix} \xrightarrow{۱m} N = ۱,۲ \times ۲۰ = ۲۴ \Rightarrow A = ۲۴ + ۲۰ = ۴۴ \rightarrow ۲m = ۴۴ \Rightarrow m = ۲۲$$

پس سه ایزوتوپ به صورت $X_2^{۴۰}, X_2^{۴۱}$ و $X_2^{۴۲}$ می‌باشد، همچنین اگر درصد فراوانی آن‌ها را به ترتیب $Z_1, Z_۲$ و $Z_۳$ در نظر بگیریم، داریم:

$$Z_۲ = ۳Z_۱ \quad Z_۱ + Z_۲ + Z_۳ = ۱۰۰ \longrightarrow ۴Z_۱ + Z_۲ = ۱۰۰ \quad (۱)$$

$$۴۳,۹ = \frac{۴۰Z_۱ + ۴۴Z_۲ + ۴۵Z_۳}{۱۰۰} \longrightarrow ۴۴Z_۲ + ۱۷۵Z_۱ = ۴۳۹ \quad (۲)$$

طبق رابطه ۱ و ۲ داریم:

$$\times (-۴۴) \begin{cases} ۴Z_۱ + Z_۲ = ۱۰۰ \\ ۱۷۵Z_۱ + ۴۴Z_۲ = ۴۳۹ \end{cases} \Rightarrow Z_۱ = ۱۰ \Rightarrow Z_۲ = ۶۰$$

۲۶۰. گزینه ۲ عبارت‌های (ب) و (پ) نادرست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

عبارت (آ):


$$\bar{M} = \frac{(6 \times 3) + (7 \times 47)}{3 + 47} = 6.94 \text{ amu}$$

تفاوت جرم اتمی میانگین و جرم ایزوتوپ سنگین‌تر برابر 0.6 amu است.

عبارت (ب):

$$2000 \times \frac{3}{50} + 2000 \times \frac{47}{50} = 7880 \text{ تعداد نوترون}$$

عبارت (پ): مطابق شکل زیر نادرست است.



عبارت (ت): در میان ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن، H^5 بیشترین نیمه عمر را دارد که دارای ۴ نوترون است. در ایزوتوپ سنگین‌تر عنصر لیتیم (Li^7) نیز چهار نوترون وجود دارد.

۲۶۱. گزینه ۱ عنصر مورد نظر دارای ۱۲ الکترون (پروتون) است، بنابراین هر دو ایزوتوپ آن دارای ۱۲ پروتون هستند. اگر جرم اتمی میانگین را با \bar{A} و جرم اتمی و فراوانی ایزوتوپ‌ها را با F نشان دهیم، می‌توان گفت:

$$\bar{A} = \frac{(A_1 \times F_1) + (A_2 \times F_2)}{F_1 + F_2}$$

براساس اطلاعات مسئله می‌توان گفت:

$$A_1 = n_1 + 12 \xrightarrow{n_1 = n_2 + 3} A_1 = n_2 + 15$$

$$F_1 = 2F_2$$


می‌توان رابطه جرم اتمی میانگین را به صورت زیر نوشت:

$$\bar{A} = \frac{(n_2 + 15)(2F_2) + (n_2 + 12)(F_2)}{2F_2 + F_2} \Rightarrow 54 = \frac{(n_2 + 15)(2) + (n_2 + 12)}{3} \Rightarrow n_2 = 20, n_1 = 23$$


$$n_2 + n_1 = 43$$

۲۶۲. گزینه ۱ بررسی گزینه‌ها:


گزینه ۱: از انحلال 1 mol باریم‌اکسید در آب، 3 mol یون تولید می‌شود.



گزینه ۲: از انحلال هر مول دی‌نیتروژن پتاکسید در آب 2 mol یون هیدرونیوم تولید می‌شود.



گزینه ۳: از انحلال هر مول لیتیم‌اکسید در آب، دو مول یون هیدروکسید تولید می‌شود، بنابراین از انحلال 2 mol یون هیدروکسید تولید می‌شود نه یون هیدرونیوم.



گزینه ۴: براساس واکنش N_2O_5 با آب می‌توان گفت:

$$[H_2O_5] = \frac{1 \text{ mol } H^+}{0.5 \text{ L}} = 2 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

۲۶۳. گزینه ۱

$$112 X^{2+} \left\{ \begin{array}{l} n - e = 18 \Rightarrow n = 18 + e \\ n + p = 112 \\ e = p - 2 \Rightarrow p = 2 + e \end{array} \right. \Rightarrow 18 + e + 2 + e = 112 \Rightarrow \boxed{e = 46}, \boxed{p = 48}, \boxed{n = 64}$$

$$100 Hg \left\{ \begin{array}{l} n + p = 200 \\ n = 15p \end{array} \right. \Rightarrow 15p + p = 200 \Rightarrow p = 10$$

عبارت اول: درست است.

عبارت دوم:

پس عبارت دوم نیز درست است. زیرا جیوه متعلق به گروه ۱۲ است و عنصر X هم با عدد اتمی ۴۸ به گروه ۱۲ تعلق دارد.

عبارت سوم: تکنسیم Tc تنها عنصری است که جرم اتمی آن در جدول ذکر نشده است و در دوره پنجم قرار دارد.

عبارت چهارم: درست است. اختلاف تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها در عنصر X برابر ۱۶ است و عدد اتمی ۱۶ متعلق به عنصر گوگرد S در گروه ۱۶ و دوره سوم است.

۲۶۴. گزینه ۳ اگر در این واکنش تغییرات دما را C° و گرمای داده شده را معادل J در نظر بگیریم خواهیم داشت:

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{q}{m \cdot \Delta\theta} = \frac{1}{10 \times 1} = 0,1 J \cdot g^{-1} \cdot C^{\circ -1} \\ y &= \frac{q}{m \cdot \Delta\theta} = \frac{1}{20 \times 1} = 0,05 J \cdot g^{-1} \cdot C^{\circ -1} \end{aligned} \right\}$$

ظرفیت گرمایی ویژه
 $x = 0,1 J \cdot g^{-1} \cdot C^{\circ -1}$
 $y = 0,05 J \cdot g^{-1} \cdot C^{\circ -1}$

(ظرفیت گرمایی ویژه)
 $x = 2$
 $y = 0,05$

واز طرفی دیگر:

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{q}{\Delta\theta} = \frac{1}{1} = 1 J \cdot C^{\circ -1} \\ y &= \frac{q}{\Delta\theta} = \frac{1}{2} = 0,5 J \cdot C^{\circ -1} \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} \text{ظرفیت گرمایی } y &= \text{ظرفیت گرمایی } x \\ \text{ظرفیت گرمایی } y &= 0,5 J \cdot C^{\circ -1} \end{aligned}$$

۲۶۵. گزینه ۳

A جرم: $m_A = 18n_A = 18 \times 1,5 n_B$

B جرم: $m_B = 45n_B$

$$\frac{Q_A}{Q_B} = \frac{m_A \times C_A \Delta\theta_A}{m_B \times C_B \times \Delta\theta_B} = \frac{(18 \times 1,5 n_B) \times (0,5 C_B) \times \Delta\theta_B}{(45 n_B) \times (C_B) \times \Delta\theta_B} \rightarrow \frac{Q_A}{Q_B} = 0,3$$

۲۶۶. گزینه ۲

$C = \frac{Q}{\Delta\theta} \rightarrow Q = 5,5 \frac{J}{^{\circ}C} \times (30 - 40) = -55 J$ ابتدا گرمای مبادله شده را محاسبه می‌کنیم:

سپس مقدار آب تبخیر شده از بدنه یخچال در اثر جذب ۵۵ زول گرما را محاسبه می‌کنیم:

$$?g H_2O = 55 J \times \frac{1 kJ}{1000 J} \times \frac{1 mol H_2O}{44 kJ} \times \frac{18 g H_2O}{1 mol H_2O} = 2,25 \times 10^{-2} g H_2O$$

۲۶۷. گزینه ۴ بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱ و ۲ تناوب ۱ ← ۲ عنصر / تناوب ۲ ← ۸ عنصر / تناوب ۳ ← ۸ عنصر / تناوب ۴ ← ۱۸ عنصر / تناوب ۵ ← ۱۸ عنصر / تناوب ۶ ← ۳۲ عنصر / تناوب ۷ ← ۳۲ عنصر

گزینه ۳ هم گروه‌های Se و در واقع عناصر گروه ۱۶ دارای اعداد اتمی ۱۶، ۱۴، ۱۲، ۱۰ و ۸۲ می‌باشند.

گزینه ۴ Ra، سنگین‌ترین عنصر گروه دوم جدول دوره‌ای است.

۲۶۸. گزینه ۲

$$Q = mc_{Au} \Delta T + mc_{Ag} \Delta T$$

فرض $= xg$ طلا

فرض $= yg$ فراغ

$$\Rightarrow Q = x \times 0,24 \times 10 + y \times 0,12 \times 10$$

$$\Rightarrow 19,2 = 2,4x + 1,2y$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + y = 12 \\ 2,4x + 1,2y = 19,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 8 \end{cases}$$

$$= \frac{4}{12} \times 100 = 33,33\%$$

درصد جرمی طلا

پاسخنامه کلیدی

۱ . ۲	۴۰ . ۴	۷۹ . ۴	۱۱۸ . ۱	۱۵۷ . ۴	۱۹۶ . ۳	۲۳۵ . ۴
۲ . ۳	۴۱ . ۳	۸۰ . ۱	۱۱۹ . ۲	۱۵۸ . ۲	۱۹۷ . ۱	۲۳۶ . ۱
۳ . ۳	۴۲ . ۳	۸۱ . ۱	۱۲۰ . ۱	۱۵۹ . ۳	۱۹۸ . ۲	۲۳۷ . ۳
۴ . ۱	۴۳ . ۲	۸۲ . ۴	۱۲۱ . ۱	۱۶۰ . ۲	۱۹۹ . ۲	۲۳۸ . ۳
۵ . ۱	۴۴ . ۱	۸۳ . ۴	۱۲۲ . ۱	۱۶۱ . ۲	۲۰۰ . ۲	۲۳۹ . ۱
۶ . ۲	۴۵ . ۳	۸۴ . ۱	۱۲۳ . ۲	۱۶۲ . ۲	۲۰۱ . ۱	۲۴۰ . ۲
۷ . ۲	۴۶ . ۱	۸۵ . ۴	۱۲۴ . ۳	۱۶۳ . ۲	۲۰۲ . ۲	۲۴۱ . ۱
۸ . ۲	۴۷ . ۱	۸۶ . ۳	۱۲۵ . ۲	۱۶۴ . ۲	۲۰۳ . ۱	۲۴۲ . ۱
۹ . ۲	۴۸ . ۲	۸۷ . ۴	۱۲۶ . ۱	۱۶۵ . ۴	۲۰۴ . ۳	۲۴۳ . ۳
۱۰ . ۱	۴۹ . ۳	۸۸ . ۴	۱۲۷ . ۲	۱۶۶ . ۱	۲۰۵ . ۴	۲۴۴ . ۲
۱۱ . ۲	۵۰ . ۱	۸۹ . ۳	۱۲۸ . ۲	۱۶۷ . ۱	۲۰۶ . ۳	۲۴۵ . ۳
۱۲ . ۱	۵۱ . ۲	۹۰ . ۲	۱۲۹ . ۴	۱۶۸ . ۲	۲۰۷ . ۲	۲۴۶ . ۱
۱۳ . ۳	۵۲ . ۲	۹۱ . ۴	۱۳۰ . ۲	۱۶۹ . ۱	۲۰۸ . ۱	۲۴۷ . ۲
۱۴ . ۲	۵۳ . ۴	۹۲ . ۳	۱۳۱ . ۳	۱۷۰ . ۱	۲۰۹ . ۲	۲۴۸ . ۲
۱۵ . ۳	۵۴ . ۱	۹۳ . ۱	۱۳۲ . ۲	۱۷۱ . ۱	۲۱۰ . ۲	۲۴۹ . ۳
۱۶ . ۱	۵۵ . ۳	۹۴ . ۱	۱۳۳ . ۲	۱۷۲ . ۱	۲۱۱ . ۲	۲۵۰ . ۲
۱۷ . ۱	۵۶ . ۳	۹۵ . ۴	۱۳۴ . ۲	۱۷۳ . ۱	۲۱۲ . ۳	۲۵۱ . ۲
۱۸ . ۲	۵۷ . ۳	۹۶ . ۲	۱۳۵ . ۲	۱۷۴ . ۴	۲۱۳ . ۳	۲۵۲ . ۲
۱۹ . ۴	۵۸ . ۴	۹۷ . ۳	۱۳۶ . ۲	۱۷۵ . ۴	۲۱۴ . ۳	۲۵۳ . ۲
۲۰ . ۲	۵۹ . ۳	۹۸ . ۲	۱۳۷ . ۴	۱۷۶ . ۲	۲۱۵ . ۴	۲۵۴ . ۱
۲۱ . ۱	۶۰ . ۱	۹۹ . ۴	۱۳۸ . ۴	۱۷۷ . ۳	۲۱۶ . ۲	۲۵۵ . ۳
۲۲ . ۲	۶۱ . ۳	۱۰۰ . ۴	۱۳۹ . ۴	۱۷۸ . ۱	۲۱۷ . ۴	۲۵۶ . ۱
۲۳ . ۲	۶۲ . ۴	۱۰۱ . ۱	۱۴۰ . ۲	۱۷۹ . ۴	۲۱۸ . ۱	۲۵۷ . ۱
۲۴ . ۴	۶۳ . ۴	۱۰۲ . ۴	۱۴۱ . ۴	۱۸۰ . ۳	۲۱۹ . ۳	۲۵۸ . ۲
۲۵ . ۲	۶۴ . ۲	۱۰۳ . ۱	۱۴۲ . ۳	۱۸۱ . ۱	۲۲۰ . ۲	۲۵۹ . ۳
۲۶ . ۲	۶۵ . ۲	۱۰۴ . ۱	۱۴۳ . ۳	۱۸۲ . ۲	۲۲۱ . ۲	۲۶۰ . ۲
۲۷ . ۳	۶۶ . ۲	۱۰۵ . ۳	۱۴۴ . ۲	۱۸۳ . ۲	۲۲۲ . ۳	۲۶۱ . ۱
۲۸ . ۲	۶۷ . ۲	۱۰۶ . ۲	۱۴۵ . ۱	۱۸۴ . ۳	۲۲۳ . ۱	۲۶۲ . ۱
۲۹ . ۳	۶۸ . ۴	۱۰۷ . ۲	۱۴۶ . ۳	۱۸۵ . ۴	۲۲۴ . ۳	۲۶۳ . ۱
۳۰ . ۲	۶۹ . ۳	۱۰۸ . ۴	۱۴۷ . ۲	۱۸۶ . ۲	۲۲۵ . ۱	۲۶۴ . ۲
۳۱ . ۲	۷۰ . ۴	۱۰۹ . ۴	۱۴۸ . ۳	۱۸۷ . ۲	۲۲۶ . ۲	۲۶۵ . ۲
۳۲ . ۲	۷۱ . ۴	۱۱۰ . ۴	۱۴۹ . ۲	۱۸۸ . ۴	۲۲۷ . ۳	۲۶۶ . ۲
۳۳ . ۱	۷۲ . ۱	۱۱۱ . ۴	۱۵۰ . ۳	۱۸۹ . ۳	۲۲۸ . ۲	۲۶۷ . ۲
۳۴ . ۴	۷۳ . ۱	۱۱۲ . ۴	۱۵۱ . ۴	۱۹۰ . ۱	۲۲۹ . ۱	۲۶۸ . ۲
۳۵ . ۴	۷۴ . ۴	۱۱۳ . ۲	۱۵۲ . ۴	۱۹۱ . ۱	۲۳۰ . ۲	
۳۶ . ۲	۷۵ . ۱	۱۱۴ . ۲	۱۵۳ . ۱	۱۹۲ . ۲	۲۳۱ . ۱	
۳۷ . ۳	۷۶ . ۲	۱۱۵ . ۴	۱۵۴ . ۳	۱۹۳ . ۲	۲۳۲ . ۱	
۳۸ . ۲	۷۷ . ۴	۱۱۶ . ۱	۱۵۵ . ۲	۱۹۴ . ۲	۲۳۳ . ۲	
۳۹ . ۴	۷۸ . ۲	۱۱۷ . ۲	۱۵۶ . ۳	۱۹۵ . ۱	۲۳۴ . ۱	

